Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Règles douloureuses

Adolescente ou femme (IME, FAM, MAS), y compris non communicante

15 IMMÉDIAT · malaise, perte de connaissance, pâleur et sueurs ; saignement très abondant avec pouls > 120/min ou PAS < 100 mmHg ; douleur brutale et intense du ventre, ventre dur ; tampon ou coupe avec **forte fièvre, éruption, malaise** : retirer la protection (choc toxique).

J'applique si

- Douleur **pendant les règles**, habituelle chez elle.
- Non communicante : agitation, cris, repli, refus de manger = douleur possible.

Je ne fais pas

- Antalgique non prescrit, ou celui d'une autre personne (ibuprofène, paracétamol…).
- Bouillotte chaude au contact de la peau, surtout si elle ne peut pas dire « trop chaud ».
- Mettre sur le compte des règles une douleur **différente de d'habitude**.
- Parler d'une grossesse possible devant des personnes non concernées.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Au calme, position confortable ; intimité respectée, une professionnelle si possible.
2. Protection changée et toilette aussi souvent que nécessaire ; tampon ou coupe changé selon la notice ?
3. Douleur : EN ; sinon **hétéro-évaluation** prévue (FLACC, GED-DI, EDAAP). T° ; saignement inhabituel ?
4. Retard de règles, rapport possible ? → **grossesse possible** : le dire à l'IDE.
5. **Chaleur** sur le bas-ventre : bouillotte tiède, enveloppée ; boire ; repos, marche douce, activité apaisante.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. Antalgique **seulement s'il est prescrit** ; « si besoin » : **validation de l'IDE** d'abord.

ENSUITE

7. Enfant (IME) : parents selon le PAI.

J'appelle l'IDE sans délai

- Douleur **inhabituelle** (plus forte, d'un seul côté, hors règles) ou qui ne cède pas.
- **T° ≥ 38 °C**, vomissements, brûlures urinaires ; saignement plus abondant ou règles qui durent.
- **Grossesse possible** ; avant tout antalgique « si besoin ».
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Douleur (score), mesures, traitement donné et validé par qui, effet, saignement.
- Réévaluer au délai fixé par l'IDE.
- Règles très douloureuses chaque mois : le signaler pour une consultation.

À retenir : Confort d'abord ; antalgique seulement s'il est prescrit et, s'il est « si besoin », après validation de l'IDE. Une douleur inhabituelle n'est pas « juste les règles ».

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DOTR, protocole Aide à la prise des traitements « si besoin » (2026) ; L.313-26 CASF ; TA Dijon 25/01/2024 n° 2000998 et CAA Lyon 2026 (cités par FNASFO 2026) ; Inserm, choc toxique menstruel (communiqué 10/03/2020) ; seuils : ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, fiche 0 (2023).

Réf. DOTR-AS-REGLES | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature