Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Soins de bouche

Personne dépendante, adulte ou enfant, avec ou sans troubles de déglutition

15 IMMÉDIAT · étouffement après une fausse route (« Fausse route / Obstruction des voies aériennes ») ; gonflement du visage ou du cou qui s'étend, gêne pour avaler ou respirer, fièvre.

J'applique si

- Soin d'hygiène et de confort : dents, gencives, langue, prothèses.

Je ne fais pas

- Faire rincer ou gargariser une personne qui ne sait pas cracher.
- Soin allongée à plat, ou juste avant de l'installer à plat.
- Produit médicamenteux (bain de bouche, gel) : IDE sur prescription.
- Forcer l'ouverture de la bouche : arrêter, réessayer, le signaler.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Assise ou demi-assise, tête un peu en avant** ; alitée : sur le côté. Mains, gants, matériel personnel.
2. Troubles de déglutition : **très peu d'eau**, compresse ou brosse juste humide, pas de rinçage.
3. Peut mordre : écarter avec un bâtonnet, **jamais les doigts entre les dents**.
4. Regarder : lèvres, langue, gencives sèches, dépôts blancs, plaies, saignement ? Dent cassée, joue gonflée ?
5. **Brosser dents et gencives au moins 2 fois par jour**, brosse souple ; langue, joues : compresse humide.
6. **Prothèses** : retirer, brosser à part, rincer ; la nuit, dans la boîte nominative ; blessante ?

ENSUITE

7. Lèvres : hydratant non médicamenteux. Bouche sèche, fin de vie : humidifier selon le plan de soins.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Dépôts blancs** (mycose), plaie, aphtes, saignement des gencives ; prothèse perdue ou qui blesse.
- **Douleur dentaire** suspectée (refus de manger, main à la joue, agitation au soin), dent cassée.
- Fièvre ≥ 38 °C avec bouche douloureuse.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Soin fait, état de la bouche, prothèse, refus, saignement.
- Toux ou voix mouillée pendant le soin : arrêter, asseoir, le signaler (fausse route).

À retenir : Une bouche propre prévient douleurs et infections. Chez la personne qui ne parle pas, une douleur dentaire est une cause fréquente d'agitation : regardez dans la bouche.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026, art. 2 A II (soins de bouche avec produits non médicamenteux : AS, AP, AES) ; HAS, Stratégies de prévention de la carie dentaire (2010) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, fiche Agitation (douleur dentaire ou ORL) (2023).

Réf. DOTR-AS-BOUCHE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature