Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Situation palliative la nuit

Personne en soins palliatifs (EHPAD, MAS, FAM, IME), inconfortable la nuit

15 IMMÉDIAT · détresse respiratoire brutale, hémorragie abondante, convulsion, et IDE pas sur place ; symptôme insupportable, ni IDE ni médecin joignable. Au 15 : dire **« soins palliatifs »**, lire la fiche et le niveau de soins.

PAI / protocole individuel : sortir la **fiche de prescriptions anticipées personnalisées / fiche Urgence Pallia** (LAT, directives anticipées, niveau de soins) **avant d'appeler**.

J'applique si

- Inconfort : douleur, essoufflement, encombrement, angoisse, agitation.

Je ne fais pas

- Donner un « si besoin » sans validation de l'IDE ou du médecin.
- Faire une injection ou poser un traitement de la fiche (geste IDE).
- Faire manger ou boire une personne somnolente ou qui s'étouffe.
- Laisser seule une personne angoissée.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Rester près ; parler calmement, même sans réponse ; lumière douce ; un proche si c'est son souhait.
2. **Douleur** : grimace, gémissements, crispation au toucher (Algoplus ou grille prévue) ?
3. **Respiration** essoufflée, bruyante (**encombrement**), pauses ? **Angoisse**, tentatives de se lever ?
4. Bouche sèche, position, protection souillée, n'a pas uriné ?
5. **Demi-assise** si essoufflée, **sur le côté** si encombrée ; soins de bouche, change, coussins.
6. Appeler l'IDE ou l'astreinte **avec la fiche** : elle **applique les prescriptions anticipées**.

ENSUITE

7. Famille : prévenir comme convenu dans le dossier.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Tout inconfort nouveau** (douleur, souffle, angoisse).
- Symptôme qui revient ou ne cède pas après le traitement donné.
- Pauses respiratoires : l'IDE prévient médecin et famille. Décès probable : « Conduite à tenir en cas de décès ».
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, symptôme, mesures, appels, traitement donné par l'IDE, effet.
- Confort réévalué à chaque passage et après chaque traitement.
- Enfant : projet convenu avec les parents et l'équipe ressource de soins palliatifs pédiatriques.

À retenir : La nuit, on ne laisse pas une personne en fin de vie inconfortable : confort, fiche de prescriptions anticipées, IDE. On respecte ses volontés ; au 15, on précise le contexte palliatif.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFAP, fiche Urgence Pallia (2017, PDF 2025) ; HAS, Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents d'EHPAD (2015) ; ARS Normandie, Urgences en EHPAD, volet palliatif (2019) ; DOTR, fiche Midazolam en soins palliatifs (2026) et protocole Aide à la prise des traitements « si besoin » (2026).

Réf. DOTR-AS-PALLIA | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature