Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Vague de chaleur / canicule

Épisode de chaleur ou vigilance canicule (EHPAD, MAS, FAM, IME)

15 IMMÉDIAT · coup de chaleur : T° ≥ 40 °C, ou > 39 °C avec confusion ou propos incohérents ; peau chaude et rouge sans transpiration, somnolence, malaise, convulsion → 15, puis **refroidir** sans attendre (ombre, déshabiller, mouiller, ventiler).

J'applique si

- **Personnes à risque** : âgées, enfants, non communicantes, dépendantes, sous **psychotropes** ou **diurétiques**.

Je ne fais pas

- **Paracétamol** pour une température due à la chaleur (inefficace, ANSM).
- **Arrêter** ou modifier un traitement soi-même, diurétique compris.
- Laisser une personne à risque dans une chambre chaude ou au soleil.
- Faire boire sans texture adaptée une personne qui fait des fausses routes.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Volets et fenêtres **fermés le jour** ; aérer tôt le matin et tard le soir.
2. Personnes à risque **dans la pièce rafraîchie** plusieurs heures par jour ; vêtements légers.
3. Pas de sortie aux heures chaudes ; **jamais seul dans un véhicule**.
4. **Proposer à boire régulièrement**, sans attendre la soif ; eau gélifiée si besoin.
5. **Restriction hydrique prescrite** (insuffisance cardiaque...) : demander à l'IDE la quantité permise.
6. **Rafraîchir** : brumiser, linge humide, ventilateur, douche fraîche.
7. T° des personnes à risque selon le plan bleu et dès qu'un signe apparaît.

Signes d'alerte

Déshydratation

- soif, bouche sèche, urines rares et foncées, fatigue, maux de tête

Début de coup de chaleur

- crampes, vertiges, nausées, propos incohérents

J'appelle l'IDE sans délai

- T° **> 39 °C** : sans délai. T° ≥ 38 °C (âgé : ≥ 37,8 °C) : dans l'heure.
- Déshydratation : urines rares, refus de boire, PAS < 100 mmHg, pouls > 120/min.
- Crampes, vertiges, nausées, fatigue ou comportement inhabituels.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Boissons (quantités), T° et signes sur la feuille de suivi des personnes à risque.
- Poids, urines, comportement : tout changement à l'IDE.
- Pièces qui restent chaudes : le signaler au cadre (plan bleu).

À retenir : En vague de chaleur, on fait boire, on rafraîchit et on mesure avant que les signes n'apparaissent. Coup de chaleur : 15 et refroidissement immédiat ; le paracétamol n'y fait rien.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Instruction interministérielle du 27/05/2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur (reconduite, applicable à l'été 2026 : santé.fr, 07/2026) ; ANSM, Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (2017) ; info.gouv.fr, Canicule : comment se protéger (08/2026) ; santé.fr, Coup de chaleur (08/2026) ; CASF D312-160.

Réf. DOTR-AS-CHALEUR | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature