

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Constipation

Conduite à tenir devant absence de selles ou constipation simple, hors signe de gravité, chez un résident adulte.

Indications

- Absence de selles ou selles rares gênantes.
- Inconfort abdominal modéré sans vomissements.
- Constipation connue sans signe d'occlusion.

Vérifications préalables

- Date des dernières selles connue si possible.
- Recherche de douleur, vomissements, fièvre, ballonnement important.
- Hydratation, mobilité et traitements constipants vérifiés.
- Prescription laxative disponible consultée.

Ne pas appliquer ce protocole

- Douleur abdominale importante, défense ou abdomen très distendu.
- Vomissements, arrêt des gaz ou suspicion d'occlusion.
- Rectorragies, altération de l'état général ou fécalome compliqué.
- Constipation récente inhabituelle chez résident fragile.

Conduite à tenir

- Favoriser hydratation, mobilisation et installation aux toilettes si possible.
- Augmenter les fibres si compatible avec l'état clinique.
- Si traitement ponctuel prescrit : administrer selon fiche thérapeutique.
- Si échec ou récurrence : demander un avis médical.

Surveillance et traçabilité

- Noter symptômes, examen abdominal sommaire et mesures réalisées.
- Tracer émission de selles, douleurs, vomissements et tolérance.
- Réévaluer dans la journée puis le lendemain si besoin.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si inconfort croissant, agitation, douleurs ou échec répété.
- Appel 15 si suspicion d'occlusion, vomissements fécaloïdes, malaise ou douleur abdominale aiguë.

Mention de sécurité

Ne pas banaliser une constipation récente ou douloureuse. Toujours distinguer constipation simple, fécalome suspecté et tableau abdominal aigu.

Fait à :

Le : / /

Signature :