

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Douleur

Conduite à tenir devant douleur signalée ou suspectée, en complément des prescriptions ponctuelles déjà disponibles.

Indications

- Douleur exprimée, observée ou évaluée sur une échelle adaptée.
- Besoin de mobilisation d'un traitement "si besoin" déjà prescrit.
- Inconfort douloureux sans signe d'urgence majeure.

Vérifications préalables

- Préciser localisation, intensité, ancienneté et circonstances.
- Vérifier antalgique déjà reçu et délai depuis dernière prise.
- Rechercher signe de gravité ou douleur inhabituelle.
- Choisir échelle adaptée au résident.

Ne pas appliquer ce protocole

- Douleur thoracique, abdominale aiguë, neurologique ou traumatique sévère.
- Douleur très intense inhabituelle sans avis médical.
- Suspicion de fracture, sepsis ou abdomen aigu.
- Multiplication anarchique des antalgiques.

Conduite à tenir

- Mesures non médicamenteuses simples si adaptées.
- Administrer traitement ponctuel prescrit selon fiche thérapeutique.
- Réévaluer efficacité après délai cohérent avec le traitement.
- Prévenir médecin si douleur persistante ou atypique.

Surveillance et traçabilité

- Tracer score de douleur, traitement administré et effet observé.
- Noter localisation, contexte, facteurs aggravants/soulageants.
- Surveiller répétition des demandes antalgiques.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si douleur inhabituelle, persistante ou insuffisamment soulagée.
- Appel 15 si douleur thoracique, dyspnée, déficit neurologique, abdomen aigu ou état de choc.

Mention de sécurité

Traiter la douleur, oui ; mais toujours requalifier une douleur inhabituelle avant de la banaliser.

Fait à :

Le : / /

Signature :