

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Oubli de traitement

Conduite à tenir lorsqu'une prise médicamenteuse a été oubliée ou incertaine, avec sécurisation du circuit du médicament.

Indications

- Prise oubliée identifiée après l'horaire prévu.
- Incertitude sur administration effective.
- Erreur simple de non-administration sans symptôme immédiat.

Vérifications préalables

- Identifier précisément médicament, dose et horaire.
- Vérifier si la prise a pu être faite par une autre équipe.
- Évaluer délai écoulé et risque lié au médicament.
- Consulter prescription et consignes existantes.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas doubler une prise sans vérification médicale/pharmaceutique.
- Ne pas supposer l'administration sans traçabilité.
- Ne pas minimiser un oubli de médicament à marge étroite.
- Ne pas corriger seul une séquence complexe.

Conduite à tenir

- Bloquer toute double administration potentielle.
- Contacter IDE/médecin/pharmacien selon criticité.
- Administrer secondairement uniquement si consigne claire existe.
- Analyser la cause organisationnelle de l'oubli.

Surveillance et traçabilité

- Tracer médicament, horaire, découverte de l'oubli et décisions prises.
- Surveiller symptômes liés à l'oubli ou à la correction.
- Déclarer l'événement selon procédure interne si requis.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide pour antiépileptique, insuline, anticoagulant, psychotrope sensible ou doute important.
- Appel urgent si symptôme lié à l'oubli ou erreur potentiellement grave.

Mention de sécurité

Face à un doute, priorité : éviter la double dose et obtenir une décision tracée.

Fait à :

Le : / /

Signature :