

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Paracétamol - Douleur et/ou Fièvre

Administration per os chez un résident adulte ou > 50 kg, selon prescription signée, après vérification des contre-indications et traçabilité.

Indications

- Douleur légère à modérée.
- Température $\geq 38,5$ °C ou inconfort fébrile.
- Besoin ponctuel, en l'absence de signe de gravité.

Vérifications préalables

- Absence d'allergie connue au paracétamol.
- Absence d'autre médicament contenant du paracétamol.
- Dernière prise connue et total des 24 h vérifié.
- Prise per os possible.

Ne pas appliquer ce protocole

- Poids < 50 kg sans schéma individualisé.
- Insuffisance hépatique, alcoolisme chronique ou dénutrition sévère.
- Insuffisance rénale sévère sans avis médical.
- Douleur intense, brutale, inhabituelle ou fièvre mal tolérée.

Prescription type

- Paracétamol 1 g comprimé ou sachet, per os.
- 1 g par prise, à renouveler si besoin après 6 h minimum.
- Maximum : 3 g par 24 h.
- Durée : 3 jours si fièvre, 5 jours si douleur, puis avis médical.

Surveillance et traçabilité

- Noter motif, heure, dose administrée et effet observé.
- Tracer la température si fièvre.
- Contacter le médecin si inefficacité, prises répétées ou aggravation.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si douleur ou fièvre persistante, confusion, vomissements ou altération de l'état général.
- Appel 15 si détresse respiratoire, trouble de conscience, convulsions, douleur thoracique ou état grave.

Mention de sécurité

Vérifier systématiquement les associations contenant du paracétamol. Pour < 50 kg, enfant ou situation fragile : prescription individualisée.

Fait à :

Le : / /

Signature :