

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Surveillance de la température

Repères pour surveillance thermique systématique ou ciblée et conduite à tenir devant température anormale.

Indications

- Surveillance programmée ou symptôme évocateur.
- Fièvre ou hypothermie suspectée.
- Suivi après épisode infectieux ou clinique aigu.

Vérifications préalables

- Utiliser la même méthode de mesure si possible.
- Tracer heure, site de mesure et contexte.
- Rechercher frissons, marbrures, malaise, confusion.
- Comparer aux valeurs habituelles si connues.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas banaliser température basse chez sujet fragile.
- Ne pas multiplier mesures non fiables sans cohérence.
- Ne pas attendre en cas d'altération de l'état général.
- Ne pas traiter une valeur isolée sans contexte clinique.

Conduite à tenir

- Tracer toute température anormale et répéter si doute.
- Appliquer protocole hyperthermie ou hypothermie selon cas.
- Prévenir le médecin si anomalie persistante ou mal tolérée.
- Associer évaluation clinique générale.

Surveillance et traçabilité

- Noter températures successives, symptômes et mesures prises.
- Surveiller évolution dans le temps et tolérance.
- Tracer information transmise au médecin.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si température anormale persistante, très élevée ou très basse, ou altération de l'état général.
- Appel 15 si détresse, troubles neurologiques, choc ou hypothermie profonde suspectée.

Mention de sécurité

La température n'est qu'un signe. Elle doit toujours être interprétée avec le contexte clinique global.

Fait à :

Le : / /

Signature :