

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Vomissements

Conduite à tenir devant vomissements aigus simples chez un résident adulte, hors tableau grave ou chirurgical.

Indications

- Un ou plusieurs vomissements récents.
- Inconfort digestif sans signe de gravité immédiate.
- Besoin de surveillance et mesures simples.

Vérifications préalables

- Rechercher douleur abdominale, fièvre, diarrhée, céphalées ou chute récente.
- Évaluer risque d'inhalation et capacité à s'hydrater.
- Vérifier traitement récent, repas, constipation ou syndrome occlusif.
- Prendre paramètres si besoin.

Ne pas appliquer ce protocole

- Vomissements incoercibles, bilieux, sanglants ou fécaloïdes.
- Douleur abdominale importante, abdomen distendu, arrêt des gaz.
- Trouble de conscience, inhalation ou déshydratation importante.
- Traumatisme crânien ou contexte neurologique.

Conduite à tenir

- Repos digestif court puis reprise fractionnée de boissons si possible.
- Position de sécurité et prévention de l'inhalation.
- Antiémétique uniquement s'il est déjà prescrit.
- Prévenir le médecin si persistance ou doute étiologique.

Surveillance et traçabilité

- Noter nombre, aspect, température et signes associés.
- Tracer hydratation, douleur abdominale et tolérance.
- Surveiller récurrence et risque d'inhalation.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si vomissements répétés, fièvre, douleur ou impossibilité de prise orale.
- Appel 15 si détresse, abdomen aigu, inhalation, trouble de conscience ou déshydratation sévère.

Mention de sécurité

Toujours rechercher syndrome occlusif, fausse-route, effet médicamenteux, infection ou contexte neurologique.

Fait à :

Le : / /

Signature :