

**Задача 1.** Шестая строчка треугольника Паскаля выглядит следующим образом:

**Решение.** По определению, шестая строчка треугольника Паскаля получается из пятой 1 5 10 10 5 1 суммированием чисел стоящих слева сверху и справа сверху. Получаем следующую строчку: 1 6 15 20 15 6 1.

**Задача 2.** На дереве висит 10 разных яблок. Сколькими способами можно сорвать нечётное количество яблок?

**Решение.** Из задачи **Наборы из чётного числа символов** мы знаем, что чётное количество яблок можно сорвать  $2^{10-1} = 2^9 = 512$  способами. Так как общее количество способов сорвать яблоки равно  $2^{10}$ , то нечётное количество яблок можно сорвать также 512 способами.

**Задача 3.** Сумма  $C_{10}^1 + C_{10}^2 + \dots + C_{10}^{10}$  равна

**Решение.** Мы знаем, что  $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ . Подставляя  $n=10$ , получаем, что  $C_{10}^0 + C_{10}^1 + C_{10}^2 + \dots + C_{10}^{10} = 2^{10} = 1024$ . Наша сумма получается из данной вычитанием  $C_{10}^0 = 1$ . Следовательно, ответ равен 1023.

**Задача 4.** Коэффициент при  $x^7$  в разложении  $(1+x)^{11}$  равен

**Решение.** По формуле бинома Ньютона коэффициент при  $x^7$  равен  $C_{11}^7 = C_{11}^4$ .

**Задача 5.** В наборе из 12 сосудов имеется 5 неразличимых стаканов и 7 различных чашек. Сколькими способами можно выбрать 6 сосудов из 12?

**Решение.** Для каждого фиксированного  $k$  существует только один способ выбрать  $k$  неразличимых стаканов. Отсюда искомое количество способов равно количеству способов выбрать от 1 до 6 чашек. Искомая сумма равна  $C_7^1 + \dots + C_7^6 = C_7^0 + C_7^1 + \dots + C_7^6 + C_7^7 - (C_7^0 + C_7^7) = 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$ .

**Задача 6.** Сумма  $C_{n+m-1}^m + C_{n+m-2}^m + \dots + C_m^m$  при всех  $m \geq 1$ ,  $n \geq 1$  равна:

**Решение.** Эта сумма в точности равна сумме чисел в треугольнике Паскаля, расположенных на одной диагонали, начиная с числа  $C_{n+m-1}^m$  и выше. Эта задача разобрана на видео, и ответ — число, стоящее под  $C_{n+m-1}^m$  справа, то есть  $C_{n+m}^{m+1} = C_{n+m}^{n-1}$ .

**Задача 7.** Отметьте тождества, выполненные при всех  $n \geq k \geq 0$ .

**Решение.**

$2^n = C_n^0 + \dots + C_n^n$  верно;

$0 = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n$  неверно для  $n=0$ ;

$C_{n-k}^k = C_{n-k}^{n-k}$  неверно для  $n=3, k=1$ ;

$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k+1}$  неверно для  $n=4, k=1$  ( $4 = C_4^1 \neq C_3^1 + C_3^2 = 3 + 3 = 6$ ).

Mark as completed

