



שאלות בית - חזרה בסיסית

9 ב




קבלות
כי ניתן לבנות
זה אפילו עם L_4
מאותה סיבה

(א) $L_3 \cap L_4$ - קבלות כי קיבוק
שפות קבלות יוצא קבלות


9 ב $L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in \{a,b\}^*, \#_a \geq \#_b\}$
לא קבלות מכיוון שצריך שכל a יתאים ל- b
כפי שצריך אם במות a יש b מתאים
ה- b יס.

9 ב $L_1 \cup L_2 \cup \overline{L_2} = \{w \mid w \in \{a,b\}^*\}$

9 ב $L_1 \cap L_2 = \emptyset$
שפה זו קבלות. אולי סופי:




① $L_2 \cap L_3 = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, \#_a > \#_b, \# \leq 3\}$



⑤ $L_4 \cap R(L_4) = L_4$

$R(L_4) = L_4$



④

1,2 31
2,1

```
public static boolean twoSum(Queue<Integer> q, int x)
```

```
{  
    int y = q.size();  
    for(int i = q.size(); i > 0; i--)
```

```
{  
    int y = q.remove();  
    for(int j = q.size(); j > 0; j--)
```

```
{  
    int z = q.remove();
```

```
    if(y + z == x)
```

```
{
```

```
        return true;
```

```
}
```

```
    q.insert(z);
```

```
}
```

```
    q.insert(y);
```

```
}
```

```
return false;
```

```
}
```