

جدول تخصصی کوددهی گابریست

V.2 | 29-07-1404

PersianWay.IR

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	غلات (گندم/جو/کلزا)
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت		۵۰-۱۵۰ کیلو	Kg ۵۰-۱۰۰	Kg ۵۰-۱۰۰									--
														-
۲	پنجه زنی					L ۵-۱۰	L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						-
						آبیاری	آبیاری	آبیاری						
۳	ساقه					L ۱۰-۲۰								-
						آبیاری								
۴	پيله و گل								Kg ۲-۴			L ۱-۲	L ۱-۲	
									آبیاری			محلول پاشی	محلول پاشی	
۵	خوشه پرکردن					L ۵-۱۰					L ۲-۴			معادل L ۲-۱ محلول پاشی
						آبیاری					آبیاری			

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	غلات (برنج)
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									--
														-
۲	خزانه						L ۱-۳	L ۱-۳						
							آبیاری	آبیاری						
۳	انتقال نشا					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۴	پنجه زنی						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۵	رشد ساقه					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۶	پبله و گل								Kg ۲-۴			L ۱-۲		
									آبیاری			محلول پاشی		
۷	خوشه پر کردن		۲۵ کیلو				L ۵-۱۰				L ۲-۴			معادل ۱-۲ L محلول پاشی
			شیره کش				آبیاری				آبیاری			

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	ذرت
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت		۵۰-۱۵۰ Kg	Kg ۵۰-۱۰۰	Kg ۵۰-۱۰۰									--
														-
۲	۲-۴ برگ						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۳	۶-۸ برگ					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۴	ابتدای ساقه (۶۰-۸۰ cm)						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۵	ابتدای ظهور گل							Kg ۲-۴				L ۲-۴		
								آبیاری				آبیاری		
۶	خمیری شدن						L ۵-۱۰				L ۲-۴			
							آبیاری				آبیاری			

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاوری	حبوبات
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									--
														-
۲	۲-۴ برگ						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۳	۴-۶ برگ					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۴	بوته کبوتری											۲۰۰-۴۰۰cc	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۵	ابتدای غلاف					L ۱۰-۲۰			Kg ۲-۴					
						آبیاری			آبیاری					
۶	پر کردن غلاف						L ۵-۱۰					L ۲-۴		
							آبیاری					آبیاری		

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاوری	صیفی جات
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف												
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg										
۲	۵-۱۰ روز پس از انتقال نشا						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰					۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.	
							آبیاری	آبیاری						
۳	رشد بوته					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۴	بوته کبوتری (قبل از گلدهی)						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰				L ۱		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی	محلول پاشی	
۵	ابتدای میوه					L ۱۰-۲۰				L ۱-۲	L ۲-۴		۱-۲ L کلسیم بور محلول پاشی معادل ۴-۲ L کلسیم بور آبیاری است.	
						آبیاری			محلول پاشی		آبیاری			
۶	رسیدن میوه						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰	Kg ۲-۴		L ۱-۲		۱-۲ L K۵۰ محلول پاشی معادل ۴-۲ K۵۰ آبیاری است.	
							آبیاری	آبیاری	آبیاری		محلول پاشی			
در کشت هایی که چندین مرحله برداشت داریم، میتوانید مرحله ۴ و ۵ را تکرار کنید.														
مصرف تریکودرما با قارچ کش های شیمیایی تداخل دارد.														

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	ریشه - غده
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									--
														-
۲	۴-۶ برگ						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						Kg ۱-۲ تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
							آبیاری	آبیاری						
۳	۸-۱۰ برگ					L ۱۰-۲۰			Kg ۲-۴					
						آبیاری			آبیاری					
	قبل از تشکیل غده									L ۱-۲				
										محلول پاشی				
۴	شکل گیری غده / ریشه						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰				L ۱-۲	L ۱	
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی	محلول پاشی	
۵	سایزگیری						L ۵-۱۰				L ۲-۴			L K۵۰ ۱-۲ محلول پاشی معادل ۴-۲ L K۵۰ آبیاری است.
							آبیاری				آبیاری			

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	سبزیجات
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	زیرکشت		۵۰-۱۵۰Kg	Kg ۵۰-۱۰۰	Kg ۵۰-۱۰۰									--
														-
۲	۲-۴ برگ						L ۱۰	L ۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۳	رشد رویشی					L ۱۰-۲۰			Kg ۲-۴			L ۱-۲		
						آبیاری			آبیاری			محلول پاشی		
برای تکرار چیدن محصول، میتوانید مرحله رشد رویشی را تکرار کنید.														

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	آلوه‌ورا
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	بعد از برداشت					L ۱۰-۲۰	L ۵-۱۰							
						آبیاری	آبیاری							

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	پنبه
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت		۱۵۰-۲۵۰Kg	۱۵۰-۲۵۰Kg	۱۰۰-۲۰۰Kg									--
														-
۲	۲-۴ برگی						۵-۱۰Kg	۵-۱۰Kg						۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
							آبیاری	آبیاری						
۳	۶-۸ برگی					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۴	ساقه						۵-۱۰Kg	۵-۱۰Kg	Kg ۰.۵-۱		L ۱-۲			
							آبیاری	آبیاری	محلول پاشی			محلول پاشی		
۵	قبل از گلدهی									۲L		۲۰۰-۴۰۰C C	L ۱-۲	محلول پاشی کلسیم و فروت ست-میکرو در ۲ مرحله انجام گردد.
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۶	تشکیل غوزه						۵-۱۰L				L ۱-۲			
							آبیاری				محلول پاشی			
۷	پر شدن غوزه					L ۱۰-۲۰								
						آبیاری								
۸	قبل از برداشت						۵-۱۰L				L ۱-۲			
							آبیاری				محلول پاشی			

واحد	۱۰۰۰ مترمربع	جدول کوددهی											کشاورزی	خشخاش
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیر کشت	Kg ۵-۱۵	Kg ۵-۱۵	Kg ۵-۱۰	Kg ۵-۱۰									
۲	جوانه زنی					L ۲-۴								Kg ۱-۲ تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
						آبیاری								
۳	۴ برگگی						L ۱-۲	L ۱-۲						
							آبیاری	آبیاری						
۴	رویش ساقه					L ۲-۴								
						آبیاری								
۵	قبل از گلدهی											CC ۲۰۰	CC ۱۰۰	
												آبیاری	محلول پاشی	
۶	از گلدهی تا میوه						L ۱-۲					CC ۲۰۰		
							آبیاری					آبیاری		

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	یونجه
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg										--
														-
۲	آب اول بعد					۱۰-۲۰ L								۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
	از هر برش					آبیاری								
۳	یک هفته بعد											۱-۲ L		۱-۲ L میکرو محلول پاشی معادل ۴-۲ L میکرو آبیاری است.
	از کوددهی مرحله برش											محلول پاشی		
درمورد کوددهی یونجه های چند ساله، ابتدا یک مرحله کود گلدن به میزان ۲۵-۵۰ کیلو را بصورت سرپاش و تریکودرما استفاده کنید و پس از مراحل کوددهی فوق را انجام دهید.														

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	کاهو / کلم / کرفس
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									
۲	پس از انتقال نشا						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
							آبیاری	آبیاری						
۳	۴-۶ برگ											L ۲-۴		
												آبیاری		
۴	رشد رویشی						L ۵-۱۰	L ۵-۱۰						
							آبیاری	آبیاری						
۵	تشکیل هد					L ۱۰-۲۰				L ۱-۲	L ۱-۲	L ۱-۲		
						آبیاری				محلول پاشی	محلول پاشی	محلول پاشی		
۶	تکمیل هد						L ۵-۱۰		Kg ۱-۳		L ۱-۲			
							آبیاری		آبیاری		محلول پاشی			۱-۲ L K۵۰ محلول پاشی معادل ۴-۲ L K۵۰ آبیاری است.

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	زعفران
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بايوگابری فسفاتة	بايوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت		۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									
		تریکودرما همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۳-۲ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)											۱ Kg در ۱۰۰ L آب	
۲	بسیار آب (۲ هفته مانده به گلدهی) (۱۵ مهر تا ۲۰ آبان)						۵-۱۰L	۵-۱۰L						
							آبیاری	آبیاری						
۳	زاج آب بعد از برداشت گل (اواخر آبان)					۱۰-۲۰L			۱-۲Kg			۲-۴L		
						آبیاری			آبیاری			آبیاری		
۴	سبز آب (۱۵ روز بعد از زاج آب)							۱۰-۲۰L			۲-۴L			۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
								آبیاری			آبیاری			
۵	کلش آب (مرحله اول محلول پاشی)										L ۱-۲	L ۱-۲		
											محلول پاشی	محلول پاشی		
۶	قبل از زرد شدن برگ ها (مرحله دوم محلول پاشی)										L ۱-۲	L ۱-۲		
											محلول پاشی	محلول پاشی		

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	بوته و گل
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	کاشت	۱۰۰-۲۰۰g	۵۰-۱۰۰g	۵۰-۱۰۰g	۵۰-۱۰۰g									به ازای هر قلمه
۲	ابتدای جوانه					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰							
						آبیاری	آبیاری							
۳	قبل از گلدهی							L ۱۰-۲۰				۲۰۰-۴۰۰C C	L ۱-۲	محلول پاشی
								آبیاری				محلول پاشی		
۴	غنچه											L ۲-۴	L ۲-۴	آبیاری
												آبیاری		

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری	مرکبات
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											Zn-B	توضیحات
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		
۱	بعد از برداشت									L ۲		۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۲۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									۱-۴ ساله
		۱۵۰g	۳۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									۵-۹ ساله
		۲۰۰g	۴۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g									۱۰-۱۴ ساله
		۲۵۰g	۵۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g									۱۵ ساله به بالا
		تريکودرما همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تريکودرما توصیه میشود.										۱ Kg در ۱۰۰ L آب		
۳	تورم و جوانه زنی							L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰	۳۰-۵۰g	L ۲	۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	آهن: به ازای هر درخت محاسبه میشود و کل باغ آبیاری میشود.
								آبیاری	آبیاری	آبیاری	محلول پاشی	محلول پاشی	محلول پاشی	
۴	ابتدای میوه (نارنجکی)					L ۱۰-۲۰					L ۲			
						آبیاری					محلول پاشی			
۵	گردویی شدن							L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰		L ۲	L ۱-۲	L ۱-۲	مصرف Ca و K۵۰ با فاصله انجام شود.
								آبیاری	آبیاری		محلول پاشی	محلول پاشی	محلول پاشی	
۶	پر کردن میوه و رنگ گیری							L ۱۰-۲۰		۳۰-۵۰g	L ۲	L ۲-۴		آهن: به ازای هر درخت محاسبه میشود و کل باغ آبیاری میشود.
								آبیاری		آبیاری	محلول پاشی	آبیاری		

واحد	هکتار	جدول کوددهی											سیاه درخت					
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات					
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B				
۱	بعد از برداشت												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C				
													محلول پاشی	محلول پاشی				محلول پاشی
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۲۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g													۱-۴ ساله
		۱۵۰g	۳۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g													۵-۹ ساله
		۲۰۰g	۴۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g													۱۰-۱۴ ساله
		۲۵۰g	۵۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g													۱۵ ساله به بالا
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود.											۱ Kg در ۱۰۰ L آب					
۳	تورم و جوانه زنی												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C				
													محلول پاشی	محلول پاشی				
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰											
						آبیاری	آبیاری											
۵	ابتدای میوه					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰									L ۲		
						آبیاری	آبیاری									محلول پاشی		
۶	تشکیل هسته													L ۱-۲	L ۱-۲			
														محلول پاشی	محلول پاشی			
۷	رنگ گیری																	
								L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰									Kg ۳-۵
						آبیاری	آبیاری	آبیاری										آبیاری

واحد	هکتار	جدول کوددهی											انگور آبی	
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	بعد از برداشت											C C ۲۰۰-۴۰۰	L ۱-۲	
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	چالکود زمستانه	۵۰Kg	۱۵۰Kg	۵۰Kg	۵۰Kg									۱-۵ ساله
		۷۵Kg	۲۰۰Kg	۷۵Kg	۷۵Kg									۶-۱۴ ساله
		۱۰۰Kg	۲۵۰Kg	۱۰۰Kg	۱۰۰Kg									۱۵-۲۹ ساله
		۱۲۵Kg	۳۰۰Kg	۱۲۵Kg	۱۲۵Kg									۳۰ سال به بالا
برنامه چالکود براساس هکتار است و برای محاسبه به ازای هر درخت، میتوانید از میزان مصرف چالکود مرکبات استفاده کنید.														
		تریکودرما همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود.											۱ Kg در ۱۰۰ L آب	
۳	تورم و جوانه زنی (پنبه ای شدن)											C C ۲۰۰-۴۰۰	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰							
						آبیاری	آبیاری							
۵	ابتدای میوه (دانه تسبیحی)									L ۲	L ۱-۲	L ۲-۴		
										محلول پاشی	محلول پاشی	آبیاری		
۶	رنگ گیری						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰				L ۱-۲		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
۷	رنگ گیری						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰				L ۱-۲		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		

[illegible]

واحد	هکتار	جدول کوددهی											انجیر آبی			
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات			
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B		
۱	بعد از برداشت												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C		
													محلول پاشی	محلول پاشی		
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g											
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g											
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g											
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g											
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)											۱ Kg در ۱۰۰ آب			
۳	تورم و جوانه زنی												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C		
													محلول پاشی	محلول پاشی		
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰									۲۰۰-۲۰۰CC به ازای هر درخت از هر کدام
						آبیاری	آبیاری									
۵	تشکیل میوه نخودی شدن						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰	۳۰g				L ۱-۲			آهن: به ازای هر درخت محاسبه میشود و کل باغ آبیاری میشود.
							آبیاری	آبیاری	آبیاری				محلول پاشی			
۶	سایز و رنگ گیری												L ۲-۴	L ۱-۲	L ۲	
													آبیاری	محلول پاشی	محلول پاشی	

واحد	هکتار	جدول کوددهی											انجیر دیم			
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات			
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B		
۱	بعد از برداشت												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C		
													محلول پاشی	محلول پاشی		
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g											
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g											
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g											
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g											
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)												۱ Kg در ۱۰۰ L آب		
۳	تورم و جوانه زنی												L ۱-۲	۲۰۰-۴۰۰C C		
													محلول پاشی	محلول پاشی		
۴	در صورت استفاده از آب کمکی ۱					۱۰۰-۲۰۰C C	۱۰۰-۲۰۰C C									
						آبیاری	آبیاری									
۵	در صورت استفاده از آب کمکی ۲					۱۰۰-۲۰۰C C	۱۰۰-۲۰۰C C									
						آبیاری	آبیاری									
۶	تشکیل میوه نخودی شدن												L ۱-۲			
													محلول پاشی			
۷	سایز و رنگ گیری												L ۱-۲	L ۱-۲	L ۲	
													محلول پاشی	محلول پاشی	محلول پاشی	

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری		نخیلات	
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات			
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B		
۱	بعد از برداشت												L ۱-۲	در صورتی که امکان محول پاشی باشد.		
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی			
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g				۳۰ g					۱-۵ ساله		
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g				۴۰ g					۶-۱۴ ساله		
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g				۵۰ g					۱۵-۲۹ ساله		
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g				۶۰ g					۳۰ سال به بالا		
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)											۱ Kg در ۱۰۰ آب			
۳	ابتدای پنگ					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			۳-۵ Kg		L ۲-۴	آهن: در صورت عدم استفاده از آهن در چالکود			
						آبیاری	آبیاری			آبیاری		آبیاری				
۴	نخودی شدن							L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰		L ۳-۴					
						آبیاری	آبیاری			آبیاری						
۵	سایز و رنگ							L ۱۰-۲۰				L ۲-۴	K۵۰: معادل ۳-۵ لیتر آبیاری			
							آبیاری				محلول پاشی	آبیاری				

واحد	هکتار	جدول کوددهی											انبه
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	
۱	بعد از برداشت											۲۰۰-۴۰۰C C	L ۱-۲
												محلول پاشی	محلول پاشی
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g								
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g								
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g								
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g								
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)											۱ Kg در ۱۰۰ آب
۳	قبل از گلدهی											۲۰۰-۴۰۰C C	L ۱-۲
												محلول پاشی	محلول پاشی
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰						
						آبیاری	آبیاری						
۵	تشکیل میوه نخودی شدن					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰	۳-۵ Kg	L ۲				
						آبیاری	آبیاری	آبیاری	محلول پاشی				
۶	سایز و رنگ گیری					L ۱۰-۲۰						L ۲-۴	
						آبیاری					محلول پاشی	آبیاری	

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری	انار
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	بعد از برداشت									L ۲		۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۲۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									۱-۴ ساله
		۱۵۰g	۳۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									۵-۹ ساله
		۲۰۰g	۴۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g									۱۰-۱۴ ساله
		۲۵۰g	۵۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g									۱۵ ساله به بالا
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۳-۲ Kg تریکودرما توصیه میشود.										۱ Kg در ۱۰۰ L آب		
۳	حنایی شدن											۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰							
						آبیاری	آبیاری							
۵	ابتدای میوه					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰					L ۱-۲		
						آبیاری	آبیاری					محلول پاشی		
۶	تشکیل دانه					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			L ۲		L ۲-۴		
						آبیاری	آبیاری			محلول پاشی		آبیاری		
۷	پر کردن میوه و رنگ گیری					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			Kg ۲-۵	L ۲	L ۲-۴		
						آبیاری	آبیاری			آبیاری	محلول پاشی	آبیاری		

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری	گردو
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	بعد از برداشت									L ۲		۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									۱-۵ ساله
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									۶-۱۴ ساله
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g									۱۵-۲۹ ساله
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g									۳۰ سال به بالا
		همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)										۱ Kg در ۱۰۰ L آب		
۳	تورم و جوانه زنی											۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰							۲۰۰-۴۰۰ C C به ازای هر درخت از هر کدام
						آبیاری	آبیاری							
۵	ابتدای میوه						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰				L ۲-۴		
							آبیاری	آبیاری				آبیاری		
۶	پرشدن مغز						L ۱۰-۲۰		Kg ۳-۵	L ۲	L ۲-۴			
							آبیاری		آبیاری	محلول پاشی	آبیاری			
۷	سایزگیری					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰				L ۲-۴	L ۲-۴		
						آبیاری	آبیاری				آبیاری	آبیاری		

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری	موز
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	بعد از برداشت (احیای بوته مادری)	g ۱۵۰	g ۲۰۰	g ۱۵۰	g ۱۵۰							۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	شروع رشد برگها (۵-۱ برگ)						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰						
							آبیاری	آبیاری						
۳	رشد رویشی شدید (۱۲-۶ برگ)					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰					L ۱-۲		
						آبیاری	آبیاری					محلول پاشی		
۴	قبل از گلدهی											۲۰۰-۴۰۰ C C	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۵	تشکیل ریز میوه ها						L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			L ۲	L ۴-۵		
							آبیاری	آبیاری			محلول پاشی	آبیاری		
۶	پرسیدن مغز					L ۱۰-۲۰						L ۲-۴		
						آبیاری						آبیاری	آبیاری	

واحد	هکتار	جدول کوددهی											پسته	باغداری
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	بعد از برداشت													L ۱-۲
														محلول پاشی
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۳۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									
		۱۵۰g	۴۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									
		۲۰۰g	۵۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g									
		۲۵۰g	۶۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g									
۳	تريکودرما	همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۳-۲ Kg تريکودرما توصیه میشود. (۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت در چالکود)											۱ Kg در ۱۰۰ L آب	
	ضدشوری	همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۵-۱۰ لیتر ضدشوری توصیه میشود.												
۴	تورم و جوانه زنی													L ۱-۲
														محلول پاشی
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰						L ۲-۴	
						آبیاری	آبیاری						آبیاری	
۵	ارزنی شدن					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			L ۲	L ۲			
						آبیاری	آبیاری			محلول پاشی	محلول پاشی			
۶	قب از سخت شدن پوسته استخوانی							L ۱۰-۲۰					L ۱-۲	
								آبیاری					محلول پاشی	
۷	پرشدن مغز						L ۱۰-۲۰			Kg ۳-۵	L ۲	L ۳-۵		
						آبیاری			آبیاری		محلول پاشی	آبیاری		
بین مرحله ارزنی شدن و پوسته استخوانی و پوسته استخوانی و پر کردن مغز مصرف ۵-۱۰ L گابری سوئیت توصیه میشود.														ضد شوری ۱

واحد	هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	چای آبی
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
۲	ابتدای فصل رشد					L ۵-۱۰	L ۵-۱۰							
						آبیاری	آبیاری							
۳	قبل از هر چین								Kg ۱-۳			L ۲-۴		
									آبیاری			آبیاری		
۴	بعد از چین							L ۵-۱۰						۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
								آبیاری						

واحد	هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	چای دیم
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت	۱۰۰-۲۰۰Kg	۱۵۰-۲۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg	۷۵-۱۰۰Kg									۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
۲	ابتدای فصل رشد					L ۵-۱۰	L ۵-۱۰							
						آبیاری	آبیاری							
۳	قبل از هر چین								Kg ۱-۳			L ۲-۴		
									آبیاری			آبیاری		
۴	بعد از چین							L ۵-۱۰						۱-۲ Kg تریکودرما شدیداً توصیه میشود.
								آبیاری						

واحد	۱۰۰۰متر مربع	جدول کوددهی											کشاوری	گلخانه
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		Zn-B
۱	بستر کشت	۵۰-۱۰۰Kg	۵۰-۱۰۰Kg	۵۰-۱۰۰Kg	۵۰-۱۰۰Kg									
۲	انتقال نشا						L ۲	L ۲					۱-۲ Kg ترکیب در ما شدیداً توصیه میشود.	
							آبیاری	آبیاری						
۳	رشد بوته					آبیاری	آبیاری	۱-۳L	۳-۵L			۲۰۰-۴۰۰CC		
											محلول پاشی			
۴	قبل از گلدهی											۲۰۰-۴۰۰CC		
										محلول پاشی		محلول پاشی		
پیک برداشت بار	آب اول						L ۱	L ۲				۲۰۰-۴۰۰CC	۱-۲ Kg ترکیب در ما شدیداً توصیه میشود.	
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
	آب سوم						L ۱	L ۲				۲۰۰-۴۰۰CC		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
	آب پنجم						L ۱	L ۲				۲۰۰-۴۰۰CC		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
	آب هفتم						L ۱	L ۲				۲۰۰-۴۰۰CC		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
	آب یازدهم						L ۱	L ۲				۲۰۰-۴۰۰CC		
							آبیاری	آبیاری				محلول پاشی		
این روند را تا پایان پیک برداشت بار تکرار کنید.														
نکته ۱	در صورت نیاز به گلدهی دوباره مرحله قبل از گلدهی را تکرار نمایید.													
نکته ۲	مصرف ۱-۲ لیتر ضدشوری (گابری سویت) هر هفته بصورت آبیاری توصیه میشود.													

واحد	هکتار	جدول کوددهی											باغداری	زرشک
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											Zn-B	توضیحات
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	کینک	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری		
۱	بعد از برداشت									L ۲		C C ۲۰۰-۴۰۰	L ۱-۲	
										محلول پاشی		محلول پاشی	محلول پاشی	
۲	چالکود زمستانه	۱۰۰g	۲۰۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									۱-۵ ساله
		۱۵۰g	۳۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									۶-۱۴ ساله
		۲۰۰g	۴۰۰g	۲۰۰g	۲۰۰g									۱۵-۲۹ ساله
		۲۵۰g	۵۰۰g	۲۵۰g	۲۵۰g									۳۰ ساله به بالا
		تریکودرما همراه با آبیاری زمستانه، مصرف ۲-۳ Kg تریکودرما توصیه میشود.											۱ Kg در ۱۰۰ L آب	
۳	تورم و جوانه زنی											C C ۲۰۰-۴۰۰	L ۱-۲	
												محلول پاشی	محلول پاشی	
۴	آب استارت					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰							
						آبیاری	آبیاری							
۵	ابتدای میوه					L ۱۰-۲۰	L ۱۰-۲۰			L ۲				
						آبیاری	آبیاری			محلول پاشی				
۶	رنگ گیری							L ۱۰-۲۰	۳-۵ Kg			L ۱-۲		
						آبیاری	آبیاری					محلول پاشی		

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی											کشاورزی	کشت دیم (گندم/جو/کلزا/حیویات)
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۱	زیرکشت		۵۰-۱۵۰ کیلو	Kg ۵۰-۱۰۰	Kg ۵۰-۱۰۰									
۲	در صورت استفاده از آب کمکی					L ۵-۱۰	L ۵-۱۰							
						آبیاری	آبیاری							
در صورت استفاده از محلول پاشی	مراحل ابتدایی رشد											L ۱-۲		-
												محلول پاشی		
	مراحل انتهایی رشد											L ۱-۲		
												محلول پاشی	محلول پاشی	

واحد	درخت	جدول کوددهی											باغداری	درختان زینتی / غیرمثمر
مرحله	زمان مصرف	میزان مصرف / روش مصرف											توضیحات	
		هوموس	گابری گلدن	بایوگابری فسفات	بایوگابری پلاس	گابری کینگ	گابری هیومیک	کود ماهی	Fe	Ca.B+N	K50	میکروگابری	Zn-B	
۲	چالکود زمستانه	۵۰g	۱۰۰g	۵۰g	۵۰g									نهال (۱-۲ ساله)
		۱۰۰g	۱۵۰g	۱۰۰g	۱۰۰g									نیمه بالغ
		۱۵۰g	۲۰۰g	۱۵۰g	۱۵۰g									بالغ (رسیدن به شکل و سایز نهایی)
		تریکودرما											۱ Kg در ۱۰۰ L آب	
۳	رشد رویشی بهاره					CC ۵۰-۱۰۰	CC ۵۰-۱۰۰					L ۱-۲		
						آبیاری	آبیاری					محلول پاشی		
۴	رشد رویشی تابستانه					CC ۵۰-۱۰۰	CC ۵۰-۱۰۰							
						آبیاری	آبیاری							

واحد	۱ هکتار	جدول کوددهی	گابری سوئیت (ضد شوری)
ردیف	میزان EC ds/m	میزان مصرف	روش مصرف
۱	کمتر از ۲	۵ تا ۱۰ L در هکتار	محلول در آب بصورت آبیاری
۲	بین ۲ تا ۴	۱۰ تا ۱۵ L در هکتار	محلول در آب بصورت آبیاری
۳	بین ۴ تا ۶	۱۵ تا ۲۰ L در هکتار	محلول در آب بصورت آبیاری
۴	بیشتر از ۶	۲۰ تا ۳۰ L در هکتار بطور متناوب تا رسیدن به میزان مطلوب	محلول در آب بصورت آبیاری

گابری تریکودرما	در هر دوره کشت، ۱ تا ۲ دوره مصرف تریکودرما توصیه میشود.	بذر مال	۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرم به ازای هر ۱۰۰ Kg بذر
		زیرکشت	۱ - ۲ Kg ترکیب با کودهای زیرکشت
		آبیاری	۲ تا ۴ Kg در ۲۰۰ الی ۴۰۰ L آب
		آبیاری	۱ تا ۲ Kg در ۱۰۰ الی ۲۰۰ L آب
مصرف قارچ کش های شیمیایی اکیدا ممنوع است.			

بذر مال	تریکودرما	۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرم به ازای هر ۱۰۰ Kg بذر	در صورت عدم استفاده از بذرهای اصلاح شده یا آغشته به قارچ کش، میتوانید بذر مال انجام دهید.
	هیومیک	۱ L ترکیب با ۱۰۰ Kg بذر	

دوز مصرف محلول پاشی محصولات گابریست					
۱	Fe	محلول پاشی	آبیاری	۱ - ۱.۵ Kg در ۱۰۰۰ L آب	۳ - ۵ Kg در هکتار
۲	Ca.B+N			۲ L در ۱۰۰۰ L آب	۳ L در هکتار
۳	K50			۱ - ۲ L در ۱۰۰۰ L آب	۳ - ۵ L در هکتار
۴	میکرو			۱ - ۲ L در ۱۰۰۰ L آب	۳ - ۵ L در هکتار
۵	Zn.B			۱ - ۲ L در ۱۰۰۰ L آب	-

نکات مهم در استفاده از جدول کوددهی

۱	سیاه درخت: درختان با شاخه های سیاه و تیره (هسته داران) مانند هلو ، آلوها ، سیب ، بادام ، گیلاس ، آلبالو ، شلیل ، خرمالو ، گلابی ، به ، زیتون ، کیوی ، گوجه سبز ، ازگیل ، عناب ، کیالک
۲	صیفی جات: گوجه فرنگی، بادمجان،خیار ، فلفل ها ، کدو
۳	برنامه کشت های جالیزی دقیقاً مشابه صیفی جات میباشد.
۴	غده و ریشه: سیب زمینی ، پیاز ، سیر ، هویج ، چغندر و ...
۵	از مصرف همزمان Ca.B+N با کودهای دیگر جداً خودداری کنید.
۶	از مصرف همزمان گابری تریکودرما با قارچ کش های شیمیایی و سموم حاوی مس جداً خودداری کنید.