

Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas

Física 3

Profesor: Edgar Cifuentes Auxiliar: Diego Sarceño



## Hoja de Trabajo 8

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas a LATEXo a mano con letra clara y legible, dejando constancia de sus procedimientos. No es necesaria la carátula, únicamente su identificaciónn y las respuestas encerradas en un cuadro.

## Ejercicio 1 Conceptos:

- a) Demuestre que la fuerza magnética no realiza trabajo.
- b) Considere un electrón en un campo eléctrico y magnético perpendiculares.
  - ¿Qué trayectoria describe?
  - ¿Cómo cambia dicha trayectoria si lo que viaja es un protón?
  - ¿Qué pasa si la molécula es neutra?

## Ejercicio 2

Sabiendo que el momento dipolar magnético de una espira está dado por

$$\vec{\mu} = \oint_{\Gamma} (\vec{r} \times I \, \mathrm{d}\vec{r}),$$

donde  $\Gamma$  es la espira. Encuentre el momento dipolar magnético de una espira triangular con lados  $L, L y \sqrt{2}L$  y de una espira circular de radio a. Compare estos resultados con los obtenidos de la ecuación  $|\vec{\mu}| = IA$  con dirección dada por la regla de la mano derecha.

Hint: El sentido de integración está dado por la corriente. Divida la espira en segmentos.

## Ejercicio 3

Un disco metálico, de masa m y radio a, se encuentra situado en una región en la que existe un campo magnético uniforme,  $\vec{B}$ , dirigido según su eje. Si el disco se pone a girar con velocidad angular  $\vec{\omega}$ , se establece una diferencia de potencial,  $\Delta V$ , entre el borde del disco y su eje de rotación.

- a) Determine la fuerza magnética sobre las cargas libres del metal.
- b) Cuando se alcanza el estado estacionario, la resultante de las fuerzas eléctrica y magnética sobre las cargas libres del metal es nula. Si la velocidad angular  $\vec{\omega}$  y el campo magnético

tienen el mismo sentido, demuestre que la diferencia de potencial es

$$\Delta V = \frac{\Phi_B}{T},$$

donde  $\Phi_B$  es el flujo de campo magnético y T el periodo de rotación.

c) Imagine que se conecta una resistencia exterior, R, entre el eje y el borde del disco, de forma que permita el paso de corriente. La diferencia de potencial es la misma que existiría con el circuito abierto para esa velocidad angular. Llevando a cabo un balance de energía, demuestre que la energía cinética de rotación del disco,  $E_c$ , disminuye con el tiempo, por efecto Joule, de acuerdo con

$$\frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{E_c}{\tau},$$

donde  $\tau$  es un tiempo característico (con una idea parecida al de la constante de tiempo en un circuito RC). Exprese  $\tau$  en términos de los parámetros conocidos.




Figura 1: Disco de Faraday.