



TAREA 3



Problema 1

Problema 2

Se toma una integral auxiliar para llegar a las integrales propuestas

$$\int_{|z|=1} e^{-iz^n} dz.$$

Como la integral esta sobre el circulo unitario, parametrizando la curva

$$z = \cos \theta + i \sin \theta,$$

de esto, sustituyendo la integral

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin n\theta} [\cos(-\cos n\theta) + i \sin(-\cos n\theta)] [-\sin \theta + i \cos \theta] d\theta.$$



Separando parte real y parte imaginaria, y utilizando identidades trigonométricas,

$$\begin{aligned} & - \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} [\sin \theta \cos(-\cos n\theta) + \cos \theta \sin(-\cos n\theta)] d\theta + i \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} [\cos \theta \cos(-\cos n\theta) - \sin \theta \sin(-\cos n\theta)] d\theta \\ & - \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} \sin(\theta - \cos n\theta) d\theta + i \int_0^{2\pi} e^{\sin \theta} \cos(\theta - \cos n\theta) d\theta. \end{aligned}$$

Además, como la función e^{-iz^n} es claro que es holomorfa en el circulo unitario; entonces, por Cauchy, la integral es cero

$$\int_{|z|=1} e^{-iz^n} dz = 0.$$

Por lo que, la parte real y parte imaginaria de la integral deben de ser cero, lo que demuestra que las integrales propuestas son cero.

Problema 3

Definiendo la función



$$g(z) = \frac{f(z)}{z - z_o},$$

derivando respecto a z

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{z - z_o} - \frac{f(z)}{(z - z_o)^2}.$$

Integrando la función propuesta, como $z_o \notin \gamma$ ni a su interior, entonces $g'(z)$ es holomorfa en γ :

S

$$\oint_{\gamma} g'(z) dz = 0.$$

Por lo que

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{z - z_o} dz = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_o)^2} dz.$$

□

Problema 4

Dada la parametrización $\gamma(t) = re^{it}$, para la integral

$$\int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z} dz,$$

sustituyendo en la integral,

$$\int_0^{\pi} \pi e^{ir(\cos t + i \sin t)} \frac{1}{re^{it}} ire^{it} dt.$$

S

Simplificando

$$\int_0^{\pi} \pi e^{-r \sin t} (i \cos(r \cos t) - \sin(r \cos t)) dt,$$

esto es análogo a las soluciones de estado estable de ecuaciones diferenciales, en este caso no hay parte estable, solo transitoria, de modo que, al realizar el límite

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} e^{-r \sin t} (i \cos(r \cos t) - \sin(r \cos t)) dt = 0,$$

obviamente, la analogía es para la variable r .

S

Problema 5

S

Problema 6

Problema 7

Incisos:

S

- a) En γ el número de raíces del polinomio para la función dada, son singularidades de dicha función, puesto que cada polinomio (por teorema fundamental del álgebra) se puede representar de la siguiente forma

$$f(z) = (z - z_1)^{d_1} \cdots (z - z_n)^{d_n},$$

donde $\sum d_i = m$ con $n \leq m$, d_i la multiplicidad de cada raíz y m el grado de f . Suponiendo que de las n raíces p de ellas están dentro de γ , $p \leq n$. Se realiza la derivada del polinomio

$$f'(z) = d_1(z - z_1)^{d_1-1} \cdots (z - z_n)^{d_n} + \cdots + (z - z_1)^{d_1} \cdots d_n(z - z_n)^{d_n-1},$$

con esto, se dividen ambas funciones y se separan en n fracciones

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{d_1(z - z_1)^{d_1-1} \cdots (z - z_n)^{d_n} + \cdots + (z - z_1)^{d_1} \cdots d_n(z - z_n)^{d_n-1}}{(z - z_1)^{d_1} \cdots (z - z_n)^{d_n}}$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{d_1}{z - z_1} + \cdots + \frac{d_n}{z - z_n}.$$

Al momento de integrar, todas aquellas raíces que no esten dentro de γ , por cauchy, la integral será cero, para las p raíces dentro, se utiliza la primera fórmula de integración de cauchy, se tiene

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = d_1(2\pi i) + \cdots + d_p(2\pi i)$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^p d_i,$$

lo que es el número de raíces dentro de γ contando sus multiplicidades.

b)

Problema 8

Como f es holomorfa en γ ; además, es acotada por $M = 1$ en dicha región. Por la desigualdad de cauchy

Problema 9

Problema 10