



TAREA 1

1. Problema 1

Tomando dos estados $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$ y dos operadores hermíticos A, B , entonces, por definición, se tiene

$$\begin{aligned}\langle\psi|A|\phi\rangle &= \langle\phi|A|\psi\rangle^* \\ \langle\psi|B|\phi\rangle &= \langle\phi|B|\psi\rangle^*\end{aligned}$$

por linealidad, sumamos ambas expresiones

$$\begin{aligned}\langle\psi|(A|\phi\rangle + B|\phi\rangle) &= [\langle\phi|(A|\psi\rangle + B|\psi\rangle)]^* \\ \langle\psi|(A+B)|\phi\rangle &= \langle\phi|(A+B)|\psi\rangle^*.\end{aligned}$$

Con esto, queda demostrado que $(A+B) = (A+B)^\dagger$

2. Problema 2

Teniendo dos operadores unitarios U_1 y U_2 , tomamos el nuevo operador U_1U_2 , con esto, aplicamos su operador adjunto

$$\begin{aligned}U_1U_2(U_1U_2)^\dagger &= U_1 \underbrace{U_2U_2^\dagger}_{=I} U_1^\dagger \\ U_1U_1^\dagger &= I,\end{aligned}$$

esto se cumple por propiedades de los operadores unitarios, y se demuestra que U_1U_2 es unitario.

3. Problema 3

Dado $C = i[A, B]$ con A, B hermíticos, tomando el adjunto de C

$$\begin{aligned}C^\dagger &= i^*[A, B]^\dagger = -i\left((AB)^\dagger - (BA)^\dagger\right) \\ &= -i\left(B^\dagger A^\dagger - A^\dagger B^\dagger\right) \\ &= -i(BA - AB) \\ &= i(AB - BA) = C.\end{aligned}$$

Con esto queda demostrado que el operador C es hermítico.

4. Problema 4

Dados A y B hermíticos:

- a) (\Rightarrow) dado que $AB = (AB)^\dagger$, tomando el lado derecho $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger = BA$, esto implica que $[A, B] = 0$, por lo que conmutan. \square
 (\Leftarrow) Dado que $[A, B] = 0$, entonces $0 = AB - BA = AB - B^\dagger A^\dagger = AB - (AB)^\dagger = 0$, lo que implica que AB es hermítico. \square
- b) Dado $(A + B)^n$ tomamos el binomio de newton y aplicamos el adjunto

$$\begin{aligned} (A + B)^{n\dagger} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (A^{n-k} B^k)^\dagger \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (B^\dagger)^k (A^\dagger)^{n-k} \end{aligned}$$

renombrando los exponentes (esto se puede hacer puesto solo es cambiar el orden de las sumas y los operadores son conmutativos respecto a la suma)

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^{n-k} A^k = (B + A)^n = (A + B)^n$$

entonces, $(A + B)^n$ es hermítico \square

5. Problema 5

Dado un operador A

$$(A + A^\dagger)^\dagger = A^\dagger + (A^\dagger)^\dagger = A^\dagger + A \quad \square$$

y

$$\left[i(A - A^\dagger) \right]^\dagger = i^*(A^\dagger - A) = i(A - A^\dagger).$$

6. Problema 6

Dado un A hermítico, entonces $(e^{iA})^\dagger = e^{-iA^\dagger} = e^{-iA}$ esto es fácil ver debido a la expansión Taylor de la exponencial. Con esto

$$(e^{iA})(e^{-iA}) = I.$$

7. Problema 7

Tomando un estado cualquiera $|\phi\rangle = a_j |\alpha_j\rangle$, entonces definimos $A = \sum_i |\alpha_i\rangle\langle\alpha_i|$, aplicando A al estado, se tiene

$$A|\phi\rangle = \sum_i \sum_j a_j |\alpha_i\rangle \underbrace{\langle\alpha_i|\alpha_j\rangle}_{\delta_{ij}}.$$



Dado que la delta de kronecker es 1 solo cuando $i = j$, entonces simplificando la expresión se tiene

$$\Rightarrow \sum_i a_i |\alpha_i\rangle = |\phi\rangle,$$

lo que implica que $A = I$

□

8. Problema 8