

# Lección 6

José David Ruiz Álvarez

josed.ruiz@udea.edu.co

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

**Universidad de Antioquia**

4 de septiembre de 2018

## 1. Solución numérica de ecuaciones diferenciales

Definimos de forma general una ecuación diferencial como

$$y' = f(x, y); y(x_0) = y_0 \quad (1)$$

### 1.1. Método de Euler

Basado en la aproximación de la derivación como la diferencia media entre dos puntos de una función. La solución de la ecuación diferencial en el punto  $x_n$  es usada para aproximar la solución en el punto  $x_{n+1}$ . Definimos:

$$h = (b - a)/N = x_{n+1} - x_n; n = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (2)$$

definición con la cual podemos encontrar

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (3)$$

Definimos el error de truncamiento (asociado a tomar valores discretos sobre  $x$ ) como la diferencia entre la solución numérica y la solución exacta de la ecuación diferencial en un paso, asumiendo que ambas soluciones son exactamente iguales en todos los pasos anteriores. El error del método de Euler sería entonces asociado a  $y(n+1) - y_{n+1} \approx \mathcal{O}(h^2)$

El método mejorado de Euler usa la tangente a la curva en el punto medio entre dos pasos para aproximar la solución en el punto  $n+1$  en lugar de la tangente en el punto  $n$ . Es definido por:

$$y_{n+1/2} = y_n + \frac{1}{2}hy'_n; y'_{n+1/2} = f(x_{n+1/2}, y_{n+1/2}); y_{n+1} = y_n + hy'_{n+1/2} \quad (4)$$

este método tiene un error de truncamiento de  $\mathcal{O}(h^3)$ .

**Ejercicio 1:** Basado en el ejemplo dado en clase implemente el método mejorado de Euler y compare el error de truncamiento con el método de Euler.

## 1.2. Convergencia

Decimos que un esquema de partición  $(x_0, \dots, x_n)$  converge si

$$\lim_{h \rightarrow 0} |y_n - y(x_n)|; \quad nh = x_n - x_0 \tag{5}$$