

Capítulo 2

Variáveis Aleatórias e Distribuições

Experimento Aleatório

Não existe uma definição satisfatória de Experimento Aleatório. Os exemplos dados são de fenômenos para os quais modelos probabilísticos são adequados e por simplicidade, são denominados de experimentos aleatórios.

Ao descrever um experimento aleatório deve-se especificar não somente que operação ou procedimento deva ser realizado, mas também o que é que deverá ser observado.

E1: Joga-se um dado e observa-se o número obtido na face superior.

E2: Joga-se uma moeda 4 vezes e observa-se o número de caras obtido.

E3: Uma lâmpada nova é ligada e observa-se o tempo gasto até queimar.

E4: Lançam-se dois dados e anota-se a soma dos pontos.

Características dos Experimentos Aleatórios

Observando-se os exemplos acima pode-se destacar algumas características comuns:

- 1 Podem ser repetidos indefinidamente sob as mesmas condições.
- 2 Não se pode adiantar um resultado particular, mas pode-se descrever todos os resultados possíveis
- 3 Se repetidos muitas vezes apresentarão uma regularidade em termos de frequência de resultados.

Espaço Amostral:

é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Se denota por Ω

Evento:

é qualquer subconjunto do espaço amostral (Ω). Denotamos por A, B, C, \dots

Operações com Eventos

Dados os eventos $A, B \in \Omega$

- **Igualdade de eventos:** $(A = B)$ A e B são iguais se $A \subset B$ e $B \subset A$.
- **União de eventos:** $(A \cup B)$ evento formado pelos sucessos que pertencem a A ou a B ou a ambos.
- **Interseção de eventos:** $(A \cap B)$ evento formado por todos os sucessos favoráveis a A e a B.
- **Diferença de eventos:** $(A - B)$ evento formado pelos sucessos favoráveis a A e que não são favoráveis a B.
- **Complemento:** (A^c) evento formado por todos os sucessos que não pertencem a A

Algumas Propriedades

Dados os eventos $A, B, C \in \Omega$

Lei Distributiva:

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Lei de DeMorgan:

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Definição Clássica de Probabilidades

A definição clássica de probabilidades foi dada por Laplace em sua obra *Teoria Analítica das Probabilidades*, publicada em 1812. Esta definição baseia-se no suposto que todos os resultados possíveis de um experimento aleatório são igualmente prováveis, isto é, cada um dos elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade de sair. Sejam $N(\Omega) = n_\Omega$: número de elementos do espaço amostral
 $N(A) = n_A$: número de elementos do evento A
Assim a probabilidade do evento A acontecer é

$$P(A) = \frac{n_A}{n_\Omega} = \frac{\text{número de casos favoráveis ao evento A}}{\text{número de casos possíveis}}$$

Definição Formal de Probabilidades

Uma função $P(.)$ é denominada probabilidade se satisfaz:

- 1 $\forall A \subset \Omega, \quad 0 \leq P(A) \leq 1$
- 2 $P(\Omega) = 1$
- 3 Se os eventos A_j 's são disjuntos ou mutuamente exclusivos, então $P(\cup_{j=1}^n A_j) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$

Propriedades

- 1 Se ϕ é o evento impossível então $P(\phi) = 0$
- 2 $P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(A) = 1 - P(A^c)$
- 3 Sejam os eventos A e B tais que $A \subset B$ então $P(A) \leq P(B)$
- 4 Sejam A e B dois eventos então
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- 5 Sejam A, B e C três eventos então

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Variável Aleatória

Seja E um experimento aleatório e Ω o espaço amostral associado. Uma função de X que associa cada elemento em Ω , a um número real $X(\omega)$ é denominado **variável aleatória**.

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Variável Aleatória Discreta

Quando a imagem da variável aleatória X é um conjunto finito ou infinito enumerável.

Variável Aleatória Contínua

Quando a imagem de uma variável aleatória X é um intervalo sob a reta dos números reais.

Variável Aleatória Discreta

Função de Probabilidade

A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta é uma função que atribui probabilidades a cada um dos possíveis valores assumidos pela variável.

$$p(x_i) = P(X = x_i) = P(\{w \in \Omega | X(w) = x_i\})$$

Uma função de probabilidade satisfaz

1 $0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \forall i$

2 $\sum_i p(x_i) = 1$

Função de Distribuição ou Função Acumulada de Probabilidade

é definida por:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad \forall x$$

Algumas distribuições discretas

Distribuição Bernoulli ($X \sim B(p)$)

Dizemos que uma variável aleatória X tem *Distribuição Bernoulli com parâmetro p* ($0 \leq p \leq 1$), se X assume apenas os valores 0 e 1, assim as probabilidades ficam:

$$P(X = 1) = p \quad \text{e} \quad P(X = 0) = 1 - p$$





Sua função de probabilidade é dada por:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

A esperança e variância é dada por:

$$\mu = E(X) = p \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Distribuição Bernoulli



Algumas distribuições discretas

Distribuição Binomial ($X \sim Bi(n, p)$)

Considere n ensaios de Bernoulli independentes, com probabilidade de sucesso p . A variável aleatória X que conta o número total de sucessos é uma variável Binomial com parâmetros n e p e sua função de probabilidade é dada por:





$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

onde $\binom{n}{x} = \frac{n!}{(n-x)!x!}$

A esperança e variância é dada por:

$$\mu = E(X) = np \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Distribuição Binomial



Algumas distribuições discretas

Distribuição Multinomial

A distribuição multinomial é uma generalização da binomial; na binomial, temos n repetições de um experimento de Bernoulli e a variável em estudo, que segue a distribuição binomial, corresponde ao número de sucessos obtidos. Os experimentos de Bernoulli se caracterizam pelo fato de haver apenas dois resultados possíveis, que são, então, denotados por 0 (fracasso) e 1 (sucesso). Na distribuição multinomial, temos n repetições independentes de um experimento que tem k resultados possíveis, com respectivas probabilidades dadas por p_1, p_2, \dots, p_k e $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. O vetor aleatório em estudo é (X_1, X_2, \dots, X_k) , onde X_i é o número de ocorrências do i -ésimo resultado.

Algumas distribuições discretas

Distribuição Multinomial

Considere n repetições independentes de um experimento aleatório; em cada repetição há k possíveis resultados com probabilidades p_1, p_2, \dots, p_k . Se X_i é o número de ocorrências do i -ésimo resultado, então o vetor (X_1, X_2, \dots, X_k) tem distribuição multinomial com parâmetros $n, k, p_1, p_2, \dots, p_k$ cuja distribuição de probabilidades é dada por

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$$

onde x_1, \dots, x_k são números inteiros não negativos satisfazendo $\sum_{i=1}^k x_i = n$ e $\sum_{i=1}^k p_i = 1$

A esperança e variância é dada por:

$$\mu_i = E(X_i) = np_i \quad \sigma_i^2 = \text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

Função de Densidade de Probabilidade:

Dizemos que $f(x)$ é uma **função de densidade de probabilidade** para uma variável contínua X se satisfaz duas condições

❶ $f(x) > 0, \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$

❷ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Função de Distribuição Acumulada:

Seja X uma v.a. contínua com função de densidade $f(x)$. A **função de distribuição acumulada**, denotada por $F_X(x)$ é definida por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad \forall x \in R$$

Observações

- 1 $f(x)$ não representa probabilidades, a integral de $f(x)$ entre dois pontos produz uma probabilidade.
- 2 Seja $x_0 \in R$

$$P(X = x_0) = P(x_0 < X \leq x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x) dx = 0$$

- 3 Se X é uma variável contínua, então

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b)$$

Propriedades

- 1 $0 \leq F_X(x) \leq 1, \quad \forall x \in R$
- 2 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$
- 3 $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x f(t)dt = 1$
- 4 A função de distribuição acumulada é não decrescente, isto é, se $a \leq b \Rightarrow F_X(a) \leq F_X(b)$
- 5 $\lim_{h \rightarrow 0} F_X(x+h) = F(x), \quad \forall x \in R$, com $h > 0$, isto é F_X é contínua à direita em todos os pontos
- 6 Do segundo teorema fundamental do cálculo, temos que, se F_X é uma função derivável, então $f(x) = \frac{d}{dx}(F_X(x))$, isto é, podemos encontrar a função densidade a partir da função de distribuição

Valor Esperado

Seja X uma v.a. com imagem Img_X e função de probabilidade $p(x) = P(X = x)$ se X for discreta e função de densidade $f(x)$ se X contínua. O **valor esperado ou esperança matemática** de X denota-se por $E(X)$ ou μ e define-se da maneira seguinte:

- Se X for uma variável aleatória discreta

$$E(X) = \sum_{x_i \in Img_X} x_i p(x_i) = \sum_{x_i \in Img_X} x_i P(X = x_i)$$

- Se X for uma variável aleatória contínua

$$E(X) = \int_{x \in Img_X} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

sempre que $\sum_{x_i \in Img_X} x_i p(x_i)$ seja absolutamente convergente e $\int_{x \in Img_X} x f(x) dx$ seja finita, respectivamente.

Propriedades

Se X é uma variável aleatória e a, b constantes, então

- 1 $E(a) = a$
- 2 $E(aX) = aE(X)$
- 3 $E(aX + b) = aE(X) + b$

Variância

Seja X uma v.a. com imagem Img_X e função de probabilidade $p(x) = P(X = x)$ se X for discreta e função de densidade $f(x)$ se X contínua. A **variância** de X denota-se por $Var(X)$ ou σ^2 é definida como:

$$Var(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$$

- Se X for uma variável aleatória discreta

$$Var(X) = \sum_{x_i \in Img_X} (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)$$

- Se X for uma variável aleatória contínua

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

Propriedades

Se X é uma variável aleatória e a, b constantes, então

- 1 $Var(X) \geq 0$
- 2 Se $X = a$ com probabilidade 1, $Var(X) = 0$
- 3 $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Uniforme ($X \sim U((a, b))$)





Uma variável aleatória X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$, $a < b$, se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \text{ se } a \leq x \leq b$$

A esperança e variância é dada por:

$$\mu = E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribuição Uniforme



Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Gamma ($X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$)

Dizemos que uma variável aleatória X tem *Distribuição Gamma com parâmetros α e β* , ($\alpha > 0, \beta > 0$) se sua função de densidade é dada por:

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \quad \text{para } x > 0$$


onde $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx$.

A esperança e variância é dada por:


$$E(X) = \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

Distribuição Gamma


Gama(0.5, 0.5)




Gama(1, 1)



Gama(1, 10)



Gama(5, 2)



Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Exponencial ($X \sim \text{Exp}(\lambda)$)

Dizemos que uma variável aleatória X tem *Distribuição Exponencial com parâmetro β* , ($\beta > 0$) se sua função de densidade é dada por:





$$f(x) = \beta e^{-\beta x} \quad \text{para } x > 0$$

A esperança e variância é dada por:

$$E(X) = \frac{1}{\beta} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\beta^2}$$

Nota: Distribuição Exponencial é caso particular da Distribuição *Gama*(α, β) quando $\alpha = 1$.

Distribuição Exponencial



Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Beta ($X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$)

Dizemos que uma variável aleatória X tem *Distribuição Beta com parâmetros α e β* , ($\alpha > 0, \beta > 0$) se sua função de densidade é dada por:





$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \quad \text{para } 0 < x < 1$$

A esperança e variância é dada por:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)} = \frac{E(X)(1 - E(X))}{(\alpha + \beta + 1)}$$

Distribuição Beta



Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Dirichlet ($X \sim \text{Dir}(\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k)$)

Dizemos que uma variável aleatória $X = [x_1, x_2 \dots x_k]$ onde $x_j \in [0, 1], j = 1 \dots k, \sum_{j=1}^k x_j = 1$ tem *Distribuição de Dirichlet com parâmetros* $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k, \alpha_j > 0, j = 1 \dots k$, se sua função de densidade é dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma(A)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2) \dots \Gamma(\alpha_k)} x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} \dots x_k^{\alpha_k-1}$$

onde $A = \sum_{j=1}^k \alpha_j$.

A esperança e variância é dada por:

$$E(X_j) = \frac{\alpha_j}{A} \quad \text{Vax}(X_i) = \frac{\alpha_i(A - \alpha_i)}{A^2(A + 1)} = \frac{E(X_j)(1 - E(X_j))}{(A + 1)}$$

Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Normal ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)

Uma v.a. contínua X tem distribuição **Normal** com parâmetros μ e σ^2 , se sua função de densidade é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad \text{para } -\infty < x < \infty$$

- $f(x)$ é simétrica em relação à μ
- $f(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \pm\infty$
- O valor máximo que assume $f(x)$ no intervalo $[a, b]$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx$$

- A esperança e variância é dada por:

$$E(X) = \mu \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Algumas Distribuições Contínuas

Distribuição Normal Padrão ($X \sim N(0, 1)$)

Seja $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e definamos a nova variável

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Para determinar $P(a \leq X \leq b)$ calculamos

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

Estes valores são calculados por meio da tabela.

Distribuição Normal

