Этап 1

Научная проблема проекта Неравновестная агрегация, фракталы

Беличева Д. М., — Демидова Е. А., — Смирнов-Мальцев Е. Д. — Сунгурова М. М., 29 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Состав исследовательской команды

Студенты группы НКНбд-01-21

- Беличева Дарья Михайловна
- Демидова Екатерина Алексеевна
- Сунгурова Мариян Мухсиновна
- Смирнов-Мальцев Егор Дмитриевич

Вводная часть

Актуальность

Существуют разнообразные физические процессы, основная черта которых — неравновесная агрегация:

- образование частиц сажи
- рост осадков при электрическом осаждении
- распространение воды в нефти

Объект и предмет исследования

- Модели неравновесной агрегации
- Фрактальная размерность
- График зависимости числа частиц в кластере от радиуса гирации

Цели и задачи

Цель работы

Построить модели неравновесной агрегации и выявить их особенности.

Задачи

- Построить модель агрегации, ограниченной диффузией
- Построить модель баллистической агрегации
- Найти размерность, получившихся кластеров
- Построить график зависимости числа частиц в кластере от радиуса гирации

Теоретическое описание задачи

Фрактальная размерность

Агрегация, ограниченная диффузией

Агрегация, ограниченная диффузией (diffusion-limited aggregation, DLA) — первая модель агрегации, представляющая собой шумный рост, ограниченный диффузией.

Агрегация, ограниченная диффузией

У получающегося кластера может быть много различных форм, преимущественно зависящих от трёх факторов:

- положение центра агрегации;
- начальное положение движущейся частицы;
- алгоритм моделирования движения.

Агрегация, ограниченная химический реакцией

Агрегация, ограниченная химический реакцией (reaction limited aggregation, RLA) — модель агрегации, рассматривающая процессы, кинетика которых определяется химическим взаимодействием.

Баллистическая агрегация

Баллистическая модель (Ballistic particle-cluster aggregation, BPCA) — модель агрегации, в которой зародившаяся частица, двигается по прямой в случайно выбранном направлении до столкновения с частицей и последующей агрегацией.

Кластер-кластерная агрегация

Кластер-кластерная агрегации, ограниченной диффузией (diffusion-limited cluster aggregation, DLCA) — модель агрегации, при которой располагется несколько начальных частиц.

Заключение

Выводы

Во время выполнения первого этапа группового проекта мы сделали теоретическое описание моделей неравновесной агрегации и определили задачи дальнейшего исследования.

Список литературы

- 1. Медведев Д.А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. 101 с.
- 2. Sander L.M. Diffusion-limited aggregation: A kinetic critical phenomenon? Contemporary Physics, 2000.
- 3. Тыртышников А.Ю. и др. Сравнение алгоритмов DLA и RLA при моделировании пористых структур. НИИ «Центрпрограммсистем», 2017. 244 с.