




Microorganismes



Immunité = Mécanismes d'attaque des antigènes.



Coopération cellulaire :



AIDES DU SYSTEME IMMUNITAIRE

METHODES PREVENTIVES

Asepsie : Désinfection des lieux, du matériel, ...

Antiseptie : Désinfection des blessures.

Vaccination : Injection des antigènes affaiblis ou des anatoxines.

METHODES CURATIVES

Antibiotiques :

Substances d'origine biologique ;

Sulfamides :

Substances d'origine synthétique ;


Sérothérapie :

Injection du sérum contenant des anticorps spécifiques ;

Tableau de comparaison entre la vaccinothérapie et la sérothérapie.

VACCIN	SEROTHERAPIE
Action spécifique	Action spécifique
Immunisation acquise lente	Immunisation transmissible rapide
Immunisation active	Immunisation passive
Efficacité durable	Efficacité temporaire
Acte préventif	Acte curatif

Organes du système immunitaire :



PERTURBATIONS DU SYSTEME IMMUNITAIRE

ALLERGIE


S.I.D.A

SIDA : Syndrome Immuno- Déficience Acquis


V.I.H : Virus Immuno- déficience

ETAPES :

ETAPE 1 : SENSIBILISATION



ETAPE 2 : REPOSE ALLERGIQUE



Apparition des symptômes d'une crise allergique.

Primo-infection	Les anticorps anti-VIH provoquent la diminution de la quantité du virus (la personne est séropositive) avec quelques symptômes.
Phase de latence	Est une phase asymptomatique
Phase de SIDA déclaré	Apparition des maladies opportunistes

☐ Les rapports sexuels non protégés (sans utilisation de préservatif) ; ☐ De la mère séropositive au fœtus pendant la grossesse ; ☐ De la mère séropositive à son enfant lors de l'accouchement ou l'allaitement ; ☐ L'emploi de seringues contaminées par le VIH ; ☐ Les objets tranchants contaminés ;	MODE DE TRANSMISSION
☐ La fidélité conjugale (Être fidèle à un seul partenaire). ☐ L'utilisation du préservatif au cours des rapports sexuels ; ☐ L'emploi de seringues stériles et à usage unique ; ☐ La stérilisation des objets tranchants ; ☐ Contrôler le sang du donneur avant la transfusion sanguine ; ☐ Eviter la grossesse d'une femme séropositive.	MOYENS DE PREVENTION


QUELQUES PROBLEMES DU SYSTEME IMMUNITAIRE

Transfusion sanguine

GROUPE SANGUIN	A		B		AB		O	
Protéines sur la membrane des globules rouges Agglutinogène	Agglutinogène A		Agglutinogène B		Agglutinogène A Agglutinogène B		Aucun Agglutinogène	
Agglutinine (anticorps) Dans le plasma sanguine	Agglutinine anti-B		Agglutinine anti-A		Rien		Agglutinine anti-A et anti-B	
Facteur Rhésus (Rh)	Présence	Absence	Présence	Absence	Présence	Absence	Présence	Absence
Groupe sanguin définitif	A, Rh ⁺	A, Rh ⁻	B, Rh ⁺	B, Rh ⁻	AB, Rh ⁺	AB, Rh ⁻	O, Rh ⁺	O, Rh ⁻

Transfusions possibles

Rec. Don.	A ⁺	A ⁻	B ⁺	B ⁻	AB ⁺	AB ⁻	O ⁺	O ⁻
A ⁺								
A ⁻								
B ⁺								
B ⁻								
AB ⁺								
AB ⁻								
O ⁺								
O ⁻								

**MST /IST (hygiène de l'appareil génital)**

Maladie	Microbe responsable	Type de microbe	Quelques symptômes
La syphilis	Treponema pallidum	BACTERIE SPIROCHETE	Apparition d'un chancre syphilitique situé sur le gland ou sur les vulves.
La blennorragie	Gonocoque	BACTERIE	Inflammation aigue de l'urètre. Écoulement de pus au niveau des organes génitaux. Légères pertes vaginales.
La trichomonas	Trichomonas vaginalis	PROTOZOAIRE	Écoulement vaginal jaune vert abondant, avec des douleurs de la vulve.
Hépatite B	VHB	VIRUS	Fatigue, nausées, vomissements, syndrome pseudo-grippal, jaunisse.
S.I.D.A	VIH	VIRUS	Ganglions enflés au cou, aux aisselles ou à l'aîne ; ulcères dans la bouche ; rougeurs sur le tronc ou dans le visage ; nausées, vomissements ou diarrhée ; perte de poids importante ; ...
La candidose génitale	Candida albicans	CHAMPIGNON MICROSCOPIQUE	Des pertes blanches comme du lait caillé, des démangeaisons, des brûlures... Inflammation du gland et du prépuce.