

La motricité involontaire : cas du réflexe médullaire


Définition :

- Un réflexe est toute réaction involontaire du corps, soudaine et très rapide suite à une stimulation d'un organe sensoriel.
- Un réflexe médullaire est un réflexe dont le centre nerveux est la moelle épinière.

Les organes intervenant dans un réflexe médullaire :

Récepteur sensitif	Conducteur sensitif	Centre nerveux	Conducteur moteur	Organe effecteur
Recevoir le stimulus efficace et former l'influx nerveux sensitif.	Conduire l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière.	C'est la moelle épinière, elle reçoit l'I.N.S et génère l'I.N.M	Transporter l'influx nerveux moteur vers l'organe effecteur	C'est le muscle, il reçoit l'I.N.M. puis il exécute le mouvement.




Schéma simplifié des organes intervenant lors d'un réflexe médullaire :



Termes importants :

- Animal spinal : Est un animal dont l'encéphale a été détruit, mais qui garde la moelle épinière intacte.
- Arc réflexe : Est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe.
- Animal décérébré : Est un animal dont l'encéphale est détruit.
- Animal déméduqué : Est un animal dont la moelle épinière est détruite.
- I.N.M : Influx nerveux moteur. - I.N.S : Influx nerveux sensitif.

Notion de l'arc réflexe :



L'arc réflexe est le trajet emprunté par l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe. Il commence par l'organe sensitif, puis le conducteur sensitif, la moelle épinière, le conducteur moteur et finalement l'organe effecteur.