

# الإجابة النموذجية و سلم التقييم

## امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2013

المادة : علوم الطبيعة والحياة الشعبة: علوم تجريبية

محاو الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)		العلامة	
			مجزأة	المجموع
	<b>التمرين الأول (08 نقاط)</b>			08
	<b>1-</b>			
	<b>أ- التحليل:</b>			
	- زرع قطعة من ساق عديمة النواة (ب) من الأشنة ذات القبة المجعدة على جزء آخر من الساق ذات نواة من الأشنة ذات القبة المفصصة يؤدي لنمو وتجديد قبة مفصصة .		2×0.5	
	- زرع قطعة من ساق عديمة النواة من الأشنة ذات القبة المفصصة (أ) على جزء آخر من الساق ذات النواة من الأشنة ذات القبة المجعدة يؤدي إلى نمو و تجديد قبة مجعدة.			
	ب - المشكلة العلمية التي يراء معالجتها : ما هي العلاقة بين نواة الخلية والنمط الظاهري؟ أو فيما يمثّل دور النواة على مستوى الخلوي؟		0.25	
	ج - المعلومة المستنتجة: - النمط الظاهري متعلق بالنواة - ولا يتأثر بنوعية الهيولى . - أو النواة تحمل المعلومات الوراثية محددة للنوع والسلالة، كما أنها تراقب وتنظم نشاط الهيولى .		0.5	
	<b>2-أ- تحليل وتفسير:</b>			
	<b>التسجيل (س):</b>			
	التحليل: تمثل المنحنيات تطور تركيب البروتين في الجزئين ج 1 و ج 2 للاثينايلاريا قبل و بعد القطع .		2×0.25	
	ج 1: يتواصل ازدياد تركيب البروتين حسب الزمن وبمقدار معتبر ولا يتوقف بعد القطع .			
	ج 2: تصبح كمية البروتين بعد القطع ثابتة.			
	التفسير: نشاط النواة بإصدار تعليمات وراثية ساهم في تركيب البروتين، وغياب هذا النشاط ساهم في عدم تركيب البروتين.		0.25	
	<b>التسجيل (ع): التحليل</b>			
	ج 1: ازدياد كمية الـARN حسب الزمن قبل وبعد القطع .		2×0.25	
	ج 2: يتوقف تركيب الـARN بعد القطع، يصبح مستقرا (ثابت).			
	التفسير: نشاط النواة ساهم في استنساخ الـARN ( لوجود ADN في النواة) وغياب هذا النشاط ساهم في عدم استنساخ الـARN.		0.25	
	ب- العلاقة: من مقارنة الظاهرتين الملاحظتين في التسجيلين (س) و (ع) أن تركيب الـARN وتشكيل البروتين يحدثان بصفة جد متوازية و كلاهما مرتبطتان بالنواة، والنواة هي العضية الحاملة لكل المعلومات الوراثية في صورة ADN، هذا الـADN الذي يتم استنساخه داخل النواة إلى الـARN الذي ينتقل إلى الهيولى لينتجم إلى بروتين مميز للخلية .		0.5	
	- الاستنتاج: حياة الخلية مرتبطة بنشاط النواة و هذا النشاط يتمثل في الإشراف على تركيب بروتينات نوعية.		0.25	

العلامة	مجازة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	معايير الموضوع
	3×0.25	<p>ج التبيان التجريبي للعلاقة بين الظاهرتين الملاحظتين في التسجيلين س و ع و الجزء ج 1:</p> <p>المرحلة الأولى: العلاقة بين أنزاع و الـARN: تجري التجربة التالية:</p> <p>التجربة : تجري التجربة على خلايا الأميبا (كائن حي وحيد الخلية) توضع هذه الخلايا في وسط زراعي يحتوي على الثوراسيل المشع:</p> <p>- يلاحظ بعد تثبيت الخلايا و تصويرها بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي أن الإشعاع يظهر على مستوى نواة الخلايا.</p> <p>- تستخلص نواة الخلية بواسطة ممصنة مجهرية ثم تزرع في خلية أميبا أخرى غير مشعة لزعت نواتها حديثا . تعامل الأميبا بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي و كانت النتائج كما يلي:</p> <p>- يلاحظ بعد فترة زمنية الإشعاع على مستوى الهيولى ، كما يلاحظ بنسبة قليلة على مستوى النواة.</p>	
	3×0.25	<p>المرحلة الثانية: التحقق من العلاقة بين الـARN والهيولى</p> <p>التجربة: باستعمال 3 مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بنظير مشع.</p> <p>- المجموعة الأولى الخلايا الأصلية نكريات الدم الحمراء للأرنب و التي لها القدرة على تركيب الهيموغلوبين .</p> <p>- المجموعة الثانية : الخلايا البيضاء للضفدع.</p> <p>- المجموعة الثالثة : الخلية البيضاء للضفدع محقونة بالـARN الذي تم عزله و تقنيته من الخلايا الأصلية نكريات الدم الحمراء للأرنب.</p> <p>يلاحظ تشكل عند المجموعة الثالثة بروتينات مشعة خاصة بالهيموغلوبين .</p>	
	0.5	<p>التحليل: كمية الإشعاع عالية في المستخلص الخلوي الكامل، و عالية أيضا عند الجمع بين الميكروزومات و المنخفضة في باقي الأوساط.</p> <p>- الاستنتاج:</p>	
	0.5	<p>تسمح نتائج هذه التجربة باستنتاج شروط و مقر تركيب البروتين ، حيث يتم تركيب البروتين في الريبوزومات ، و هذا البناء لا يتم إلا في وجود مستخلص خلوي الذي يحتوي على الأنزيمات و أنواع الـARN و أنواع الحموض الأمينية و وجود الطاقة.</p>	
	0.25	<p>4-أ- يتم استهلاك الطاقة على هيئة ATP</p>	
	0.25	<p>ب- أن عمليات التركيب ( البناء ) تتطلب ATP و هذا لتنشيط ARNt و تنشيط بناء الروابط...</p>	
	2×0.25	<p>ج- التمثيل بواسطة منحنيات كمية الـATP</p> 	


محلور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)		العلامة
المجموع	مجزأة		
	0.25	5- تدخل البروتينات: الوثيقة (1) تظهر تجديد القبة عند الاستيولولاريا ، و القبة ما هي إلا جزء من الخلية يدخل في تركيبها البروتين ، و بذلك فإن البروتينات تدخل: - كبروتينات بنائية ( بناء الأغشية الخلوية). كبروتينات أنزيمية ( تحقيق تفاعلات عدة و متنوعة).	0.25
08	3×0.50	التمرين الثاني: (08 نقاط) I- 1- تحليل النتائج: * المجموعة (أ): عند حقن الحيوان بعصيات الدفتيريا كانت النتائج موت هذا الحيوان. * المجموعة (ب): عند حقن مجموعة حيوانات بـكلوريد البود وعصيات الدفتيريا تلاحظ موت المجموعة (2) في حين تبقى المجموعة (3) حية. - عندما تستخلص مصل من المجموعة (3) ويحقن في الحيوان (4) ثم حقنه بعصيات الدفتيريا يبقى حيا. - وعند حقن حيوان من المجموعة (3) بعصيات الدفتيريا فإن الحيوان يبقى حيا. * المجموعة (ج): عند استخلاص مصل من حيوان هذه المجموعة وحقنه في الحيوان (5) ثم حقن هذا الحيوان بعصيات الدفتيريا فإنه يموت. 2- التفسير: * موت الحيوانين (1) و (5) : * موت الحيوان (1) يرجع إلى كونه غير محصن ضد بكتيريا الدفتيريا . * موت الحيوان (5) كون أن المصل الذي حقن به الحيوان لم يقيه من عصيات الدفتيريا مما يدل على أن المصل لا يحتوي أجسام مضادة ضد سم الدفتيريا. * بقاء الحيوانين (3) و (4) على قيد الحياة: * بقاء الحيوان (3) حيا كونه سبق حقنه بعصيات الدفتيريا و كلوريد البود الذي يفقد مفعول سم الدفتيريا دون فقد قدرته على إثارة استجابة مناعية تقي هذا الحيوان من الموت عند حقنه بعصيات الدفتيريا مرة أخرى . * بقاء الحيوان (4) حيا : كونه محصن نتيجة حقنه بالمصل المستخلص من الحيوان (3) الذي يقيه ضد عصيات الدفتيريا مما يدل على أن هذا المصل يحتوي أجسام مضادة ضد عصيات الدفتيريا. 3- * الاستنتاج : نوع الاستجابة المناعية خلطية. * التعليل : كونها تمت بتدخل الأجسام المضادة كما تؤكد نتائج حقن المصل المستخلص من المجموعة (3) في الحيوان (4) وعند حقن هذا الحيوان مباشرة بعصيات الدفتيريا يبقى حيا مما يدل على تدخل الأجسام المضادة الموجودة في المصل ضد عصيات الدفتيريا.	4×0.5
	0.25	II- 1- * التعرف على الجزئية الممثل بالشكل "أ" - جسم مضاد. تسمية البيانات : 1- روابط كيريتية ، 2- سلسلة ثقيلة ، 3- سلسلة خفيفة	0.25
	0.5		0.5
	4×0.25		4×0.25


العلامة	مجزأة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	معايير الموضوع
	3×0.25  2×0.5  2×0.5	<p>2 - تحليل النتائج التجريبية الممثلة بالشكل " ب " :</p> <p>* في حالة عدم معالجة الجسم المضاد يحتفظ بقدرة التثبيت على مولد الضد والخلايا البالعة.</p> <p>* عند قطع الروابط الكبريتية في الجسم المضاد تنفصل السلاسل الخفيفة والثقيلة عن بعضها فيفقد الجسم المضاد قدرة التثبيت بمولد الضد وعلى الخلايا البالعة.</p> <p>قطع الجسم المضاد يانزيم إلى الجزئين أ- و - ب- يكون الجزء أ- يتميز بخاصية التثبيت على مولد الضد ، والجزء ب- يتميز بخاصية التثبيت على الخلايا البالعة.</p> <p>3- تبيان كيفية مساهمة السلاسل 2 والسلاسل 3 في تحديد الخواص الوظيفية للعناصر المعنية :</p> <p>• تحدد السلاسل 2 (الثقيلة) والسلاسل 3 (الخفيفة) الخواص الوظيفية للجسم المضاد يكون أن هذه السلاسل تتميز بوجود منطقة محددة من الجزء أ- (المنطقة المتغيرة) للتثبيت بمولد الضد ومنطقة محددة من الجزء ب- (المنطقة الثابتة) للتثبيت على الخلايا البالعة.</p> <p>4- التمثيل بالرسم :</p> <p>أ- تثبيت مولد الضد : ب- التثبيت على الخلايا البالعة :</p> 	
04	2×0.25  2×0.50	<p>التمرين الثالث:</p> <p>1- نعم التثبيتهن (ت1) و (ت2) تثبيتهن فعالين.</p> <p>التعليل: لأنها ولدت كمونات عمل على مستوى (م1) و (م2) .</p> <p>2- تفسير تغيرات الاستقطاب عند (م3):</p> <p>- في التجربة 1- يتمثل تغير الاستقطاب عند (م3) في ظهور إفراط في الاستقطاب ويفسر ذلك بكون أن موجة زوال الاستقطاب التي تم تسجيلها عند (م1) سمحت عند وصولها إلى نهاية المحور الاسطوانى بتحرير وسيط كيميائي في الفراغ المشبكي دوره العمل على فتح قنوات تدفق الكلور إلى الخلية بعد مشبكية و بالتالي ظهور إفراط في الاستقطاب، و نقول عن هذا الوسيط أنه ذو تأثير كابح و عن المشبك أنه مشبك مثبط.</p> <p>- في التجربة 2- يتمثل تغير الاستقطاب عند (م3) في ظهور زوال استقطاب، ويعود ذلك إلى كون موجة زوال الاستقطاب المتولدة عند الخلية قبل مشبكية على إثر التثبية انتقل إلى غاية نهاية المحور الاسطوانى و سمحت بتحرير وسيط كيميائي في</p>	

العلامة	مجزأة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاو الموضوع
		<p>الفراغ المشبكي له دور منشط ( نقول عن المشبك أنه مشبك تنبيه) حيث يسمح هذا الوسيط بانفتاح قنوات تدفق الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية مؤديا إلى ظهور زوال الاستقطاب.</p>	
	0.50	<p>3- عند التنبيه في (ت1) و (ت2) في نفس الوقت يمكن انتظار تسجيل زوال استقطاب بسيط يعتبر محصلة زوال الاستقطاب الناتج عن التنبيه (ت2) و إفراط الاستقطاب الناتج عن التنبيه (ت1) ، حيث تكون هذه المحصلة غير كافية لتوليد كمون عمل على شكل موجة زوال استقطاب متقلة ، لذا يبقى زوال الاستقطاب الناتج أقل من عتبة كمون العمل.</p>	
	0.50	<p>4- في هذه الحالة نلاحظ تسجيل كمون راحة عند (م5) لكون أن محصلة التنبيهين (ت1) و (ت2) عبارة عن قيمة غير كافية لانتقاله على شكل موجة إلى (م5) .</p>	
	0.50	<p>II- 1- يتمثل تأثير GABA بعد تثبيته على مستوى المستقبلات الغشائية للغشاء بعد مشبكي في فرط الاستقطاب.</p>	
	0.50	<p>الشرح : الإفراط في الاستقطاب ناتج عن دخول شوارد سالبة عبر الغشاء بعد مشبكي و هذا الدخول لا يتم إلا بانفتاح قنوات غشائية ، دخول الشوارد السالبة يؤدي إلى الرفع من عدد الشوارد السالبة في داخل الخلية ما بعد مشبكية .</p>	
	0.50	<p>2- عبارة عن مبلغين كيميائيين يؤثران على الغشاء بعد المشبكي ، يكون تأثير الأستيل كولين يتمثل في توليد زوال الاستقطاب بتأثيره على قنوات غشائية تعمل على إدخال شوارد الصوديوم الموجبة إلى الخلية بعد مشبكية على العكس من ذلك يكون تأثير الـ GABA فرط في الاستقطاب الذي يؤدي إلى إدخال شوارد الكلور . (مفعول GABA وأستيل كولين منعكسان).</p>	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني )	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
08		<p><b>التمرين الأول: (08 نقاط)</b></p> <p>تفسير نتائج الجدول:</p> <p><b>I-</b></p> <p><b>1-</b></p> <p>- المرحلة الأولى: انطلاق <math>O_2</math> لفترة قصيرة يفسر حدوث التحليل الضوئي للماء (حدوث مرحلة كيموضونية). توقف انطلاق <math>O_2</math> يرجع إلى عدم تجديد النواقل المؤكسدة NADP لغياب <math>CO_2</math>.</p> <p>- المرحلة الثانية: تثبيت <math>CO_2</math> لفترة قصيرة بعد نقله إلى الظلام يفسر بوجود نواتج المرحلة السابقة (<math>ATP, NADP^+</math>) (عدم حدوث مرحلة كيموضونية) .</p> <p>- المرحلة الثالثة: يفسر عودة انطلاق <math>O_2</math> بعودة التحليل الضوئي للماء (أكسدة الماء) وتثبيت <math>CO_2</math> يرجع إلى استمرار تشكيل النواتج المرحلة الكيموضونية (<math>ATP</math> و <math>NADP^+</math>)</p> <p><b>2-</b> استخراج شروط استمرار انطلاق <math>O_2</math> : توفر الضوء و <math>CO_2</math> .</p> <p><b>3-</b> الاستخلاص فيما يخص مراحل التركيب الضوئي: - توجد مرحلتين للتركيب الضوئي: هما • مرحلة التفاعلات الضوئية ( الكيموضونية). • مرحلة التفاعلات الظلامية ( الكيموحيوية).</p> <p><b>4-</b></p> <p>أ- البيانات المرقمة من 1 إلى 4:</p> <p>1- غلاف الصانعة ، 2- البديرة ، 3- الحشوة ، 4- الصفائح</p> <p>ب- الطبيعة الكيميائية للعنصر (س): سكرية (نشوية).</p> <p>ج- العضية الممثلة بالشكل "ب" مأخوذة من نبات معرض للضوء .</p> <p>* التعليل : احتوائها على المادة "س" ( النشاء ) .</p> <p><b>II-</b></p> <p><b>1-</b> * تحليل منحنى الشكل " أ " من الوثيقة (2):</p> <p>- من 0 إلى 3 دقائق : نلاحظ تناقص تدريجي لتركيز الـ <math>O_2</math> .</p> <p>- عند 3 إلى 5 دقائق : انطلاقا من لحظة إضافة مستقبل للإلكترونات <math>Fe^{3+}</math> عند الدقيقة الثالثة نلاحظ ارتفاع تركيز <math>O_2</math> والتزايد التدريجي مع الزمن .</p> <p>- بعد الدقيقة الخامسة: فعند نقل المعلق إلى الظلام نلاحظ تراجع تدريجي في تركيز <math>O_2</math> .</p> <p>* الاستنتاج : نستنتج أن انطلاق <math>O_2</math> يتطلب توفر الضوء ومستقبل للإلكترونات في الحالة المؤكسدة.</p> <p><b>2-</b> شرح آلية انتقال الإلكترونات في الأجزاء أ ، ب ، ج من الشكل " ب " :</p> <p>الجزء أ: يتم انتقال الإلكترونات الناتجة من التحلل الضوئي للماء إلى الـ PSII من كمون أكسدة وإرجاع منخفض نحو كمون أكسدة وإرجاع مرتفع .</p> <p>الجزء ب: ينتبه الـ PSII ضوئيا محررا الإلكترونات التي تنتقل عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات ( السلسلة التركيبية الضوئية) من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع نحو الـ PSI .</p> <p>الجزء ج: ينتبه الـ PSI ضوئيا محررا الإلكترونات التي تنتقل عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع نحو آخر مستقبل للإلكترونات.</p>	
	1.5		
	2×0.25		
	2×0.25		
	4×0.25		
	0.25		
	2×0.25		
	4×0.25		
	3×0.5		



العلامة	مجموع	محاور الموضوع
مجزأة	5×0.25	<p>3- الرسم الوظيفي للمرحلة الكيموضوئية :</p> 
06	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>3×0.25</p> <p>6×0.25</p>	<p>التمرين الثاني: (6 نقاط).</p> <p>1- أ- يمثل ( ES ) المعقد " إنزيم - مادة التفاعل " .          ب- كيفية قياس سرعة التفاعل :          قياس سرعة التفاعل بكمية المادة المستهلكة أو الناتجة خلال وحدة الزمن          ج- طبيعة العلاقة البنوية بين [E] و [S] : تكامل بنوي بين الإنزيم ومادة التفاعل</p> <p>2- أ- تحليل منحنى الوثيقة (I) :          من ز<sub>0</sub> إلى ز<sub>1</sub> : زيادة سريعة في تشكل المعقد " إنزيم مادة التفاعل " ليبلغ حدا أعظميا في ز<sub>1</sub> ، وزيادة سريعة في المنتج .          - من ز<sub>1</sub> إلى ز<sub>2</sub> : ثبات ديناميكي (كمي) في تشكل المعقد "إنزيم مادة التفاعل" عند الحد الأعظمي واستمرار زيادة المنتج .          - من ز<sub>2</sub> إلى ز<sub>3</sub> : تناقص في تشكل المعقد إلى أن يندعم وتباطؤ في زيادة المنتج إلى أن يثبت .          ب- تفسير النتائج المحصل عليها :          - من ز<sub>0</sub> إلى ز<sub>1</sub> : تشكل المعقد يدل على أن الإنزيم وظيفيا ( نشطا ) والزيادة السريعة للتفاعل تدل على أن عدد جزيئات الإنزيم في الوسط ( تركيز الإنزيم ) أكبر من تركيز مادة التفاعل (الـ ARN المتوفرة في الوسط ) .          في ز<sub>1</sub> : كل الإنزيمات مشغولة أي في حالة تشبع، وزيادة كمية المنتج يدل على استمرار نشاط الإنزيم .          - من ز<sub>1</sub> إلى ز<sub>2</sub> : ثبات سرعة تشكل المعقد " إنزيم مادة التفاعل " يدل على أن سرعة تشكله تساوي سرعة تفكيكه أي <math>V_2 = V_1</math> ، واستمرار زيادة المنتج يدل على أن الإنزيم يقوم بإمالة الـ ARN .          من ز<sub>2</sub> إلى ز<sub>3</sub> : التناقص في تشكل المعقد يدل على أن مادة التفاعل ( الـ ARN ) قلت تدريجيا إلى أن انعدمت في الوسط في ز<sub>3</sub> ، لأن الإنزيم يبقى وظيفيا بعد تحفيزه للتفاعل وانعدام مادة الـ ARN في الوسط هو الذي أدى إلى تباطؤ في زيادة المنتج ثم ثبات تركيزه في الوسط .</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	محاور الموضوع															
المجموع	مجزأة																	
		ج- رسم تخطيطي تفسيري يوضح العلاقة بين P، S، E : <div><div><div><div>إنزيم</div><div>مادة تتفاعل</div><div>مشوح</div></div><div></div><div>21</div><div>11</div><div>01</div></div><p>3- الأسباب التي أدت إلى فقدان الإنزيم نشاطه:</p><p>من الوثيقة (2) نسجل أن المادتين الكيميائيتين (β مركبتوايثانول واليوريا) تسببتا في تفكيك الروابط الكربينية لبعض الأحماض الأمينية (السيستيين) للسلسلة الببتيدية، مما أدى إلى زوال انطوائها، فتغيرت البنية الفراغية للبتيد، بينما بقيت البنية الأولية سليمة.</p><p>- التعليل:</p><p>يتوقف نشاط الإنزيم على بنيته الفراغية وبالضبط على موقعه الفعال، وتغير البنية الفراغية يؤدي إلى تغير الموقع الفعال للإنزيم ، وبالتالي لا يتم تشكل المعقد والدليل على ذلك استعادة الإنزيم نشاطه بعد التخلص من المادتين.</p></div>																
	3×0.5																	
	0.75																	
	0.75																	
06		<p><b>التمرين الثالث:</b></p> <p>I -</p> <p>1 - تحديد المعطي الأكثر توافقا: المعطي الأكثر توافقا هي الأخت 1</p> <p>- تبرير سبب الاختيار: عدم حدوث الارتصاص</p> <p>2- أ- يحدث الارتصاص نتيجة تشكل المعقدات المناعية (ارتباط الكريات الحمراء بالأجسام المضادة)</p> <p>ب- الخطوات التي تتخذها الممرضة لتحديد فصيلة الدم:</p> <p>= استعمال أمصال دموية وهي: Anti-a - Anti-b - Anti-a+b</p> <p>= دم الشخص المانحون الجدول:</p> <table><tr><th>الزمر</th><th>Anti-a</th><th>Anti-b</th></tr><tr><td>A</td><td>تراص</td><td>لا شيء</td></tr><tr><td>B</td><td>لا شيء</td><td>تراص</td></tr><tr><td>AB</td><td>تراص</td><td>تراص</td></tr><tr><td>O</td><td>لا شيء</td><td>لا شيء</td></tr></table>	الزمر	Anti-a	Anti-b	A	تراص	لا شيء	B	لا شيء	تراص	AB	تراص	تراص	O	لا شيء	لا شيء	
الزمر	Anti-a	Anti-b																
A	تراص	لا شيء																
B	لا شيء	تراص																
AB	تراص	تراص																
O	لا شيء	لا شيء																
	0.25																	
	0.25																	
	0.25																	
	4×0.25																	



العلامة		محلور الموضوع						
المجموع	مجزأة							
		<p><b>3- النمط الوراثي للزمر الدموية للأبناء:</b></p> <p>الجدول:</p> <table border="1"> <tr> <th>النمط الوراثي</th> <th>النمط الظاهري</th> </tr> <tr> <td>AA أو AO</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>B</td> </tr> </table> <p>النمط الوراثي للزمر الدموية للأباء:</p> <p>* احتمال (1)</p> <pre>       AB  —  AO                    +----+                              AA  AO  AB  BO     </pre> <p>* احتمال (2)</p> <pre>       AB  —  AA                    +----+                    AA  AB     </pre> <p>ب - نعم</p> <p>- التوضيح: حيث عند إضافة مصل AntiA لدم الأبناء يلاحظ عدم حدوث ارتصاص في B وعليه تكون زمرة الأخت ذات فصيلة الدم (BO) والأخذ تكون فصيلة دمه (BO) أيضا.</p> <p><b>II- النمط الوراثي للأبناء:</b></p> <p>تطبيق قاعدة التهجين أوجد 4 احتمالات:</p> <pre>       DR<sup>3</sup> B<sup>3</sup> C<sup>2</sup> A<sup>3</sup>  —————  DR<sup>7</sup> B<sup>7</sup> C<sup>3</sup> A<sup>9</sup>         1   2           3   4           4   3           2   1         DR<sup>3</sup> B<sup>8</sup> C<sup>1</sup> A<sup>3</sup>  —————  DR<sup>7</sup> B<sup>27</sup> C<sup>7</sup> A<sup>2</sup>     </pre> <p>ب- تفسير المعطى أكثر توافقا: هو المعطى أكثر تقاربا في CMH أو (قلة درجة اختلاف بين CMH الأخذ والمانح)</p> <p><b>III- استخلاص نوع البروتينات الغشائية المتدخلة في تحديد الذات.</b></p> <p>(1) تتمثل في البروتينات السكرية (غليكوبروتين) والمعرفة بـ HLA توجد في سطح خلايا ذات أنوية تحدد الهوية البيولوجية لكل فرد.</p> <p>(2) تتمثل في البروتينات السكرية (غليكوبروتين) والمعرفة بـ A.B.O توجد في سطح كريات دموية حمراء تغير مؤشرات الزمر الدموية للفرد.</p>	النمط الوراثي	النمط الظاهري	AA أو AO	A	AB	B
النمط الوراثي	النمط الظاهري							
AA أو AO	A							
AB	B							
0.5								
0.75								
0.5								
3×0.25								
4×0.25								
0.25								
0.25								
0.25								