

2 Introduction to Quantum Mechanics

2.1 Linear algebra

Exercise 2.1:(Linear dependence: example) Show that $(1, -1)$, $(1, 2)$ and $(2, 1)$ are linearly dependent.

proof:

$$a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, (a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}) \quad (1)$$

とする。

この解の組 (a_1, a_2, a_3) は $t \in \mathbb{C}$ を任意の複素数として、

$$(a_1, a_2, a_3) = (t, t, -t) \quad (2)$$

と表すことが出来る。問題の三つのベクトルが一次独立であれば、 $(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$ のみが解となるため不適。よって一次従属である。

Exercise 2.2: (Matrix representations: example) Suppose V is a vector space with basis vectors $|0\rangle$ and $|1\rangle$, and A is a linear operator from V to V such that $A|0\rangle = |1\rangle$ and $A|1\rangle = |0\rangle$. Give a matrix representation for A , with respect to the input basis $|0\rangle, |1\rangle$, and the output basis $|0\rangle, |1\rangle$. Find input and output bases which give rise to a different matrix representation of A .

proof: V の基底 $\{|v_1\rangle = |0\rangle, |v_2\rangle = |1\rangle\}$ に対して演算子 $A: V \rightarrow V$ は、

$$\begin{aligned} A|v_1\rangle &= 0|v_1\rangle + 1|v_2\rangle, \\ A|v_2\rangle &= 1|v_1\rangle + 0|v_2\rangle \end{aligned}$$

という作用をする。

定義より、演算子 $A: V \rightarrow W$ において、 V の基底を $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$,

W の基底を $\{|w_1\rangle, \dots, |w_m\rangle\}$

とすれば、 A の行列表現における (i, j) 成分 A_{ij} は

$$A|v_j\rangle = \sum_i A_{ij} |w_i\rangle \quad (1)$$

と定義されている。故に

$$A_{11} = 0, A_{12} = 1, A_{21} = 1, A_{22} = 0.$$

すなわち、

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

復習:(表現行列の定義) 線形写像 $f : V \rightarrow W$ において、 V の基底を $\{v_1, \dots, v_n\}$, W の基底を $\{w_1, \dots, w_m\}$ とする。

ここで、任意の $j (1 \leq j \leq n)$ について、 $f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$ とする。

($f : V \rightarrow W$ より、任意の $j (1 \leq j \leq n)$ について $f(v_j)$ は W の基底 $\{w_1, \dots, w_m\}$ の線型結合で表される。)
このとき行列 A の (i, j) 成分を a_{ij} とすれば、

$$[f(v_1), \dots, f(v_n)] = [w_1, \dots, w_m] A \quad (1)$$

というような便宜的表記をすることができる。この行列 A を f の表現行列という。

この表現行列の便利な点

V の基底を $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ とすると、 V の任意の元 v は $v = \sum_{j=1}^n x_j v_j, (\forall j, x_j \in \mathbb{C})$ として表すことが出来る。

$$f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_j a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right) w_i \quad (2)$$

ここで、

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

とすると、 $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$ は $(m, 1)$ ベクトル Ax の i 成分となる。

ここで特に (2) において、

$$f(v) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right) w_i \quad (3)$$

が成立していることに注意すると、(1) の表記を用いて

$$[f(v)] = [f(v_1), \dots, f(v_n)] x = [w_1, \dots, w_m] Ax \quad (4)$$

と表すことが出来る。すなわち、 V の基底 $\{v_1, \dots, v_n\}$ に対する v の係数ベクトル x で W の基底 $\{w_1, \dots, w_m\}$ の係数を Ax と表すことが出来る。これが表現行列の便利な点である。

Exercise 2.3: (Matrix representation for operator products)

Suppose A is a linear operator from vector space V to vector space W , and B is a linear operator from vector space W to vector space X . Let $|v_i\rangle$, $|w_j\rangle$ and $|x_k\rangle$ be bases for the vector spaces V, W , and X , respectively.

Show that the matrix representation for the linear transformation BA is the matrix product of the matrix representations for B and A , with respect to the appropriate bases.

proof:

V, W, X の次元をそれぞれ n, m, l とし、基底をそれぞれ $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$, $\{|w_1\rangle, \dots, |w_m\rangle\}$, $\{|x_1\rangle, \dots, |x_l\rangle\}$ とする。

このとき A, B について行列表現の定義より、任意の $i, (1 \leq i \leq n), j, (1 \leq j \leq m)$ において、

$$A|v_i\rangle = \sum_{j=1}^m a_{ji} |w_j\rangle \quad (1)$$

$$B|w_j\rangle = \sum_{k=1}^l b_{kj} |x_k\rangle \quad (2)$$

と表すことが出来る。これより、

$$\begin{aligned} (BA)|v_i\rangle &= B(A|v_i\rangle) \\ &= B\left(\sum_{j=1}^m a_{ji} |w_j\rangle\right) \\ &= \sum_{j=1}^m a_{ji} B|w_j\rangle \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^l a_{ji} b_{kj} |x_k\rangle \\ &= \sum_{k=1}^l \left(\sum_{j=1}^m b_{kj} a_{ji}\right) |x_k\rangle. \end{aligned}$$

これより、演算子 $BA : V \rightarrow X$ の行列表現の (k, i) 成分は $\sum_{j=1}^m b_{kj} a_{ji}$ と表され、これは A, B それぞれの行列表現による行列の積の (k, i) 成分に等しい。

Exercise 2.4: (Matrix representation for identity) Show that the identity operator on a vector space V has a matrix representation which is one along the diagonal and zero everywhere else, if the matrix representation is taken with respect to the same input and output bases. This matrix is known as the identity matrix.

proof: ベクトル空間 V の基底を $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$, V 上の identity operator を I とする。このとき、任意の $j, (1 \leq j \leq n)$ について

$$\begin{aligned} I|v_j\rangle &= \sum_{i=1}^n a_{ij} |v_i\rangle \\ &= |v_j\rangle. \end{aligned}$$

すなわち、

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

このような数を (i, j) 成分に持つ行列は、対角成分が 1 でその他が 0 の行列である。