

한국인 기준 음식으로 묻는 회상형 감각 강도 평가

Taste Buddy 설계 리서치 · 2026년 9월 7일 · 한국에 거주하는 만 19세 이상 성인 대상

제품과 먹은 조건을 정해 놓고, 그 음식을 얼마나 강하게 느꼈는지 묻는 설계를 권한다. 첫 결과는 '회상한 맛의 강도 반응'으로 해석하고, 실제 시음과 대조한 뒤 민감도 추정에 활용한다.

기준 음식 기반 회상형 감각 강도 평가는 이 설계를 설명하는 명칭이다. 문헌의 관련 용어는 **recalled taste intensity**다. 기존 연구는 회상한 음식의 강도를 조사하고 음식 목록을 분류했지만, 한국 성인의 개인별 미각 민감도를 판정하는 6문항 검사를 검증한 연구는 이번 조사에서 확인하지 못했다. [Cornelis 외, 회상 강도 연구](#)

우선 검토할 기준 음식

감각	기준 음식 후보	이번 리서치의 판단
단맛	바나나맛우유 일반 240mL	우선 파일럿. 일반·무가당·Light를 구분한다.
짭맛	포카칩 오리지널 66g	우선 파일럿. 조리 변수가 없는 대안이며 조미 풍미의 혼입을 확인한다.
신맛	매일바이오 무가당 플레인 85g	우선 파일럿. 토핑 없이 먹은 기억으로 제한한다.
쓴맛	스타벅스 카페 아메리카노 HOT Tall	조건부 파일럿. 원두·샷·첨가물과 온도 기억을 확인한다.
감칠맛	비비고 사골곰탕 일반 500g	탐색 문항. '감칠맛'의 이해도와 짭맛·육향 구분이 먼저다.
지방감	서울우유 나100% 일반 200mL	별도 질감 문항. 입안의 코팅감을 탐색하며 지방맛 민감도로 환산하지 않는다.

위 목록은 제조사 정보와 측정 목적을 종합한 설계 제안이다. 제품별 근거·조건·보류 사유는 3-4쪽에, 공식 출처는 9쪽에 제시했다. 어떤 후보도 한국인의 표준 감각 강도나 전국 친숙도가 확정된 식품은 아니다.

권장 방향

제품 1개가 모든 사람에게 동일하게 기억된다는 가정부터 검증한다. 사진과 제품명으로 경험을 확인하고, 기억이 분명한 음식의 강도만 받는다. 맛마다 여러 후보를 시험한 다음, 실제 시음 예측력을 유지하는 범위에서 온보딩 문항을 줄인다.

범위: 시식 없는 초기 설문, 다섯 기본 맛과 별도의 지방감. 문헌·국내 섭취 통계·제조사 정보를 검토했다. 앱 구현, 사용자 모집, 실제 관능 실험은 수행하지 않았다.

회상 응답이 알려 주는 범위

먼저 구분해야 할 측정값

항목	질문이 가리키는 것	이번 설문 의 해석
회상 강도	먹었던 음식의 맛을 얼마나 강하게 기억하는가	직접 수집하는 값
실제 초역치 강도	맛을 느낄 수 있는 농도의 자극을 지금 얼마나 강하게 느끼는가	향후 개인별 예측 대상
감지·인지 역치	어느 낮은 농도부터 차이 또는 특정 맛을 알아차리는가	별도 실험이 필요한 값
호감·적정함	좋아하는가, 자신에게 알맞은가	강도와 분리해 수집

여성 65명을 실제 측정한 연구에서는 감지역치와 초역치 강도가 유의하게 연결되지 않았다. 인지역치도 감칠맛을 제외하면 초역치 강도와 뚜렷하게 연결되지 않았다. 따라서 일상 음식의 강도 응답을 낮은 농도 감지 능력으로 해석할 근거는 부족하다. [Webb 외, 맛 기능 측정 비교](#)

문헌이 지지하는 점과 남기는 한계

회상 조사는 가능하다. Cornelis 외는 캐나다 62명에게 음식 120개를 회상하게 하고 미국 287명으로 강도가 높은 음식 목록을 좁혔다. 음식별 강도·호감·섭취의 관계를 다뤘으며, 실제 시음에 대한 개인별 예측 검증은 하지 않았다. 감칠맛은 포함하지 않았다. 다른 문화권의 목록은 재검증이 필요하다고 설명한다. [Cornelis 외, 2017](#)

기억에는 편향이 생길 수 있다. 단맛 주스와 짠맛 육수를 학습한 두 집단, 각 13명의 실험에서 일부 조건은 하루 또는 일주일 후 부터 기억에 맞춘 농도가 기준보다 높아졌다. 훈련된 자극의 결과이므로 오래전 먹은 브랜드 음식에 같은 크기의 오차가 생긴다고 단정할 수는 없다. [Tuorila 외, 1996](#)

실제 음식은 여러 감각의 조합이다. 국내 20-49세 600명을 두 집단으로 나눈 한식 연구에서는 MSG를 더했을 때 감칠맛·짠맛 뿐 아니라 다른 맛의 지각도 달라졌다. 영양표의 나트륨·당류·지방 함량은 감각 강도의 정답표가 될 수 없다. [Chung 외, 2022](#)

설계상 핵심 공백은 ‘그 음식은 대체로 달다’라는 음식 간 차이와 ‘같은 자극을 이 사람이 더 달게 느낀다’라는 개인 간 차이를 연결하는 한국인 검증 자료다.

한국인에게 익숙한 후보를 고르는 법

친숙한 음식군과 특정 제품의 선명한 기억은 따로 확인한다. KHIDI의 2023년 통계는 조사 2일 전 하루에 먹은 음식을 24시간 회상법으로 조사한 자료다. 분석 대상은 1세 이상 6,786명이며, 아래 수치는 각 성인 연령층의 가중 섭취 비율이다. 제품 경험률이나 평생 섭취 경험을 뜻하지 않는다. [국민영양통계 개요](#)

커피를 먹은 비율: 19~29세 36.70%, 30~49세 69.08%, 50~64세 70.88%, 65세 이상 59.55%. '한국인은 모두 아메리카노를 기억한다'는 가정 대신 연령별 경험 확인이 필요하다는 설계 판단을 뒷받침한다. [KHIDI 연령별 다빈도음식](#)

우선·조건부 후보의 구체적 조건

감각·판단	제품과 회상 조건	남는 혼입 확인할 점
단맛 우선	빙그레 바나나맛우유 일반 240mL. 차갑게, 단독 음용.	바나나 향과 우유 풍미가 섞인다. 무가당·Light·다른 용량을 같은 기준으로 합치지 않는다.
짭맛 우선	오리온 포카칩 오리지널 66g. 소스 없이 단독 섭취.	바삭함·기름·조미 풍미가 섞인다. 순수 소금 자극이 아니며, 알레르기 성분도 확인한다.
신맛 우선	매일바이오 무가당 플레인 85g. 냉장, 토핑 없이.	점도·유제품 향이 섞인다. 450g·저지방·그릭과 감각적으로 같다고 가정하지 않는다.
쓴맛 조건부	스타벅스 아메리카노 HOT, Tall 355mL , 일반 원두, 샷·시럽·우유 추가 없음.	원두 향·산미·떫은 느낌과 식은 정도를 구분한다. 추출과 개인의 주문 기억에 변동이 남는다.
감칠맛 탐색	비비고 사골곰탕 일반 500g. 데운 국물, 추가 물·소금·후추·파·밥 없음.	짭맛·육향·진한 정도가 섞인다. 제품 고정만으로 감칠맛을 분리했다고 볼 수 없다.
지방감 별도 탐색	서울우유 나100% 일반 200mL. 차갑게, 단독 음용.	입안의 코팅감이 충분히 구분되는지 확인한다. 낮은 응답이 몰리면 기준으로 제외한다.

용량·제품 구분은 공식 자료로 확인했다. '차갑게·단독·추가 재료 없음' 등은 이번 연구에서 제안한 회상 조건이며 제조사가 보증한 감각 표준은 아니다. 가격이나 매장 재고는 선정 기준으로 사용하지 않았다.

대체 후보와 기존 기준의 처리

맛마다 다른 식품 후보를 함께 시험하면 특정 음식에 대한 기억이나 향의 영향을 살펴볼 수 있다. 필요한 문항 수는 한국인 파일럿에서 결정한다. [Cornelis 외의 복수 음식 제안](#)

후보	활용 가능성	채택 전 남은 조건
따옴 오렌지 235mL	요거트와 다른 식품에서 신맛 반응을 비교하는 예비 후보. 차갑게, 물·얼음 미첨가.	단맛·향·과육감이 섞인다. 오렌지 제품 경험과 기억, 로트별 감각 변동을 확인한다.
신라면 일반 봉지 120g	기존 짬뽕 기준을 비교 시험에 남긴다. 공식 조리 조건은 물 550mL, 4분 30초.	매운 자극·감칠맛·향이 섞인다. 물·스프·추가 재료·증발 정도를 기억만으로 확정하기 어렵다.
신라면컵 65g	물 표시선과 약 3분이라는 조건을 설명하기 쉬운 예비 후보.	작은 컵·큰사발·봉지는 서로 다른 기준이다. 매운 자극과 온도 문제는 남는다.
칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 500mL	추출·희석을 줄일 수 있는 병입 커피 예비 후보.	제품 규격은 확인했으나 현재 전체 라벨·감미료와 구매 가능성은 미확정. ‘블랙’만으로 무가당이라 단정하지 않는다.
카누 다크 로스트 아메리카노	일반 제품의 커피 100% 표시는 확인. 원료 구성이 분명한 보조 후보.	스틱 규격·물 양·온도를 고정해야 한다. 평소 각자 다르게 탄 기억은 공통 농도의 응답으로 합치지 않는다.

기존 피클·평양냉면·삼겹살

현재 음식명만으로는 공통 기준 채택을 보류한다. 피클은 제조사와 절임액, 평양냉면은 식당·육수·식초·겨자, 삼겹살은 부위·지방 비율·굽기·쌈과 소스가 특정되지 않았다. 이 판단은 세 음식의 가치에 대한 평가가 아니라, 사용자가 같은 대상을 떠올리는지 확인하기 어렵다는 측정 설계상의 판단이다.

조리 음식의 변동을 보여 주는 국내 사례로, 전북대 주변 4개 식당에서 3일간 수집한 된장찌개는 식당별 평균 염도가 1.2-1.7%였고 식당 안에서도 날짜별 차이가 있었다. 이 결과를 전국 모든 국물의 변동 크기로 일반화할 수는 없다. [Hwang·Kim, 2022](#)

제품 정보의 확인 범위: 제조사 페이지는 대부분 갱신일을 표시하지 않았다. 2026-09-07 조회 시점의 이름·규격으로 정리했다. 리뉴얼이나 포장 교체 후에도 맛이 동일하다는 보증은 확인하지 않았다.

실제 설문 문구 초안

안내: 최근에 먹었을 때의 맛을 떠올려 주세요. 질문에 나온 감각이 얼마나 강했는지 골라 주세요. 기억이 분명하지 않으면 건너뛸 수 있어요.

음식마다 먼저 확인하는 항목

제품 경험: 같은 제품을 먹어 봤어요 / 다른 제품만 먹어 봤어요 / 먹어 본 적 없어요 / 잘 모르겠어요. 제품 사진·정확한 이름·버전을 함께 보여 준다.

최근 섭취: 최근 1개월 / 1-3개월 / 3개월 초과 / 시점이 기억나지 않아요. 조건 일치: 위 조건으로 먹었어요 / 다르게 먹었어요 / 잘 모르겠어요. 기간 구분은 파일럿용 제안이며, 기억이 유효한 과학적 기한으로 정한 값은 아니다.

여섯 감각의 질문

감각	질문 초안
단맛	바나나맛우유 일반 제품을 차갑게, 다른 것과 섞지 않고 마셨을 때 단맛은 얼마나 강하게 느껴졌나요?
짭맛	포카칩 오리지널을 소스 없이 먹었을 때 짭맛은 얼마나 강하게 느껴졌나요?
신맛	매일바이오 무가당 플레인 요거트를 토핑 없이 차갑게 먹었을 때 신맛은 얼마나 강하게 느껴졌나요?
쓴맛	앞에서 확인한 조건의 스타벅스 아메리카노를 마셨을 때 쓴맛은 얼마나 강하게 느껴졌나요?
감칠맛	비비고 사골곰탕에 다른 재료를 넣지 않고 데워 먹었을 때 감칠맛은 얼마나 강하게 느껴졌나요?
지방감	서울우유 나100% 일반 우유를 차갑게 마셨을 때 입안을 기름막처럼 감싸는 느낌은 얼마나 강했나요?

공통 응답 척도 제안: 전혀 느껴지지 않음 / 약함 / 중간 정도 / 강함 / 매우 강함. 화면에서는 다섯 범주를 사용하고, 분석용으로만 0-4를 대응시킨다. 숫자의 간격이 같은 감각 차이를 뜻한다고 가정하지 않는다. 별도로 '맛이 기억나지 않아요'를 둔다.

기억 확신: 분명해요 / 어느 정도 기억나요 / 불분명해요. 감칠맛 문항은 '이 감각을 구분하기 어려워요'를 추가한다. 감칠맛 설명의 '국물의 감칠맛'조차 짭맛·맛있음으로 이해되는지 면담으로 확인한다. 구분하지 못하면 해당 문항을 채택하지 않는다.

위 문항은 연구 설계 초안이다. 다섯 기본 맛의 민감도 검사로 검증되지 않았다. 지방감 문항은 별도 질감 경험을 탐색한다. 실제 화면에는 3쪽의 제품 규격을 그대로 붙이고, 브랜드 홍보 문구나 '아주 달다' 같은 정답 암시는 넣지 않는다.

응답 집계와 결과 해석

시작 단계에서 지킬 규칙

강도·호감·알맞음을 분리한다. 강하게 느끼면서 좋아하는 사람도 있을 수 있다. ‘너무 달다’, ‘딱 좋다’, ‘찾아 먹는다’, ‘느끼해서 싫다’는 강도 이외의 판단을 함께 담으므로 강도 척도의 양 끝에 사용하지 않는다. 호감이 필요하면 강도 응답 이후 별도 문항으로 묻는다.

모름은 결측으로 남긴다. 미경험·제품 불일치·기억 없음·감각 구분 어려움을 중간 강도나 50점으로 채우지 않는다. 결측 사유를 보존하고, 대체 음식을 받더라도 검증 전에는 동일 기준의 점수로 합치지 않는다.

한 음식의 응답은 한 관찰이다. 바나나맛우유에서 단맛과 지방감을 모두 받았어도 독립된 두 번의 섭취 경험이 생기지는 않는다. 같은 제품의 재응답과 다른 제품의 응답을 구분한다. 기억 확신을 생리적 정확도 확률로 환산하지 않는다.

권장하는 결과 문장

확보된 근거	표시할 수 있는 해석
기준 음식 1개, 기억 분명	“바나나맛우유의 단맛을 강하게 기억하셨습니다. 단맛을 이해하는 첫 단서예요.”
여러 후보에서 반복, 실제 시음 검증 전	“여러 기준 음식에서 단맛을 강하게 기억하는 응답이 반복됐어요.”
제품 경험이나 기억 부족	“이 감각은 아직 확인할 기록이 부족해요.”
한국인 실제 시음 예측 검증 후	검증된 대상·오차·범위 안에서 맛별 반응성 추정치를 제공한다.

척도 선택은 비교 시험으로 결정한다

gLMS는 상단에 여러 감각 경험을 포괄하는 기준을 두는 특수 척도다. 임의의 0-100 슬라이더는 gLMS와 동일하지 않다. 집단 간 비교를 지지한 연구가 있지만, 한국어 모바일 회상 설문에 그대로 적용할 타당성까지 보장하지 않는다. [Bartoshuk 외, 2004](#)

gLMS와 gVAS를 비교한 두 실험에서는 형용사 위치에 응답이 모이는 현상과 사용성 차이가 관찰됐다. 이번의 짧은 범주형 척도와 번역·설명을 갖춘 gLMS를 비교하고, 재현성·이탈·실제 시음 예측력으로 선택한다. [Hayes 외, 2013](#)

초기 저장 권장 항목: 제품·기준 버전, 평가 감각, 원응답, 경험 여부, 최근 섭취 구간, 먹은 조건, 기억 확신, 결측 사유, 응답일. 제품을 바꾸면 새 기준 버전을 부여한다. 항목별 기준값과 가중치는 실험 전 임의의 ‘한국인 평균’으로 만들지 않는다.

한국인 검증을 위한 실행안

아래 인원과 기간은 **실행 규모를 가능하기 위한 제안**이다. 검정력 계산이나 기존 연구가 보장한 최소 표본 수가 아니다. 본 검증의 표본 수는 파일럿에서 얻은 분산·예측 오차와 허용 오차를 기준으로 다시 정한다.

1. 이해도와 친숙도부터 확인

인지 면담 16-24명: 19-29세, 30-49세, 50-64세, 65세 이상을 포함한다. 질문에 답하며 떠올린 제품·먹은 조건·감각을 말하게 한다. 특히 신맛과 짙은 느낌, 감칠맛과 맛있음, 코팅감과 느끼함을 구분하는지 본다.

후보 선별 설문 약 300명: 연령·성별·지역과 커피·유제품 비섭취자를 고려해 모집한다. 제품별 경험률, 정확한 버전 인식, 최근 섭취, 조건 일치, 기억 확신, 응답 분포와 완료 시간을 비교한다. 판매량이나 음식군 섭취율을 제품 경험률 대신 넣지 않는다.

2. 같은 사람의 회상과 실제 강도를 연결

관능 파일럿 약 80-120명: 맛마다 복수 후보를 평가하되, 낯선 음식의 기억을 만들어 내게 하지 않는다. 회상 설문을 먼저 받고 1-2주 뒤 재검사한 다음 실제 시음을 진행하는 안을 우선 검토한다. 사이에 제품을 먹었는지도 기록한다.

실제 시음에서는 기준 제품의 버전·배치·보관·희석·제공량·온도를 기록하고, 제품명을 가린 제시와 순서 균형을 적용한다. 동일 제품의 반복 평가와 맛별 여러 농도의 표준 자극을 포함해, 음식 고유의 풍미와 맛 반응을 함께 살핀다. 표준 자극은 관능 연구 기관과 설계하며 알레르기·섭취 제한을 반영한다.

3. 음식 평균보다 개인 예측력을 확인

확인할 질문	판단 지표
다시 물어도 비슷한가	범주형 응답의 가중 일치도, 연속 척도라면 절대 일치 ICC와 오차
실제로 강하게 느끼는 사람을 찾아가	개인 단위의 실제 강도 예측 오차·순위 관계, 별도 검증 표본의 성능
다른 음식에도 이어지는가	한 음식에서만 맞는지, 동일 맛의 다른 음식·농도에서도 이어지는지
일부 집단만 잘 맞는가	연령·성별·친숙도·섭취 습관별 결과와 예측 오차

채택 기준은 사전에 정한다. 많은 사람이 기억해도 실제 강도 예측력이 없으면 취향 대화용 질문으로 남긴다. 두 번째 음식이 예측력을 개선하지 않으면 문항을 줄인다. 반대로 감칠맛 이해나 지방감 분리가 부족하면 축을 억지로 완성하지 않는다.

현재 가능한 결정은 후보 선정과 설문 파일럿 착수다. ‘한국인 평균보다 민감함’, 전국 백분위, 정확도 수치는 대표성·측정 오차·외부 검증이 확보된 후에 결정한다.

근거 문헌과 국내 자료

본문 링크는 해당 주장 가까이에 배치했다. 아래는 서지와 접근 범위다. 웹 자료 확인일: 2026-09-07. 학술지 원문·공식 통계·제조사 자료를 우선했으며 체계적 문헌고찰이나 메타분석으로 수행한 조사는 아니다.

Cornelis MC, Tordoff MG, El-Sohemy A, van Dam RM. Recalled taste intensity, liking and habitual intake of commonly consumed foods. *Appetite*. 2017;109:182-189. 온라인 게재 2016-11-30. [논문 원문](#). 방법·표본·회상 목록과 일반화 한계를 확인했다.

Tuorila H, Theunissen MJ, Ahlström R. Recalling taste intensities in sweetened and salted liquids. *Chemical Senses*. 1996;21(1):29-34. [원 연구 초록](#). 두 훈련군의 기억 재현 결과를 초록 범위에서 사용했다.

Webb J, Bolhuis DP, Cicerale S, Hayes JE, Keast R. The Relationships Between Common Measurements of Taste Function. *Chemosensory Perception*. 2015;8:11-18. 2015-06-05 게재. [출판사 원문](#). 역치와 초역치 강도를 구분하는 근거로 사용했다.

Bartoshuk LM 외. Valid across-group comparisons with labeled scales: the gLMS versus magnitude matching. *Physiology & Behavior*. 2004;82(1):109-114. [원 연구 초록](#). 척도 기준과 집단 간 비교의 문제를 다뤘다.

Hayes JE, Allen AL, Bennett SM. Direct comparison of the generalized Visual Analog Scale (gVAS) and general Labeled Magnitude Scale (gLMS). *Food Quality and Preference*. 2013;28(1):36-44. [초록·결과 그림](#). 척도별 응답 군집과 사용성의 근거다.

Chung Y, Yu D, Kwak HS, Park SS, Shin EC, Lee Y. Effect of Monosodium Glutamate on Salt and Sugar Content Reduction in Cooked Foods for the Sensory Characteristics and Consumer Acceptability. *Foods*. 2022;11(16):2512. 2022-08-19 게재. [출판사 페이지](#). 출판사 제공 PDF로 표본·조건을 확인했다.

Hwang JS, Kim MK. Ingredient and Salinity Variations in Doenjang Stews Sold in a College Town and Consumer Acceptance of Doenjang Stews among Korean College Students. *Preventive Nutrition and Food Science*. 2022;27(1):121-126. 2022-03-31 게재. [학회 원문](#). 식당 4곳·3일의 염도 변동만 사용했다. 초록의 소비자 n=98과 Table 3의 n=79가 달라 소비자 수용도 수치는 인용하지 않았다.

한국보건산업진흥원. 2023 국민영양통계 [개요](#), [다빈도음식·연령층별 전체](#). 질병관리청 제9기 2차년도 원자료를 2024-12-12 내려받아 분석한 자료. 페이지 갱신일은 미표기다.

남은 근거 공백: 후보 제품별 한국 성인의 정확한 기억 친숙도, 회상 점수의 개인별 실제 강도 예측력, 한국어 척도의 타당성, 제조 배치·리뉴얼의 관능적 동등성. 추가 검색으로 확정값을 만들지 않고 직접 검증 과제로 남겼다.

공식 제품 출처와 적용 경계

모든 제품 페이지는 2026-09-07 확인했다. 별도 표기가 없는 페이지의 게재·갱신일은 확인되지 않았다. 제조사의 맛 표현은 소비자 감각 강도의 객관적 검증값으로 사용하지 않았다.

빙그레·바나나맛우유. 공식 제품 안내. 일반 240mL, 무가당·Light 구분. 영양 영역의 오래된 갱신 문구와 반복 표시 때문에 해당 열량·당류 수치를 기준 선정에 사용하지 않았다.

매일유업·매일바이오 무가당 플레인 요거트 85g. 공식물 제품 P27077. 85g 단위와 냉장 배송 확인. 대용량·저지방·그릭의 동등성은 확인하지 않았다.

오리온·포카칩. 공식 제품 안내. 66g과 오리지널·어니언 구분. 공식 페이지의 알레르기 표시는 확인했으나 조미 성분별 농도나 순수 짠맛 강도는 확인하지 않았다.

스타벅스 코리아·아메리카노. 음료 설명, 단체 주문 안내. 두 샷·뜨거운 물이라는 일반 설명, Tall 355mL와 원두 변경 가능성을 확인했다. 모든 매장의 추출 일치 여부는 미검증이다.

CJ제일제당·비비고 사골곰탕 500g. 공식물 제품 40111256. 일반 제품·용량·가열 안내와 패키지 혼용 안내 확인. 감칠맛 성분 농도는 미확인이다.

서울우유협동조합·Seoulmilk Na100%. 공식 제품 안내. 일반 우유와 200mL 규격 확인. 지방 함량을 코팅감이나 지방맛 민감도의 정답으로 사용하지 않았다.

빙그레·따옴. 공식 제품 안내. 오렌지 235mL와 냉장주스 확인. 다른 과일·용량·상온 제품과 구분한다.

농심·신라면 브랜드관. 공식 제품·조리 안내. 일반 봉지 120g·물 550mL·4분 30초, 작은 컵 65g·표시선·약 3분을 각각 확인했다.

롯데칠성음료·칸타타. 제조사 브랜드 안내. 기본 브라우저에서 콜드브루 블랙 500mL 및 여러 변형을 확인했다. 현재 라벨·구매 가능성은 미확정이다. 특정 판매 링크의 판매 중단은 제품 전체 단종의 근거로 사용하지 않았다.

동식식품·카누 아메리카노. 공식 브랜드 제품 안내. 일반 다크 로스트 커피 100%와 스위트 등 버전 구분 확인. 기준 스틱 규격과 희석 조건 확정 전에는 보조 후보로 남긴다.

다음 산출물은 위 후보를 이용한 면담·파일럿 설문과 실제 시음 대조 자료다. 이 보고서는 그 설계 의사결정을 지원하며, 검증 전의 후보 목록을 확정된 한국인 미각 기준표로 제시하지 않는다.