



બાગાયત ખાતુ

શુષ્ક વિસ્તારમાં બાગાયતી પાકોની ખેતી



નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી

સરદાર પટેલ વિધાલય પાસે, ચાર કોશિયા નાકા,

મોડાસા રોડ, લુણાવાડા, મહીસાગર

ફોન નં.: ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૨૫

E : ddhmahisagar@gmail.com

W : www.ikhedut.gujarat.gov.in, www.doh.gujarat.gov.in

અનુક્રમણિકા

અનુ. નં.	વિગત	પાના નં.
૧	પ્રસ્તાવના	૧
૨	શુદ્ધ બાગાયતી પાકોની લાક્ષણિકતા	૨
૩	સીતાફળ	૩
૪	બોર	૪
૫	આમળા	૬
૬	આંબલી	૭
૭	ફાલસા	૮
૮	બીલી	૯
૯	સરગવો	૧૦
૧૦	જાંબુ	૧૨
૧૧	અંજીર	૧૪
૧૨	ગુંદા	૧૬
૧૩	કરમદા	૧૭



પ્રસ્તાવના

આપણા દેશમાં શુષ્ક પ્રદેશ મુખ્યત્વે વિવિધ રાજ્યોના ૩૮.૭ મિલિયન હેક્ટરમાં ફેલાયેલો છે. જેમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા, પંજાબ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ માં ગરમ શુષ્ક પ્રદેશ આવેલા છે. એવા પ્રદેશ માં આત્યંતિક પર્યાવરણીય અવરોધો ના કારણે પરંપરાગત પાકની ખેતી આર્થિક પરવડે તેમ નથી. આવી સ્થિતિમાં, શુષ્ક બાગાયત પાકો માટે પૂરતો અવકાશ છે જે ગરમ શુષ્ક અને અર્ધ શુષ્ક પ્રદેશો સરળતા થી થઈ શકે છે.

સૂકા વિસ્તારમાં કરવામાં આવતી ખેતીમા ગુજરાતના કુલ ક્ષેત્રફળમાંથી ૬૨,૧૮૦ ચો.કિમી. નો વિસ્તાર સૂકો છે. જે લગભગ ૨૦ % જેટલો થાય છે. મુખ્યત્વે શુષ્ક પ્રદેશ અને અર્ધ શુષ્ક પ્રદેશ માં બોર, આમળા, બીલી, સીતાફળ, અંબાલી, જાંબુ, સરગવો, ગુંદા, અંજુર અને કરમદા જેવા બાગાયતી પાકો નો અવકાશ રહેલો છે.



શુષ્ક બાગાયતી પાકોની લાક્ષણિકતા

- શુષ્ક બાગાયતી પાકોના ઊંડા મૂળ અને બારમાસી પાક હોવા જોઈએ.
- શુષ્ક બાગાયતી પાકો ઓછી પાણીની જરૂરિયાત ધરાવતા હોવો જોઈએ.
- શુષ્ક બાગાયતી પાકમાં જાડા અને નાના પાંદડા હોવા જોઈએ અને ચમકદાર હોવા જોઈએ.
- શુષ્ક બાગાયતી પાક સખત અને સખત ચોમાસા માટે સહનશીલ હોવા જોઈએ
- શુષ્ક બાગાયતી પાકોએ ઉનાળામાં તેમનાં પાંદડાં ઉતારવાં જોઈએ અને વરસાદની ઋતુમાં ફૂલો અને ફળ આપવા જોઈએ.



સીતાફળ

પાકનું મહત્વ

સીતાફળ પાનખર પ્રકારનો સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તાર માટેનો અગત્યનો પાક છે. સીતાફળ આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ઠંડક આપનાર, દાહને મટાડનાર તથા લોહી વધારનાર છે.

જમીન અને હવામાન

સીતાફળ ઉષ્ણકટિબંધનો ફળપાક છે. તેને ગરમ તથા ભેજવાળું હવામાન તથા શિયાળાની શરૂઆતનું સહેજ ઠંડુ વાતાવરણ માફક આવે છે.

સીતાફળની જાતો

મેમથ, વોશિગ્ટન, સિંધણ, લાલ સીતાફળ, બાલાનગર વિગેરે મુખ્ય જાતો છે. તેમાંથી સિંધણ અને બાલાનગર ગુજરાતની મુખ્ય જાતોમાની એક છે. ગુજરાત જુનાગઢ સીતાફળ - ૧, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસિત જાત છે.

સંવર્ધનની રીત

સીતાફળની પ્રસર્જન બે રીત થી થાય છે. (૧) બીજથી (૨) કલમ બનાવીને

રોપણી પદ્ધતિ

સીતાફળ પાકની રોપણી સામાન્ય રીતે ચોરસ પદ્ધતિથી ૫x૫ મીટર અથવા ૬x૬ મીટરનાં અંતરે કરી શકાય છે.

ખાતર વ્યવસ્થા

ઝાડ દીઠ ૧૦ થી ૧૫ કિલો છાણિયું ખાતર નાંખવું. ના:ફો:પો: ૧૦૦: ૫૦: ૨૫: ગ્રામ પ્રતિ ઝાડ સાથે ૨.૫ કીલો દીવેલીનો ખોળ આપવો.

પાક સંરક્ષણ

વર્ષમાં બે વખત એટલે કે ફળો ઉતાર્યા બાદ અને ઉનાળા દરમિયાન થડને ગોઠ કરી ખૂલ્લા કરવા તેમજ ખામણામાં રહેલ પાંદડા વગેરે જેવો કચરો દુર કરી ચોખ્ખા રાખવા. ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર મહીનામાં એટલે કે ખાસ કરીને મીલીબગના બચ્ચાને ઝાડપર ચડવાના સમયે થડની ફરતે એક ફૂટ વિસ્તારમાં ચીકાસવાળુ ગ્રીસ લગાડવાથી ચીટકો ઝાડ ઉપર ચડી શકતા નથી.

ઉત્પાદન

ઝાડ દીઠ સરેરાશ ૮૦ થી ૧૫૦ નંગ મળે છે. સારી માવજત હોય તો ઝાડ દીઠ ૧૫ થી ૨૦ કિલો ગ્રામ ઉત્પાદન મળે છે.



ભારતમાં બોરની ખેતી રાજસ્થાન, હરિયાણા, પંજાબ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશમાં કરવામાં આવે છે. શુષ્ક અને અર્ધ શુષ્ક વિસ્તાર માટે આ એક આદર્શ ફળ પાક છે.

બોરની ઉપયોગિતા

પોષક મૂલ્યની દૃષ્ટિએ બોર સફરજન કરતાં વધુ પૌષ્ટિક ફળ છે. છતાં કિંમતમાં સસ્તુ છે. બોરનાં લાકડાનો ફર્નિચર બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે. છાંટણી કરેલા લાકડાનો બળતણ તરીકે તેમજ પાનનો પશુના આહાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે.

જમીન

સામાન્ય રીતે બોર બધાજ પ્રકારની જમીનમાં ઉછેરી શકાય છે. આમ છતાં રેતાળ, ગોરાડુ અને સારા નિતારવાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. બોરનો પાક સાધારણ ક્ષારવાળી જમીનમાં પણ થઈ શકે છે.

હવામાન

બોરને ઉનાળામાં ગરમ અને સૂકું તેમજ શિયાળામાં ઠંડુ અને સૂકું હવામાન અનુકૂળ છે. ફૂલ અને ફળ ધારણ અવસ્થાએ હવામાનમાં ભેજ હાનિકારક છે.

સુધારેલી જાતો

ગોલા : ફળની ટકાઉશક્તિ ઘણી જ નબળી છે. સરેરાશ ઉત્પાદન ૬૦-૮૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ ઝાડ મળે છે.

ઉમરાન : ફળની ટકાઉ શક્તિ સારી છે. દૂરના સ્થળ સુધી પરિવહન કરી શકાય છે. ફળનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૬૦-૭૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ ઝાડ મળે છે.

અજમેરી : આ ફેલાતી અને મોડી પાકતી જાત છે. સરેરાશ ઉત્પાદન ૮૦-૧૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિઝાડ મળે છે.

ભારતીય બાગાયત અનુસંધાન સંસ્થા, ગોધરા ધ્વારા ‘ગોમા કિર્તી’ નામની જાત વિકસાવવામાં આવેલ છે.

ઉપરોક્ત જાતો પૈકી ઉત્તર ગુજરાતના કૃષિ હવામાન આધારિત વિસ્તાર માટે બોરની વ્યાપારિક ધોરણે બિનપિયત ખેતી કરવા ગોલા, ઉમરાન અને અજમેરી જાતની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. ભાલ અને દરિયાકાંઠાની સૂકી ખેતી વિસ્તારના ખેડૂતોને બોરની ગોલા જાતનું વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. બોરની સુકવણી માટે રાંદેરી જાત અનુકૂળ છે.

સંવર્ધન

બોરનું સંવર્ધન સામાન્ય રીતે બીજ તથા વાનસ્પતિક તેમ બંને રીતે થાય છે. પરંતુ બીજથી ઉત્પન્ન થયેલ છોડમાં ફળ મોડા આવે છે તથા ગુણવત્તામાં ઉતરતી કક્ષાના થાય છે. બોરડીના સંવર્ધન માટે દેશી બોરડીના મૂલકાંડ ઉપર જે તે પસંદગીની જાતની આંખ કલમ કરવામાં આવે છે

રોપણી

બોર માટે ૬ મીટર X ૬ મીટરના અંતરે જ્યારે પિયત બોર માટે ૮ મીટર X ૮ મીટરના અંતરે રોપણી કરવી

ખાતર

બોરડીના ઝાડને ખાતરનો ભલામણ જ્યથો ૫૦૦:૪૦૦:૪૦૦: એન:પી:કે કિગ્રા /હેક્ટર ખાતરનો ભલામણ જ્યથો આપવો.

પાક સંરક્ષણ

બોરમાં મુખ્યત્વે ફળમાખી, બોર કોરી ખાનાર ઈયળ જીવાત જોવા મળે છે. પાનના ટપકાનો રોગ , ફળનો સડો મુખ્ય રોગ છે.

અગત્યના પ્રશ્નો અને ઉપાયો

ફળનું ખરણ : બોરડીમાં ફળ બંધાયા પછી ફળનું ખરણ ઘણું જોવા મળે છે. ફળ બંધાયા પછી ઓકટોબરના અંત સુધી ફળનું ખરણ થાય છે. સામાન્ય રીતે વટાણા કદનું ફળ હોય ત્યારે વધારે ખરણ થાય છે.

ઉપાયો:

- ફૂલ ખીલવાના સમયે જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો નહીં.
- ભલામણ મુજબ જ ખાતરનો જથ્થો આપવો.
- ભૂકી છારાના રોગનું નિયંત્રણ કરવું.
- ફળ બંધાય ત્યારે એન.એ.એ.નું ૧૦ પી.પી. એમ. દ્રાવણનો ઝાડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

ચમેલી બોર : જે બોર કદમાં નાના અને આકારમાં ગોળ હોય છે. તેને ચમેલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચમેલી અને મોટા બોર એક જ ઝાડ ઉપર આવે છે.

ઉપાયો : બોરડીમાં છાંટણી વહેલી કરવી નહીં. સામાન્ય રીતે મે મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જો છાંટણી કરવામાં આવે તો ફૂલ પુષ્કળ આવવાની સાથે ફળધારણ એક સાથે થાય છે. અને ફળ સરખા કદના મોટા મળશે આમ, ચમેલી બોર નું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.



આમળા

આમળા સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારોના ફળપાકોમાં અગત્યનું અને મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. આમળાના ફળ અને તેની વિવિધ બનાવટોની વધતી જતી માંગ અને ફળના ઉપજતા સારા ભાવોના કારણે છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આમળાના પાક તરફ સંશોધકો અને ખેડૂતોનું ધ્યાન ખેંચાયેલ છે.



હવામાન અને જમીન

આમળા સમશીતોષ્ણ કટિબંધનો પાક છે. પરંતુ તે સમશીતોષ્ણ તેમજ ઉષ્ણ કટિબંધ એમ બંને પ્રદેશોમાં સફળતાપૂર્વક ઉગાડી શકાય છે. પાકને ગરમ અને સૂકું હવામાન ખાસ માફક આવે છે. પરંતુ જમીન ઉંડી, ફળદ્રુપ, ગોરાડુ અને મધ્યમ કાળી જમીનમાં ઘણી જ સારી રીતે ઉગાડી શકાય છે

જાતો

આણંદ-૧ અને ગુજરાત આમળા-૧ ગુજરાતની સુધારેલ જાતો છે. જ્યારે બનારસી,ગોમા ઐશ્વર્યા, ફ્રાન્સીસ, કિશ્ના, કંચન, ચક્રૈયા અને એન.એ. ૬,૭,૮,૯,૧૦ વગેરે મહત્વની જાતો છે.

સંવર્ધન

આમળામાં આંખ કલમ દ્વારા વર્ધન કરવામાં સારી સફળતા મળે છે. આંખ કલમની ઢાલાકાર, થીંગડાકાર અને રીંગ આકાર, કલિકારોપણ એમ જુદી જુદી પદ્ધતિઓ પૈકી થીંગડાકાર કલિકા રોપણ પદ્ધતિ સૌથી વિશેષ સાનુકુળ જણાયેલ છે.

રોપણી

એપ્રિલ-મે માસ દરમિયાન ભલામણ પ્રમાણેના ચોક્કસ અંતરે ૬૦X૬૦X૬૦ સે.મી.ના માપના ખાડા તૈયાર કરી પંદર દિવસ તપવા દેવા. ત્યારબાદ દેશી ખાતર અને માટી સરખા ભાગે લઈ તેમાં ખાડાદીઠ ૨૦૦ ગ્રામ ડીએપી અને ૨૦૦ ગ્રામ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ મિશ્ર કરી તેના વડે ખાડા ભરી દેવા.

પાક સંરક્ષણ

ડુંખ કોરી ખાનાર ઈયળ / ગાંઠીયા ઈયળ નો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે

ઉત્પાદન

ફળો લગભગ ડીસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં પાકવા લાગે છે. ફળ લીલાશ પડતા પીળા રંગના બને ત્યારે ઉતારવા યોગ્ય ગણાય છે. દશ વર્ષનું સારું ઝાડ ૧૦૦ થી ૨૫૦ કિલો જેટલું ઉત્પાદન આપે છે. આણંદ કેન્દ્ર, આણંદ ખાતે એક ઝાડ દર વર્ષે ૫૦૦ કિલો ફળ આપે છે. આ ઝાડને ઉત્તમ ઝાડ તરીકે પસંદ કરેલ છે.



આંબલી



ગુજરાત રાજ્યમાં વલસાડ-ડાંગ, સુરત, નવસારી, ભરૂચ, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, જુનાગઢ અને ભાવનગર વિસ્તારમાં આંબલીના વૃક્ષો જોવા મળે છે

જમીન

વિપુલ પ્રમાણમાં સેન્દ્રીય પદાર્થ ધરાવતી જમીન આમલીને ખૂબ જ માફક આવે છે તદ્દપરાંત વિવિધ પ્રકારની જેવી કે પથરાળ, ઉંડી, ગોરાડુ, ક્ષારવાળી કે ભારે કાળી જમીનમાં પણ થઈ શકે છે.

જાતો

પ્રતિષ્ઠાન, યોગેશ્વરી (રતાશ પડતો માવો ધરાવતી જાત), સીલેક્શન-ર૬૩, પી.કે.એમ.-૧, ડીટી-૧ અને ડીટી-૨૮.

સંવર્ધન

બહુ વર્ષાયુ આંબલીનું વર્ધન મોટાભાગે બીજથી થાય છે. થીગડાકાર આંખ કલમ અથવા નૂતન કલમ પદ્ધતિથી વર્ધન કરી શકાય છે.

વાવેતર અંતર

સામાન્ય રીતે ૧૦X૧૦ અથવા ૧૨X૧૨ મી. ના અંતરે આંબલીનું વાવેતર કરવું સલાહભર્યું છે.

છાંટણી અને કેળવણી

સામાન્ય રીતે આંબલીમાં છાંટણી કરવામાં આવતી નથી આમ છતાં જમીનથી ૧.૫ થી ૨.૦ મી. ની ઉંચાઈ સુધીની બધી જ ડાળીઓની છાંટણી કરીને ઝાડની કેળવણી કરવી જોઈએ.

કાપણી

સામાન્ય રીતે ફળ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ માસમાં તૈયાર થાય છે. ફળનું બહારનું કોચલું સુકાઈ જાય અને સખત થાય તેમજ ફળનો માવો કોચલાથી જુદો પડે ત્યાં સુધી ઝાડ પર જ ફળને પાકવા દેવું. ત્યારબાદ લાકડાંની સોટીથી હળવેથી ફટકારી કોચલાનું આવરણ દુર કરવું. ફળના માવાને બીજમાંથી છુટો પાડી તેમાંથી રેસા દુર કરી આ ફળમાં ભેજ ઓછો થાય ત્યાં સુધી સુર્યના તાપમાં સુકવવો.

ઉત્પાદન

બીજ દ્વારા તૈયાર થયેલ આંબલીનું ઝાડ ૭ થી ૧૦ વર્ષે ફળવાની શરૂઆત થાય છે જ્યારે કલમી આંબલી વહેલી ફળે છે. સારૂ વિકસિત ઝાડ અંદાજે ૨૦૦-૩૦૦ કિલો ફળનું ઉત્પાદન પ્રતિ વર્ષ આપે છે.

મૂલ્યવર્ધન

આમલી નાની કુમળી કાચી અવસ્થાથી પાકી હોય ત્યાં સુધી દરેક અવસ્થાએ જુદા જુદા સ્વરૂપે ખવાય છે. આમલીના બીજ પણ શેકીને મુખવાસ તરીકે ખાવામાં ઉપયોગમાં લે છે. દક્ષિણ ભારતમાં આમલીમાંથી રસમ બનાવવામાં આવે છે. ઉનાળામાં આમલીનું શરબત પીવાથી લૂ માં રાહત થાય છે



ફાલસા



ફાલસા ના ફળ કદમાં નાના, વારંવાર ઉતારવાનો ખર્ચ, ઉતાર્યા પછી ફળની ટકાઉશક્તિ ઓછી હોવાથી ઝડપથી બગડી જતા હોય છે. ફળમાં વિપુલ પ્રમાણમાં વિટામીન એ તથા સી તેમજ ફોસ્ફરસ અને લોહતત્વ મળે છે. તેમાંથી ઉત્તમ પ્રકારનું શરબત બનાવી શકાય છે.



હવામાન :

ફાલસાના પાકને સમશીતોષ્ણ આબોહવા કે જ્યાં શિયાળો અને ઉનાળો એકદમ જુદા પડતા હોય તેવું હવામાન વધુ અનુકૂળ પડે છે. વધુમા વધુ ૪૪ ડિગ્રી સે. તાપમાન સહન કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

જમીન :

લગભગ બધાં જ પ્રકારની જમીનમાં આ પાક થઈ શકે છે. પરંતુ રેતાળ બંધારણવાળી, લોમી તેમજ ગોરાડુ જમીન કે જેનો નિતાર સારો હોય તેમાં છોડનો વિકાસ સારો થાય છે. ફાલસાનો પાક જમીનમાં ક્ષારનું પ્રમાણ હોય તો સહન કરી શકે છે.

જાતો :

મીઠા ફળવાળી અને ખાટા ફળવાળી જાતો તથા હીંગાણી (૩.૩૯ મી. ઊંચાઈ) અને ઊંચી જાતો જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે હીંગાણી જાતો (લોકલ, શરબતી) નો વ્યાપારીક ધોરણે વાવેતરમાં ઉપયોગ થાય છે. કારણ કે તે વધુ ઉત્પાદન આપે છે (૫.૧૯ કિલો પ્રતિ છોડ)

પ્રસર્જન :

ફાલસાનું બીમાંથી રોપ ઉછેરી કરવામાં આવે છે. બીજ વાવતા ૧૫ થી ૨૦ દિવસમાં ઊગી નીકળે છે.

રોપણી :

૩X૩ મીટર, ૨X૨ મીટર નાં અંતરે વાવણી કરવી. રોપણી ચોમાસામાં અને ફેબ્રુઆરી માસમાં કરી શકાય છે.

ખાતર વ્યવસ્થા :

બીજા વર્ષથી છાંટણીબાદ ૫ થી ૧૦ કિલો સારું કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર અને ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૧૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૫૦ ગ્રામ પોટાશ છોડદીઠ આપવાથી સારું પરિણામ મળેલ.

પિયત વ્યવસ્થા :

પ્રથમ પિયત ફેબ્રુઆરી માસમાં આપવું ત્યારબાદ ઉનાળામાં ફૂલ, ફળ બેસવાની શરૂઆત થાય ત્યારથી નિયમિત ૧૫ થી ૨૦ દિવસે પાણી આપવું. ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી પિયત પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

છાંટણી અને કેળવણી :

ફાલસાના છોડમાં નવી વૃદ્ધિ ઉપર નિયમિત આવતાં હોવાથી દર વર્ષે નિયમિત છાંટણી કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા સમયે છાંટણીના અભ્યાસમાં ડિસેમ્બરનાં અંતમા (સુષુપ્ત અવસ્થામાં) અથવા જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં છોડને જમીનથી એક મીટર ઊંચાઈ રાખી ઉપરની ડાળીની છાંટણી કરવાથી સારું પરિણામ મળેલ છે. છોડ દીઠ ૫ થી ૬ તંદુરસ્ત ડાળીઓ (૧૫ સે.મી. લંબાઈની) રહેવા દઈ બીજી ડાળીઓ કાપી નાંખવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન :

રોપણી બાદ પ્રથમ વર્ષથી ફળ બેસવાનું શરૂ થાય છે. પરંતુ ત્રીજા વર્ષથી છોડ વ્યાપારિક ધોરણે સારું ઉત્પાદન આપતો થાય છે. મે મહિનામાં ફળો તૈયાર થાય છે. ફળના પુષ્ક વયના છોડ દીઠ ૫ થી ૬ કિલો ફળ મળે છે.



બીલી



બીલી નું મૂળ વતન ભારત છે. ભારતભરમાં બીલીનું ઝાડ પવિત્ર માનવામાં આવે છે.

હવામાન

ઓછામાં ઓછું ૭°સે. થી વધુમાં વધુ ૪૮°સે. તાપમાન બીલીનો છોડ સહન કરી શકે છે. શિયાળો મધ્યમ પરંતુ ઉનાળો ગરમ અને સૂકો હોવો જરૂરી છે. આમ બીલીને સૂકું અને અર્ધ સૂકું હવામાન માફક આવે છે.



જમીન

કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં બીલી સારી રીતે થયી શકે છે, પરંતુ ભારે કાળી અને પાણી ભરાઈ રહે તેવી જમીન અનુકૂળ નથી.

પ્રસર્જન

બીજ, મુળના કટકા, પીલા, આંખ કલમ, થીંગડાકાર આંખ કલમ તેમજ ભેટકલમથી બીલીનું પ્રસર્જન થાય છે.

જાતો

અયોધ્યા-૧૧, મીરઝાપુરી, કાગઝી ગોંદા, પંત શિવાની, પંત અપર્ણા, પંત સુજાતા, પંત ઉર્વશી, સીઆઈએસએચબી-૧ અને ૨ ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો વેજલપુર-ગોધરા (આ.સી.એ.આર.) ખાતે આવેલ કેન્દ્રીય બાગાયત પ્રાયોગિક સંસ્થા દ્વારા “ગોમા યાશી” નામની જાત બહાર પાડેલ છે.

વાવેતર અંતર – ૮ X ૮ મીટર

ખાતર

બીલીને ફુદરતી પરિસ્થિતીમાં ઉગાડવામાં આવે છે, એટલે કે ખાતર સામાન્ય રીતે આપવામાં આવતું નથી. પણ રોપણી પહેલા ખાડા કરીએ ત્યારે માટી સાથે ૧૦ થી ૧૫ કિલો છાણીયું ખાતર મિશ્ર કરી ખાડો ભરી નિશાની કરી રાખવી જેથી રોપણી સરળતાથી નિશાનીવાળી જગ્યાએ જ કરી શકાય.

પિયત

છોડને શરૂઆતમાં બે વર્ષ નિયમિત પાણી આપવું જેથી જમીનમાં યોગ્ય રીતે સ્થાપન થયી શકે. ત્યારબાદ મોટે ભાગે પાણી આપવામાં આવતું નથી. બિનપિયત પાક તરીકે સફળતાપૂર્વક ઉગાડી શકાય છે.

ફૂલ અને ફળ આવવું

બીજથી તૈયાર કરેલ છોડ પર ૭ થી ૮ વર્ષે જ્યારે કલમી છોડ પર ૩-૪ વર્ષે ફૂલ આવે છે. ફૂલ મે-જૂનમાં આવે છે અને ફળ એપ્રિલ માસમાં તૈયાર થતાં હોઈ ૮ થી ૧૦ માસે ફળ તૈયાર થાય છે.

ફળ ઉતારવા

ફળની છાલનો રંગ લીલામાંથી બદલાઈને આછો પીળો કે ઘેરા રંગનો બદામી થાય ત્યારે બીલાને ઉતારવામાં આવે છે. દરેક ફળને ડીંટા સહિત કટર વડે કાપવામાં આવે છે.

પાક સંરક્ષણ

બીલીના ઝાડ ખડતલ હોવાથી મોટેભાગે રોગ-જીવાત લાગતા નથી. છતાં ક્યારેક બેક્ટેરીયલ કેન્સર જોવા મળે છે. જેમાં રોગીષ્ઠ ડાળીને દુર કરી બેક્ટેરીસાઈડ દવાનો છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણ થાય છે.

ઉત્પાદન

સારી માવજત આપેલ ૧૨ થી ૧૫ વર્ષના ઝાડ પરથી ૨૦૦ કરતાં વધુ ફળ મળે છે.



સરગવો



સરગવો પૃથ્વી પરતું અદભૂત વિવિધ ઉપયોગી પર્ણપાતી ઝાડ છે. સરગવો શાકભાજી વૃક્ષ' તરીકે દેશ અને દુનિયામાં સારી ખ્યાતિ ધરાવે છે. આ ઝાડના પોષણ મૂલ્ય ઔષધિય અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ સાથે ખેતીમાં એક રોકડીયા પાક તરીકે ટુંકા ગાળામાં વધારે આવક અને ઉત્પાદનના કારણે હવે સર્વત્ર આ પાક પ્રસિદ્ધિ પામતો જાય છે.

સરગવાના વિવિધ ઉપયોગો

આ ઝાડના દરેક ભાગો જેવા કે પાન, ફૂલ, ફળ અને મૂળ સારા એવા પોષક દ્રવ્યો ધરાવે છે અને ઘણા રોગો અટકાવવા ઉપયોગી છે. તેથી હોમીયોપેથી, સિદ્ધ અને આયુર્વેદિક દવાઓની બનાવટમાં વપરાય છે.

હવામાન

આ પાક ઉષ્ણકટિબંધ અને સમશીતોષણ કટિબંધ પ્રદેશમાં ઉગાડી શકાય છે. ૪૦° સે. સુધીનું ઉષ્ણતામાન તથા સૂકું હવામાન સહન કરી શકે છે.

જમીન

સારી નિતારશક્તિ ધરાવતી, ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી કે ફળદ્રુપતા ધરાવતી રેતાળ, ગોરાડુ જમીન વધુ માફક આવે છે. શેઢા, પાળા, રસ્તા ઉપરની ઓછી માવજતવાળી જમીન પણ સરગવાના ઝાડો ઉત્પાદન આપે છે.

સુધારેલી જાતો

પેરીયાકુલમ-૧ (પીકેએમ-૧), પેરીયાકુલમ-૨ (પીકેએમ-૨), કડુમીયાન મલાઈ -૧ (કે.એમ.-૧), જાફના

અન્ય જાતો : (જૂનાગઢ-પોરબંદર) કારેલિયો સરગવો (ભાવનગર), મોરીંગા જી.કે.વી કે-૧, જી.કે. વી.કે.-૨, ચાવાકાચેરી, દુર્ગા, શબ્દનમ, કોકણ રૂચીરા (ઉત્તમ ગુણવત્તા), કેમ મોરીંગા (લાલ રંગની ટીપ), મુલાનર, કોડાઈલ મોરીંગા (લાલ રંગની હોય),

નિકાસ યોગ્ય જાત : વલયપટ્ટી, પાદરા.

સંવર્ધન

આ પાકનું સંવર્ધન બીજ દ્વારા અને કટકા દ્વારા થાય છે. બીજ (વાર્ષિક સરગવા દા.ત. પી.કે.એમ.-૧) તથા કટકાને (કાયમી સરગવા દા.ત. પાદરા સરગવી) સીધા રોપવાની પ્રથા છે અથવા કોથળીમાં રોપ અથવા કટકા ઉછેરી રોપી શકાય.

અંતર

૩ મી. X ૩ મી. અથવા ૪ મી. X ૪ મી. અથવા ૫ ટ ૫ મી. જાત જમીન અને ઉત્પાદનના ઉપયોગ ઉપર આધારિત અંતર પસંદ કરવું..

પ્રુનિંગ

પ્રથમ સીધા વધતા છોડને વધારે ડાળીઓ ફુટાડવા ૧.૫ મીટર (૬ ફીટ) ઊંચાઈથી કાપવા ત્યારબાદ વર્ષે શીંગો પૂરી થયા બાદ એટલે કે મે-જૂનમાં ૩૦-૪૫ સે. મી. ટોચની ડાળીઓ કાપવી. સરગવાના વૃક્ષો નું પૂનિંગ કરી (૨ મીટર ઊંચાઈ) ઠીંગણા રાખવા જેથી શીંગો ઉતારવામાં અને અન્ય ખેતી કાર્યોની સરળતા રહે. ફક્ત પાન માટેના સરગવાને પૂનિંગ કરી ઠીંગણા રાખવા.

પિયત

સરગવો એ ઉષ્ણકટીબંધનો પાક હોવાથી પાણીની ખેંચ સહન કરી શકે છે. વર્ષાયુ સરગવા ને ઊદિવસે પાણીની જરૂરિયાત પડે છે જ્યારે બહુવર્ષાયુ સરગવાને ૧૫ દિવસે પાણી ની જરૂરિયાત રહે છે.

પાક સરક્ષણ

પાનનાં ટપકાં, ભૂકી છારો, મૂળનો સડો, સૂકારો મુખ્ય રોગ છે. ફૂલ ખાનાર ઈયળ, કાતરા (હેરી કેટરપીલર), શીંગની ફળમાખી, થડ કોરી ખાનાર ઈયળ (ઈન્ડરબેલા) મુખ્ય જીવાત છે

કાપણી

પુરતી વિકસિત થયેલ, કુમળી અને લીલી શીંગોની કાપણી કરવી જોઈએ. વધુ પાકટ શીંગો રેસાવાળી હોય છે. વાવેતર બાદ ૬ થી ૮ માસે કાપણી લાયક શીંગો તૈયાર થાય છે. કાપણી ૨ થી ૩ મહિના ચાલે છે. ઘેરા લીલા રંગમાંથી આછા લીલા રંગની શીંગો થાય ત્યારે ભરાવદાર શીંગો ખાસ પ્રકારના વાંસ ઉપર લગાડેલ ચીપિયા વડે ઉતારવી. શીંગો નીચે પાથરેલ કપડામાં ભેગી કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન

દરેક ઝાડ જાત પ્રમાણે ૨૫૦ થી ૪૦૦ શીંગો આપે છે. તે મુજબ હેક્ટરે અંદાજે ૩૦ થી ૪૦ ટન ઉત્પાદન મળે છે.





જાંબુ



ગુજરાતમાં થતા ગોણ ફળપાકોમાં જાંબુએ અગત્યનું સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતમાં જાંબુની ખેતીની વિશાળ શક્યતાઓ રહેલી છે. ગુજરાતમાં જાંબુની પધ્ધતિસરની ખેતી કરવામાં આવતી નથી. પરંતુ પડતર જમીનો, રસ્તા, શેઠાપાળા કે ગોચર પ્રકારની જમીનમાં ઉગેલા જોવામાં આવે છે.

ઉપયોગ

જાંબુના ફળનું પોષક તેમજ ઔષધીય મુલ્ય ઘણું છે. બીજના પાવડરના ઉપયોગ મધુ પ્રમેહ, દરાજ જેવા રોગોમાં થાય છે. ઉદ્યોગોમાં જાંબુના ફળોનો ઉપયોગ મોટા પાયે વિનેગાર પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.

જમીન

જાંબુના ઝાડને વિવિધ પ્રકારની જમીનમાં ઉગાડી શકાય છે. ક્ષારવાળી જમીન જાંબુના પાક માટે અનુકુળ આવતી નથી.

વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો

ગુજરાતમાં જાંબુની રોપણી માટે જે તે વિસ્તારમાં સ્થાનિક જાત પસંદ કરવામાં આવે છે. કુદરતી રીતે નાના ઠળિયાવાળું મોટા કદના ફળથી તૈયાર છોડનું વાવેતર કરવું જોઈએ.

રાવણા : ઝાડ ઉંચા અને પાન પહોળાં અને મોટાં, ફળ મોટા અને જાંબલી રંગનાં, ચળકતાં, સ્વાદમાં મધુર.

પારસ : ઝાડ ઉંચા અને પાન સાંકડા અને લાંબા, ફળ નાનાં અને જાંબલી રંગના, સ્વાદમાં ખટમધુર.

સંવર્ધન

સામાન્ય રીતે જાંબુનો ઉછેર બીજથી કરવામાં આવે છે. બીજની સ્કુરણ શક્તિ પણ ઘટી જાય છે. જાંબુનો કલમી છોડ બનાવવા માટે જાંબુના થડમાથી તૈયાર થયેલ રોપા ઉપર કલીકાયન અથવા વેજ ગ્રાફ્ટીંગ ધ્વારા કલમી છોડ તૈયાર કરી શકાય છે. જાંબુ બહુભુષીય હોય છે. તેથી બી થી છોડ તૈયાર કરવામાં આવે તો પણ માતૃગુણ ટકી રહે છે.

રોપણી

જાંબુનું ઝાડ લાંબુ આયુષ્ય ધરાવતું હોવાથી અને વાનસ્પતિક વિકાસને ધ્યાને લઈ ૮ X ૮ મીટરના અંતરે રોપણી કરવા સલાહ છે.

ખાતર

ઉછરતા ઝાડને પ્રતિ વર્ષે ઝાડ દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રામ છાણીયું ખાતર અને ફળ આપતાં પુષ્ક ઝાડને પ્રતિવર્ષે ઝાડ દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રામ છાણીયું ખાતર જુન-જુલાઈ માસમાં આપવું. આ ઉપરાંત ૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૨૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૨૫૦ ગ્રામ પોટાશ યુક્ત રાસાયણિક ખાતર ચોમાસાની શરૂઆતમાં આપવું.

પિયત

ઉછરતા ઝાડને પાંચ વર્ષ સુધી પિયતની જરૂર રહે છે. પુષ્ક વયના ફળ આવતા ઝાડને ૪ થી ૬ પિયત ફળના વિકાસ દરમિયાન આપવા.

ફુલ અને ફળની વૃદ્ધિ અને વિકાસ

જાંબુમાં જુના વર્ષની ડાળીની ટોચનો વિકાસ થાય છે. જેના ઉપર ફુલો બેસે છે. જાંબુમાં વર્ષમાં બે વખત ફુલો આવે છે. પરંતુ આપણા હવામાનમાં વર્ષમાં એક જ વખત ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં ફુલો આવે છે. જાંબુમાં પરપરાગનયન થી ફલીકરણ થાય છે. ૬૦ થી ૭૦ દિવસમાં ફળો ઉતારવાલાયક થઈ જાય છે.

ફળની વીણી અને ઉત્પાદન

બીજમાંથી ઉછેરવામાં આવેલ ઝાડ ૮ થી ૧૦ વર્ષે જ્યારે કલમી ઝાડ ૪ થી ૫ વર્ષે ફળ ધારણ કરે છે. ફળો ચોમાસાની શરૂઆતમાં પરિપક્વ થાય છે. પૂર્ણ વિકસિત ઝાડ દીઠ ફળનું ઉત્પાદન ૮૦ થી ૧૦૦ કિ.ગ્રામ મળે છે.





અંજીર



અંજીર એ એક સૂકા અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધના પ્રદેશનું ફળ ઝાડ છે. ભારતમાં અંજીરનું વાવેતર લગભગ ૪૦૦ હેક્ટર જેટલું છે જેમાંથી ૩૦૦ હેક્ટર વિસ્તાર ફક્ત મહારાષ્ટ્રમાં છે. ગુજરાતમાં જૂનાગઢ, ખેડા, વડોદરા જિલ્લામાં છૂટાછવાયુ વાવેતર જોવા મળે છે.

જમીન

અંજીરનું વાવેતર વિવિધ પ્રકારની સારા નિતારવાળી જમીનમાં થઈ શકે છે. મધ્યમ કાળી અને ગોરાડુ જમીન વધુ માફક આવે છે.

આબોહવા

અંજીર ૧૫.૫^{થી} ૨૧^{થી} સેલ્સીયસ જેટલું તાપમાન હોય તેવા વાતાવરણમાં અંજીરના છોડનો વિકાસ સારો થાય છે. આ સમશીતોષ્ણ કટિબંધનું ફળ છે.

વાવેતર અંતર

૪.૫ થી ૫ મીટરના અંતરે વાવેતર કરવું

રોપણી

અંજીરની ખેતીમાં અંજીરના છોડની રોપણી ખાસ કરીને જુલાઈ- ઓગષ્ટ માસમાં કરવામાં આવે છે.

સંવર્ધન

અંજીરનું પ્રસર્જન મુખ્યત્વે કટકા કલમ, હવાની દાબકલમ અથવા ગુટી કલમથી થાય છે.

ખાતર વ્યવસ્થાપન

અંજીરના છોડની રોપણી પછી પ્રથમ વર્ષથી નીચેના કોઠા પ્રમાણે છોડદીઠ ખાતરો આપવા.

વર્ષ	છાણીયું ખાતર (કિ.ગ્રા.)	નાઈટ્રોજન (ગ્રામ)	ફોસ્ફરસ (ગ્રામ)	પોટાશ (ગ્રામ)
પહેલું	૧૦	૧૮૦	૬૦	૫૦
બીજું	૨૦	૩૬૦	૧૨૦	૧૨૦
ત્રીજું	૩૦	૫૪૦	૧૮૦	૧૮૦
ચોથું	૪૦	૭૨૦	૨૪૦	૨૪૦
પાંચમું અને પુખ્ત ઉંમરના ના છોડ માટે	૫૦	૯૦૦	૩૦૦	૩૦૦

કેળવણી અને છંટણી

અંજીરના નવા રોપેલા છોડને આશરે એક મીટરની ઊંચાઈ સુધી અવારનવાર કુટ કાઢતા રહેવું જેથી એક સુંદર અને મજબૂત થડ તૈયાર થાય છે. મૂળ અને થડની નજીક એક પળ ફણાગો ફૂટવા દેવો નહીં. અંજીરનો પહેલો ફાલ આગળના વર્ષની જૂની ડાળીઓ પર આવે છે અને બીજો ફાલ ચાલુ ઋતુની ડાળી પર આવે છે. છંટણીની સાથે સાથે જૂની ડાળીઓ પર ખાંચા પાડવાની પદ્ધતિઓ પણ અપનાવાય છે આથી બાજુની ડાળીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ માટે એકાદ વર્ષ જૂની ડાળીના મધ્યભાગમાં કલિકાની ઉપરના ભાગમાં ફક્ત છાલ તેમજ થોડું લાકડું કપાય તે રીતે ત્રાસો કાંપ ખાંચ' પાડવામાં આવે છે. કાપની લંબાઈ પહોળાઈમાં ફેરફાર જે તે ડાળના કદ ઉપર આધારિત છે. ગુજરાતમાં ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર માસમાં હલકી છંટણી અને ખાંચા પાડવાનું કાર્ય થઈ શકે છે.

ફૂલ અને ફળ બેસવાનો યોગ્ય સમય

સામાન્ય રીતે પાંચમાં વર્ષથી સ્થિર ઉત્પાદન મળે છે. અંજીરના ઝાડ ૩૦ થી ૪૦ વર્ષ સુધી સારું ઉત્પાદન આપે છે ત્યારબાદ સરેરાશ ઉત્પાદન ઘટે છે. પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારતમાં માર્ચથી જૂન સુધી મીઠી બહારના ફળ પાકે છે. દક્ષિણ ભારતમાં અંજીરના બે ફાલ લેવામાં આવે છે. ખટ્ટ બહારના ફળ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર અને મીઠી બહારના ફળ ફેબ્રુ-મે માસમાં થાય છે.

અંજીરની ખેતીમાં ફળનો ઉતાર

અંજીરની મોસમ માર્ચથી શરૂ થઈ મે માસની આખર સુધી ચાલે છે. પૂના વિસ્તારમાં તંદુરસ્ત છોડ ઉપરથી વાર્ષિક સરેરાશ ૨૦ થી ૨૫ કિ.ગ્રા. ફળ ઉતરે છે. હેક્ટરે સરેરાશ અંજીરનું ઉત્પાદન ૮૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ કિ.ગ્રા. જેટલું મળે છે.

અંજીરની સુકવણી

અંજીરની સુકવણી વ્યાપારિક ધોરણે ભારતમાં થતી નથી. પરંતુ સૂકા અંજીરની પરદેશમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે. જો અંજીરની સુકવણી કરવી હોય તો ફળનો ટી.એસ.એસ. ૨૦ કરતા વધારે હોય તેવા ફળ પસંદ કરી અને તેને એક ટકા પોટેશિયમ મેટાબાયસલ્ફાઈટના દ્રાવણમાં ડુબાડી અને સોલર ડ્રાયરમાં સૂકવી શકાય છે.





ગુંદા



ગુંદા મધ્યમ કદના ઝાડ થાય છે. થડ ખરબચડા અને પાન મોટા ૩ થી ૪ ખાંચાવાળા હોય છે. સફેદ રંગના ફૂલ આવે છે. ફળ ગોળાકારે પાકે ત્યારે પીળા રંગના થાય છે.

હવામાન

સૂકું અને અર્ધ સૂકું હવામાન માફક આવે છે.

જમીન

ગુંદા દરેક પ્રકાર ની જમીનમાં થયી શકે છે. પરંતુ દરેક વિસ્તારમાં જમીનને અનુકુળ ગુંદાની જાતો જુદી જુદી હોય છે. સુકા પ્રદેશની રેતાળ તથા બિનફળદ્રુપ જમીન માફક આવે છે.

વર્ધન

ગુંદાનું પ્રસર્જન/વર્ધન મોટે ભાગે બીજથી થાય છે પરંતુ સારી જાતના ગુંદાનું વાવેતર કરવા આખ કલમથી પ્રસર્જન કરવામાં આવે છે.

રોપણી

ઉનાળામાં તૈયાર કરેલ ૬૦ સે.મી. ૮ ૬૦ સે.મી. ૮ ૬૦ સે.મી. ના ખાડામાં પ્રથમ વરસાદ થયે ૬ મીટર ૮ ૬ મીટરના અંતરે રોપણી કરવી.

પિયત

શરૂઆતની અવસ્થામાં વરસાદ ખેંચાય તો પિયતની જરૂર પડે છે. એક વખત છોડ જમીનમાં ખરાબર સ્થાપન થઈ વિકાસ પામે પછીના બે-ત્રણ વર્ષ બાદ પાણી આપવાની જરૂર રહેતી નથી.

ખાતર

ચોમાસાની શરૂઆતમાં પુષ્ક વયના ઝાડ દીઠ ૨૫ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર અને ૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન આપવું.

ઉત્પાદન

શરૂઆતમાં ઉત્પાદન ઓછું મળે છે, પરંતુ ઉંમર વધવા સાથે પુષ્ક વયના ઝાડ દીઠ ૧૨૫ કિલો જેટલા ફળોનું ઉત્પાદન મળે છે.

ઉપયોગ

ફળોમાં ૭૦% માવો હોય છે. તે શર્કરાયુક્ત હોય છે, પરંતુ ખટાશ હોતી નથી. કાચા ફળો અથાણાં માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. પાકા ફળો ખાઈ શકાય છે. પાન ટોરના ચારા માટે ઉપયોગી છે.





કરમદા



કાંટા ધરાવતું સદાપર્ણી ક્ષુપ છે. આદર્શવાડ બનાવવા ઉપયોગી છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં સફેદ રંગના પુષ્પો આવે છે. ફળો એપ્રિલ-મે માસમાં તૈયાર થતા હોય છે. આ સમયે કાચી કેરી મળતી હોવાથી લોકો કાચી કેરી સાથે અથાણાં બનાવવામાં ઉપયોગ કરતા હોય છે.

હવામાન

ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં થઈ શકે છે. સુકા પ્રદેશનું વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે.

જમીન

દરેક પ્રકારની જમીનમાં થઈ શકે છે. સુકા પ્રદેશની રેતાળ તથા બિનફળદ્રુપ જમીન પણ માફક આવે છે.

વર્ધન

કરમદાનું વાવેતર બીજ, કટકા કલમ, નૂતન કલમ અને ભેટ કલમથી થાય છે.

ખતો

લીલા રંગના ફળવાળી, સફેદ રંગના ફળવાળી.

રોપણી

વાડ બનાવવા ૧ થી ૧.૫ મીટરના અંતરે તથા ખેતરમાં વ્યવસ્થિત ૧.૫ થી ૨.૦ મીટરે જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં રોપણી કરવી.

પિયત

નહિવત માત્રામાં પાણીની જરૂર પડે છે. બિનપિયત પાક પણ થઈ શકે છે.

ખાતર

કરમદાનાં પાકને ખાતર આપવાના અખતરા થયેલા નથી છતાં પુખ્ત ક્ષુપ દીઠ ૧૫ થી ૨૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર તથા જરૂર જણાય તો ૧૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૫૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૫૦ ગ્રામ પોટાશ આપવો.

ઉત્પાદન

પુખ્ત છોડદીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાના કદના ફળો.

ઉપયોગ

ફળો વિટામિન 'સી', લોહ તથા ક્ષારથી ભરપૂર છે. પાકા ફળો ખાઈ શકાય છે. અથાણા, ચટણી, જેલી બનાવી શકાય છે.





ભાગ્યત ખાતુ

કૃષિભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત

ફોન નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૪ • ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૩

E : dir-bag@gujarat.gov.in

W : www.ikhedut.gujarat.gov.in, www.doh.gujarat.gov.in