



随机变量的方差

1 随机变量方差的定义

设 X 是一个随机变量，如果 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在，则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的方差，记作 $D(X)$ ，即 $D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$ ，称 $\sqrt{D(X)}$ 为标准差或均方差。



随机变量的方差

2 方差的计算

(1) 定义法

离散情形：若 X 是离散型随机变量，其概率分布为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$



$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = \sum_{i=1}^{\infty} [x_i - E(X)]^2 p_i$$

连续情形：设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则

$$D(X) = E[X - EX]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - EX]^2 f(x) dx$$

(2) 公式法

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$



随机变量的方差

3 方差的性质

(1) 设 c 为常数，则 $D(c) = 0$.

(2) 如果 X 为随机变量， c 为常数，则 $D(cX) = c^2 D(X)$.

(3) 如果 X 为随机变量， c 为常数，则有 $D(X+c) = D(X)$.

由性质 (2) (3) 可得 $D(aX+b) = a^2 D(X)$ (a, b 为任意常数).

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$


$X \quad Y$

概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

常用随机变量的数学期望和方差

分布名称	分布记号	期望	方差
0-1 分布	$X \sim B(1, p)$	p	$p(1-p)$
二项分布	$X \sim B(n, p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	λ	λ
几何分布	$X \sim G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2



概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

随机变量的方差

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, \frac{1}{2}), Y \sim N(0, \frac{1}{2}), Z = |X - Y|$, 求 EZ, DZ 。



概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

随机变量的方差

设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 求 DX 。



随机变量的方差

设 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 进行独立重复观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$,
求 EY^2 。

$$Y \sim B(4, p).$$



概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

随机变量的方差

设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 求 DX .

$$f(x) = F'(x) = a + b \arcsin(x) = a - \frac{\pi}{2}b = 0, \\ 1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} a + b \arcsin(x) = a + b \frac{\pi}{2} = 1. \quad a = \frac{1}{\pi}, \quad b = \frac{2}{\pi}$$

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad -1 < x < 1$$

$$DX = E(X^2) - E(X)^2, \quad E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{x^2 - 1 + 1}{\pi \sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx \\ = \frac{1}{\pi} \arcsin x \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi}, \quad DX = \frac{1}{\pi}$$



概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

随机变量的方差

设 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 进行独立重复观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$, 求 EY^2 .

$$Y \sim B(4, p) \\ p = P\{X > \frac{\pi}{3}\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \sin \frac{x}{2} \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$Y \sim B(4, \frac{1}{2})$$

$$E(Y) = np = 2, \quad D(Y) = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1 = E(Y^2) - E(Y)^2 \\ \therefore E(Y^2) = 3$$

$$E(Y^2) = 3$$



概率论与数理统计——随机变量的数字特征

微信公众号：
小元老师

随机变量的方差

$$D(U) = E(U^2) - E^2(U)$$

$$1 = E(U^2) - 0$$

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, \frac{1}{2}), Y \sim N(0, \frac{1}{2}), Z = |X - Y|$, 求 EZ, DZ .

$$U = X - Y \sim N(0, 1)$$

$$Z = |U|, \quad Z^2 = U^2, \quad f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}, \quad D(X - Y) = D(X) + D(Y) + 2 \times 0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 2 \int_0^{+\infty} u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} d\frac{u^2}{2}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt \quad (t = \frac{u^2}{2}) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} (-e^{-t}) \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$D(Z) = E(Z^2) - E^2(Z) = 1 - \frac{2}{\pi}$$