

Práctica 5: interpolación de Lagrange equiespaciada.

1. **Problema:** dado un conjunto de puntos equiespaciados $\{x_0 = -1, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = 1\}$, con:

$$x_j = -1 + \frac{2j}{n}, \quad (j = 0, 1, \dots, n).$$

Se pide:

- (a) determinar la matriz de polinomios cardinales de Lagrange $\mathbb{P} \in \mathbb{M}_{m+1, n+1}(\mathbb{R})$ ¹ evaluada en un conjunto de puntos $\{z_0, \dots, z_m\}$ denso ($m \approx 600$, por ejemplo):

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} \ell_0(z_0) & \ell_1(z_0) & \dots & \ell_n(z_0) \\ \ell_0(z_1) & \ell_1(z_1) & \dots & \ell_n(z_1) \\ \ell_0(z_2) & \ell_1(z_2) & \dots & \ell_n(z_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_0(z_m) & \ell_1(z_m) & \dots & \ell_n(z_m) \end{pmatrix}, \quad \text{con } \ell_i(z) = \prod_{\substack{j=0 \\ (j \neq i)}}^n \frac{z - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Nota: procurar no hacer uso de bucles anidados para calcular los productos. Un sólo bucle para los denominadores y otro para los numeradores debería ser suficiente.

- (b) para $n = 3, 6$ y 9 , representar los $\ell_i(z_k)$ en el conjunto de puntos z_k para poder visualizar el comportamiento de dichos polinomios entre nodos y comprobar que cumplen $\ell_i(x_j) = \delta_{ij}$.
(c) para $n = 8, 16, 24, 32$, calcular la función de Lebesgue:

$$\lambda_n(x) = \sum_{j=0}^n |\ell_j(x)|$$

sobre el mismo conjunto de puntos z_k y comprobar su crecimiento en los extremos del intervalo. Utilizar una escala adecuada en los ejes.

- (d) interpolar la función $f(x) = e^x$ en $[-1, 1]$ para $n = 4, 6, 8, 10, \dots, 60$ mediante un bucle. Para cada n , evaluar la interpolación en el conjunto de nodos z_k haciendo el producto matriz-vector $\Pi_n f(z_i) = \sum_j \mathbb{P}_{ij} f(x_j)$, evaluar el error máximo

$$\varepsilon_n = \max_{0 \leq k \leq m} |\Pi_n f(z_k) - e^{z_k}|$$

y almacenarlo en un vector. Representar en una gráfica semilogarítmica ε_n frente a n y comprobar la ley $\varepsilon_n \sim 2^n/n \log(n)$. Comprobar que la extrapolación de ε_n para $n \rightarrow 0$ intercepta el eje y cerca de $\varepsilon_{\text{mach}} \sim 10^{-16}$.

¹ $\mathbb{M}_{mn}(\mathbb{R})$ es el espacio de matrices reales de m filas y n columnas