

Classification Asendante Hiérarchique (CAH)

Chargé du cours
Prof. Mustapha Rachdi



Université Grenoble Alpes
UFR SHS, BP. 47
38040 Grenoble cedex 09
France
Bureau : C08 au Bât. Michel Dubois
e-mail : mustapha.rachdi@univ-grenoble-alpes.fr



Introduction


- 1 Introduction
- 2 Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique
- 3 Exemple
- 4 Les *K*-means : un algorithme de partitionnement
- 5 Compléments
 - Consolidation de partition
 - Classification sur des données de grandes dimensions
 - Variables qualitatives et classification
 - Enchaînement analyse factorielle - classification
- 6 Caractérisation de classes d'individus

Introduction

- Définitions :
 - Classification : action de constituer ou construire des classes
 - Classe : ensemble d'individus (ou d'objets) possédant des traits de caractères communs (groupe, catégorie)
- Exemples
 - de classification : règne animal, disque dur d'un ordinateur, division géographique de la France, etc.
 - de classe : classe sociale, classe politique, etc.
- Deux types de classification :
 - hiérarchique : arbre, CAH
 - méthode de partitionnement : partition

Exemple de hiérarchie : le règne animal



Exemple de hiérarchie : le règne animal



Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Quelles données pour quels objectifs ?


- La classification s'intéresse à des tableaux de données individus \times variables quantitatives
- Objectifs** : production d'une structure (arborescence) permettant :
 - la mise en évidence de liens hiérarchiques entre individus ou groupes d'individus
 - la détection d'un nb de classes "naturel" au sein de la population



Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique


Critères

- Ressemblance entre individus :
 - distance euclidienne
 - indice de similarité
 - ...
- Ressemblance entre groupes d'individus :
 - saut minimum ou lien simple (plus petite distance)
 - lien complet (plus grande distance)
 - critère de Ward



Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Algorithme



Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique


Arbres et partitions

Les arbres finissent tous ... par être coupés !!!

- En définissant un niveau de coupure, on construit une partition

Remarque

Vu le mode de construction, la partition n'est pas optimale mais est intéressante



Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Qualité d'une partition

- Quand une partition est-elle bonne ?
 - Si les individus d'une même classe sont proches
 - Si les individus de 2 classes différentes sont éloignés
- Et mathématiquement ça se traduit par ?
 - Variabilité intra-classe petite
 - Variabilité inter-classes grande



⇒ Deux critères, lequel choisir ?

Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Qualité d'une partition

\bar{x}_k moyenne de x_k , \bar{x}_{qk} moyenne de x_k dans la classe q

$$\underbrace{\sum_{k=1}^K \sum_{q=1}^Q \sum_{i=1}^I (x_{iqk} - \bar{x}_k)^2}_{\text{Inertie totale}} = \underbrace{\sum_{k=1}^K \sum_{q=1}^Q \sum_{i=1}^I (x_{iqk} - \bar{x}_{qk})^2}_{\text{Inertie intra}} + \underbrace{\sum_{k=1}^K \sum_{q=1}^Q \sum_{i=1}^I (\bar{x}_{qk} - \bar{x}_k)^2}_{\text{Inertie inter}}$$



⇒ 1 seul critère !

Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Qualité d'une partition

La qualité d'une partition est mesurée par :

$$0 \leq \frac{\text{Inertie inter}}{\text{Inertie totale}} \leq 1$$

- $\frac{\text{Inertie inter}}{\text{Inertie totale}} = 0 \implies \forall k, \forall q, \bar{x}_{qk} = \bar{x}_k$
par variable, les classes ont mêmes moyennes :
Ne permet pas de classifier
- $\frac{\text{Inertie inter}}{\text{Inertie totale}} = 1 \implies \forall k, \forall q, x_{iqk} = \bar{x}_{qk}$
les individus d'une même classe sont identiques
: Idéal pour classifier
- **Attention** : ce critère ne peut être jugé en absolu car il dépend du nbre d'individus et du nbre de classes




Principes de la Classification Ascendante Hiérarchique

Méthode de Ward




- Initialisation : 1 classe = 1 individu \implies In. inter = In. totale
- A chaque étape : agréger les classes a et b qui minimisent la diminution de l'inertie inter

$$\text{Inertie}(a) + \text{Inertie}(b) = \text{Inertie}(a \cup b) - \underbrace{\frac{m_a m_b}{m_a + m_b} d^2(a, b)}_{\text{à minimiser}}$$

Regroupe les objets de faible poids et évite l'effet de chaîne



Regroupe des classes ayant des centres de gravité proches



Intérêt immédiat pour la classification

Exemple

Les données température

- 15 individus : villes de France
- 12 variables : températures mensuelles moyennes (sur 30 ans)

	Janv	Févr	Mars	Avri	Mai	Juin	juil	Août	Sept	Octo	Nove	Déce	Lati	Long
Bordeaux	5.6	6.6	10.3	12.8	15.8	19.3	20.9	21	18.6	13.8	9.1	6.2	44.5	-0.34
Brest	6.1	5.8	7.8	9.2	11.6	14.4	15.6	16	14.7	12	9	7	48.24	-4.29
Clermont	2.6	3.7	7.5	10.3	13.8	17.3	19.4	19.1	16.2	11.2	6.6	3.6	45.47	3.05
Grenoble	1.5	3.2	7.7	10.6	14.5	17.8	20.1	19.5	16.7	11.4	6.5	2.3	45.1	5.43
Lille	2.4	2.9	6	8.9	12.4	15.3	17.1	17.1	14.7	10.4	6.1	3.5	50.38	3.04
Lyon	2.1	3.3	7.7	10.9	14.9	18.5	20.7	20.1	16.9	11.4	6.7	3.1	45.45	4.51
Marseille	5.5	6.6	10	13	16.8	20.8	23.3	22.8	19.9	15	10.2	6.9	43.18	5.24
Montpellier	5.6	6.7	9.9	12.8	16.2	20.1	22.7	22.3	19.3	14.6	10	6.5	43.36	3.53
Nantes	5	5.3	8.4	10.8	13.9	17.2	18.8	18.6	16.4	12.2	8.2	5.5	47.13	-1.33
Nice	7.5	8.5	10.8	13.3	16.7	20.1	22.7	22.5	20.3	16	11.5	8.2	43.42	7.15
Paris	3.4	4.1	7.6	10.7	14.3	17.5	19.1	18.7	16	11.4	7.1	4.3	48.52	2.2
Rennes	4.8	5.3	7.9	10.1	13.1	16.2	17.9	17.8	15.7	11.6	7.8	5.4	48.05	-1.41
Strasbourg	0.4	1.5	5.6	9.8	14	17.2	19	18.3	15.1	9.5	4.9	1.3	48.35	7.45
Toulouse	4.7	5.6	9.2	11.6	14.9	18.7	20.9	20.9	18.3	13.3	8.6	5.5	43.36	1.26
Vichy	2.4	3.4	7.1	9.9	13.6	17.1	19.3	18.8	16	11	6.6	3.4	46.08	3.26


Quelles villes ont des profils météo similaires ?

Comment caractériser les groupes de villes ?

Exemple

Les données température : l'arbre hiérarchique

Hierarchical clustering




Exemple

Les données température

Pertes d'inertie inter lors du passage de

- 15 classes en 14 classes : 0.01
- 14 classes en 13 classes : 0.02
- 13 classes en 12 classes : 0.03
- 12 classes en 11 classes : 0.05
- 11 classes en 10 classes : 0.06
- 10 classes en 9 classes : 0.09
- 9 classes en 8 classes : 0.17
- 8 classes en 7 classes : 0.19
- 7 classes en 6 classes : 0.26
- 6 classes en 5 classes : 0.42
- 5 classes en 4 classes : 0.56**
- 4 classes en 3 classes : 0.69**
- 3 classes en 2 classes : 1.56**
- 2 classes en 1 classe : 7.88**




Grosse perte si on passe de 2 classes à 1 seule donc on préfère garder 2 classes

Somme des pertes d'inertie = 12

Exemple

Utilisation de l'arbre pour construire une partition


- Doit-on faire 2 groupes ?
3 groupes ? 4 ?
- Découpage en 2 groupes :
$$\frac{\text{Inertie inter}}{\text{Inertie totale}} = \frac{7.88}{12} = 66\%$$
- A quoi comparer ce pourcentage ?



Exemple

Utilisation de l'arbre pour construire une partition

- 66% de l'information résumée avec ce découpage en 2 classes
- A quoi comparer ce pourcentage ?




Exemple

Utilisation de l'arbre pour construire une partition

- Séparer **villes froides** en 2 groupes :


$$\frac{\text{Inertie inter}}{\text{Inertie totale}} = \frac{1.56}{12} = 13\%$$



Exemple

Utilisation de l'arbre pour construire une partition



- Passage de 15 villes à 3 classes : $66\% + 13\% = 79\%$ de la variabilité des données



Exemple

Détermination d'un nombre de classes


- A partir de l'arbre
- Dépend de l'usage (enquête, . . .)
- A partir du diagramme des indices de niveau
- Critère ultime : interprétabilité des classes



Algorithme de partitionnement : les *K*-means

Algorithme d'agrégation autour des centres mobiles (K-means)

- Choisir Q centres de classes au hasard
- Affecter les points au centre le plus proche
- Calculer les Q centres de gravité



Compléments

Consolidation d'une partition obtenue par CAH

- La partition obtenue par CAH n'est pas optimale et peut être améliorée, consolidée, par les K-means
 - Algorithme de consolidation :
 - la partition obtenue par CAH est utilisée comme initialisation de l'algorithme de partitionnement
 - quelques étapes de K-means sont itérées
- ⇒ amélioration de la partition (souvent non décisive)
- **Avantage** : consolidation de la partition
 - **Inconvénient** : perte de l'info de hiérarchie

Compléments

CAH en grandes dimensions

- Si beaucoup de variables : faire une ACP et ne conserver que les premières dimensions \Rightarrow on se ramène au cas classique
- Si beaucoup d'individus : algorithme de CAH trop long
 - Faire une partition (par K-means) en une centaine de classes
 - Construire la CAH à partir des classes (utiliser l'effectif des classes dans le calcul) Hierarchical clustering Hierarchical Clustering
 - *Obtention du "haut" de l'arbre de la CAH*




Figure: A gauche : Arbre sur données brutes ; A droite : Arbre à partir de classes


Deux stratégies pour faire une classification sur données qualitatives :

- Se ramener à des variables quantitatives
 - Faire une ACM et ne conserver que les premières dimensions
 - Faire la CAH à partir des composantes principales de l'ACM
- Utiliser des mesures adaptées aux données qualitatives : indice de similarité, indice de Jaccard, etc.

Compléments

Enchaînement analyse factorielle - classification

- Données qualitatives : ACM renvoie des composantes principales qui sont quantitatives
- L'analyse factorielle élimine les dernières composantes qui ne contiennent que du bruit \Rightarrow classification plus stable
- Représentation de l'arbre et des classes sur un plan factoriel \Rightarrow vision continue avec AF, discontinue avec CAH ; vision de l'information sur d'autres axes avec CAH




Caractérisation des classes d'individus

Constitution des classes - édition des parangons

Parangon : individu le plus proche du centre d'une classe

	classe 1 : Montpellier	Bordeaux	Marseille	Nice	Toulouse
	0.419	1.141	1.193	2.242	2.256
classe 2 :	Rennes	Nantes	Brest		
	0.641	1.586	2.045		
classe 3 :	Vichy	Clermont	Grenoble	Paris	Lyon
	0.428	0.669	1.184	1.339	1.680



Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation des classes

- Objectifs :

- Trouver les variables les plus caractérisantes pour la partition
- Caractériser une classe (ou un groupe d'individus) par des variables quantitatives
- Trier les variables qui caractérisent les classes

- Questions :

- Quelles variables caractérisent le mieux la partition ?
- Comment caractériser les individus de la classe 1 ?
- Quelles variables les caractérisent le mieux ?

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation des classes


Quelles variables caractérisent le mieux la partition ?

- Pour chaque variable quantitative :
 - construire le modèle d'analyse de variance entre la variable quantitative expliquée par la variable de classe
 - faire le test de Fisher de l'effet de la classe
- Trier les variables par probabilité critique croissante

	Eta2	P-value
Octo	0.8362	1.930e-05
Sept	0.8301	2.407e-05
Févr	0.8227	3.103e-05
Mars	0.8126	4.326e-05
Janv	0.8118	4.444e-05
Nove	0.8083	4.963e-05
Avri	0.7929	7.890e-05
Déce	0.7871	9.316e-05
Août	0.7864	9.503e-05
Juin	0.7241	4.409e-04
Mai	0.7164	5.205e-04
juil	0.7156	5.287e-04

Caractérisation des classes d'individus


Caractérisation d'une classe par les variables quantitatives



Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les variables quantitatives

- **Idée 1 :** si les valeurs de X pour la classe q semblent tirées au hasard parmi les valeurs de X , alors X ne caractérise pas la classe q



- **Idée 2 :** plus l'hypothèse d'un tirage au hasard est douteuse, plus X caractérise la classe q

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les variables quantitatives

- **Idée 1** : référence du tirage au hasard de n_q valeurs parmi N
Quelles valeurs peut prendre \bar{X}_q ? (i.e. quelle est la loi de \bar{X}_q ?)

$$\mathbb{E}(\bar{X}_q) = \bar{x} \quad \text{var}(\bar{X}_q) = \frac{s^2}{n_q} \left(\frac{N - n_q}{N - 1} \right)$$

$\mathcal{L}(\bar{X}_q) = \mathcal{N}$ car \bar{X}_q est une moyenne

$$\implies \text{Valeur-test} = \frac{\bar{X}_q - \bar{x}}{\sqrt{\frac{s^2}{n_q} \left(\frac{N - n_q}{N - 1} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Si $|\text{Valeur-test}| \geq 1.96$ alors X caractérise la classe q
 - X caractérise d'autant mieux la classe q que $V\text{-test grande}$
- **Idée 2** : classer les variables par $|\text{Valeur-test}|$ décroissante

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les variables quantitatives

\$quanti\$‘1‘

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Sept	3.40	19.30	17.00	0.755	1.79	0.000678
Moye	3.39	13.80	11.80	0.742	1.55	0.000705
Avri	3.33	12.70	11.00	0.580	1.37	0.000871
Octo	3.32	14.50	12.30	0.941	1.77	0.000893
Mars	3.24	10.00	8.23	0.524	1.48	0.001210
Août	3.18	21.90	19.60	0.792	1.94	0.001490
Juin	3.00	19.80	17.80	0.727	1.73	0.002670
Mai	3.00	16.10	14.40	0.691	1.45	0.002720
Nove	2.97	9.88	7.93	0.999	1.74	0.003020
juil	2.92	22.10	19.80	1.000	2.06	0.003550
Févr	2.88	6.80	4.83	0.940	1.81	0.003940
Déce	2.54	6.66	4.85	0.896	1.89	0.011200
Janv	2.46	5.78	3.97	0.924	1.94	0.013700

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les variables quantitatives

\$‘2‘

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Mai	-2.02	12.90	14.40	0.953	1.45	0.04380
Août	-2.02	17.50	19.60	1.090	1.94	0.04330
Juin	-2.05	15.90	17.80	1.160	1.73	0.04020
juil	-2.18	17.40	19.80	1.350	2.06	0.02900
Long	-2.88	-2.34	2.58	1.380	3.21	0.00404
Ampl	-2.95	12.40	15.90	1.560	2.25	0.00316

\$‘3‘

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Sept	-2.05	15.90	17.00	0.738	1.79	0.040700
Avri	-2.11	10.20	11.00	0.637	1.37	0.035100
Moye	-2.60	10.70	11.80	0.620	1.55	0.009220
Octo	-2.81	10.90	12.30	0.661	1.77	0.004940
Mars	-2.85	7.03	8.23	0.807	1.48	0.004310
Nove	-3.15	6.36	7.93	0.654	1.74	0.001620
Févr	-3.25	3.16	4.83	0.763	1.81	0.001150
Déce	-3.28	3.07	4.85	0.911	1.89	0.001020
Janv	-3.36	2.11	3.97	0.876	1.94	0.000793

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation des classes par les variables qualitatives

- Quelles variables caractérisent le mieux la partition ?
 - Pour chaque variable qualitative, construire un test du χ^2 entre la variable et la variable de classe
 - Trier les variables par probabilité critique croissante

```
$test.chi2
      p.value      df
Région 0.001700272 6
```

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les variables qualitatives

- La modalité Nord-Est caractérise-t-elle la classe 3 ?

	Classe 3	Autre classe	Total
Nord-Est	$n_{mc} = 3$	0	$n_m = 3$
Pas NE	4	8	12
Total	$n_c = 7$	8	$n = 15$

- Test : $H_0 : \frac{n_{mc}}{n_c} = \frac{n_m}{n}$ contre $H_1 : m$ anormalement élevée dans c
Sous H_0 : $\mathcal{L}(N_{mc}) = \mathcal{H}(n_c, \frac{n_m}{n}, n)$ $\mathbb{P}_{H_0}(N_{mc} \geq n_{mc})$

Classe 3

	Cla/Mod	Mod/Cla	Global	p.value	v.test
Région=NE	100.00	42.86	20.00	0.077	1.769

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100 ; \frac{3}{7} \times 100 = 42.86 ; \frac{3}{15} \times 100 = 20 ; P_{\mathcal{H}(7, \frac{3}{15}, 15)} [N_{mc} \geq 3] = 0.077$$

$\Rightarrow H_0$ acceptée, Nord-Est n'est pas sur-représenté dans la classe 3
Tri des modalités en fonction des probabilités critiques

Caractérisation des classes d'individus

Caractérisation d'une classe par les axes

Les axes factoriels sont aussi des variables quantitatives

\$'1'						
	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Dim.1	3.39	3.97	0	1.46	3.1	0.000693
\$'2'						
	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Dim.2	2.84	2.29	0	1.29	1.51	0.00447
\$'3'						
	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category	Overall sd	p.value
Dim.2	-2.11	-0.911	0	0.927	1.51	0.0346
Dim.1	-2.56	-2.270	0	1.260	3.10	0.0104

Conclusion

- La classification s'applique à des tableaux individus × variables quantitatives
⇒ L'ACM transforme des variables qualitatives en variables quantitatives
- CAH donne un arbre hiérarchique ⇒ nombre de classes
- K-means consolide les classes
- Caractérisation des classes par des variables actives et supplémentaires, quantitatives et qualitatives