

Cazador de Ciclos

Daniel Bustos

a)

Queremos probar que :

Si todos los vértices de un digrafo D tienen grado de salida mayor a 0 $\rightarrow D$ tiene un ciclo.

Supongamos que todos los vértices de un digrafo D tienen grado de salida mayor a 0. Luego podemos tomar un vértice v_1 , avanzar hacia otro v_2 , de ahí avanzar a v_3 etc. En algún momento, como el grafo es finito, debe ocurrir que haya un ciclo. Esto se puede demostrar fácilmente por el absurdo:

Supongamos un digrafo D finito tal que para todo $v \in V$, $d(v) > 0$ y D no tenga ciclos. Entonces podemos tomar v y avanzar hacia v' con $v' \neq v$. Como no hay ciclos, pero $d(v') \neq 0$ necesariamente debemos poder avanzar hacia v'' con $v'' \neq v' \neq v$, y así infinitamente. Luego D tendría infinitos vértices. ¡Absurdo!.

b)

Queremos probar que un digrafo D es acíclico $\leftrightarrow D$ es trivial o D tiene un vértice con $d_{\text{out}} = 0$ tal que $D - \{v\}$ es acíclico.

Probemos la ida: **D es acíclico $\rightarrow D$ es trivial o D tiene un vértice con $d_{\text{out}} = 0$ tal que $D - \{v\}$ es acíclico.**

Si D es acíclico, debe tener al menos un vértice v que tenga grado 0, de otra manera sería cíclico por la propiedad de (a). Ahora podemos perfectamente remover a v de D ya que sacar un vértice de grado 0 claramente no genera un ciclo, $D - \{v\}$ sigue siendo acíclico.

Ahora la vuelta

D es trivial o D tiene un vértice con $d_{\text{out}} = 0$ tal que $D - \{v\}$ es acíclico $\rightarrow D$ es acíclico.

- Si D es trivial, es claro que D es acíclico.
- Si D tiene un vértice con $d_{\text{out}} = 0$ tal que $D - \{v\}$ es acíclico, podemos simplemente volver a agregar a v . Como $D - \{v\}$ era acíclico y $D - \{v\} \cup \{v\} = D$, y agregar un vértice de grado 0 claramente no nos genera un ciclo nuevo, podemos decir que D es acíclico

□