


Variables Aleatorias II. Variables aleatorias continuas.

Estadística, Grado en Sistemas de Información

Constantino Antonio García Martínez

Universidad San Pablo Ceu

1. Variables aleatorias continuas



S. Ross. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Chapter 4.



C.D. Barr, D.M. Diez, M. Çetinkaya-Rundel. OpenIntro Statistics. Chapters 2-3.

Variables aleatorias continuas

En muchos casos, la observación de un fenómeno aleatorio consiste en realizar medidas de magnitudes continuas. En este caso lo adecuado es $\Omega = \mathbb{R}$.

Ejemplo: Variables aleatorias continuas

Considera la VA X : “tiempo hasta el fallo (en años) de una pieza de un ordenador”. Fíjate que $X \in [0, \infty)$ y que, por tanto, el espacio muestral es infinito.

Preguntar, por tanto, por la probabilidad de que el sistema falle exactamente a los dos años carece de sentido, ya que por Laplace:

En muchos casos, la observación de un fenómeno aleatorio consiste en realizar medidas de magnitudes continuas. En este caso lo adecuado es $\Omega = \mathbb{R}$.

Ejemplo: Variables aleatorias continuas

Considera la VA X : “tiempo hasta el fallo (en años) de una pieza de un ordenador”. Fíjate que $X \in [0, \infty)$ y que, por tanto, el espacio muestral es infinito.

Preguntar, por tanto, por la probabilidad de que el sistema falle exactamente a los dos años carece de sentido, ya que por Laplace:

$$P(X = 2) = \frac{1}{\infty} = 0.$$

En muchos casos, la observación de un fenómeno aleatorio consiste en realizar medidas de magnitudes continuas. En este caso lo adecuado es $\Omega = \mathbb{R}$.

Ejemplo: Variables aleatorias continuas

Considera la VA X : “tiempo hasta el fallo (en años) de una pieza de un ordenador”. Fíjate que $X \in [0, \infty)$ y que, por tanto, el espacio muestral es infinito.

Preguntar, por tanto, por la probabilidad de que el sistema falle exactamente a los dos años carece de sentido, ya que por Laplace:

$$P(X = 2) = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Por tanto, **todas nuestras preguntas** probabilísticas con VAs continuas **deben hacer referencia a intervalos**. Por ejemplo, sí podríamos preguntar acerca de la probabilidad de que el sistema falle entre dos y tres años: $P(2 < X < 3)$.

En muchos casos, la observación de un fenómeno aleatorio consiste en realizar medidas de magnitudes continuas. En este caso lo adecuado es $\Omega = \mathbb{R}$.

Ejemplo: Variables aleatorias continuas

Considera la VA X : “tiempo hasta el fallo (en años) de una pieza de un ordenador”. Fíjate que $X \in [0, \infty)$ y que, por tanto, el espacio muestral es infinito.

Preguntar, por tanto, por la probabilidad de que el sistema falle exactamente a los dos años carece de sentido, ya que por Laplace:


$$P(X = 2) = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Por tanto, **todas nuestras preguntas** probabilísticas con VAs continuas **deben hacer referencia a intervalos**. Por ejemplo, sí podríamos preguntar acerca de la probabilidad de que el sistema falle entre dos y tres años: $P(2 < X < 3)$.

Fíjate que esta pregunta es equivalente a $P(2 \leq X \leq 3)$, $P(2 < X \leq 3)$, etc.

Distribución de variables aleatorias continuas


La intuición es sencilla, para caracterizar una distribución continua debemos usar funciones continuas:



Distribución de variables aleatorias continuas

y esto obliga a transformar **sumatorios en integrales**:

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{x_i: a \leq x_i \leq b} P(X = x_i) \Rightarrow P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



Por eso llamamos a $f(x)$ **función de densidad de probabilidad**.



Función de densidad acumulada

Función de densidad acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du.$$

Fíjate que, por el teorema fundamental del cálculo:

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x).$$



Variables aleatorias

Concepto	Notación/Definición gral.	Caso discreto	caso continuo
FDM y FDM		Función de probabilidad de masa (FPM): $P(X=x)$	Función de densidad de masa (FDM): $f(x)$
Propiedades FDM/FDM		$P(X=x) \geq 0 \quad \sum_{x_i} P(X=x_i) = 1$	$f(x) \geq 0 \quad \int f(x) dx = 1$
Función de distribución o de probabilidad acumulada	$F(x) = P(X \leq x)$	$F(x) = \sum_{x_i: x_i \leq x} P(X=x_i)$	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \iff f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$
Probabilidad de intervalos	$P(a < X \leq b)$	$\sum_{x: a < x \leq b} P(X=x) = F(b) - F(a)$	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
FDM y FDM conjuntas		FPM: $P(X=x, Y=y)$	FDM: $f_{xy}(x, y)$
FDM y FDM marginales		$P(X=x) = \sum_{y_j} P(X=x, Y=y_j)$	$f_x(x) = \int f_{xy}(x, y) dy$
FDM y FDM condicionales		$P(X=x Y=y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$	$f_{x y}(x y) = \frac{f_{xy}(x, y)}{f_y(y)}$
Independencia		$P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$	$f_{xy}(x, y) = f_x(x)f_y(y)$

Ejercicio: Función de densidad

Un call-center recibe llamadas durante todo el día. El tiempo T (en minutos) entre llamadas se modela la siguiente función de densidad.

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot e^{-t/4.5} & 0 \leq t < \infty \\ 0 & \text{en otro caso (e.o.c.)} \end{cases}$$

1. Dibuja la función de densidad.
2. Acaba de llegar una llamada. ¿Cuál es la probabilidad de que no se reciba ninguna llamada en los próximos 5 minutos?

Ejercicio: Función de distribución


Calcula la función de distribución de la VA T y dibújala. Usa la función de distribución para calcular la probabilidad de que el tiempo entre dos llamados sea entre 2 y 3 minutos.

Ejercicio: Media y varianza

Calcula la media, moda y varianza de T .

Distribuciones conjuntas

Para calcular con **probabilidades en más de dos dimensiones**, es útil pensar en **volúmenes (o hiper-volúmenes)**:





Ejercicio: Distribuciones conjuntas

La distribución de X e Y viene dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{(-x^2)}e^{(-2y^2)} & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Visualiza la función de densidad y calcula (a) $P(X > 1, Y < 1)$; (b) $P(X < Y)$

Ejercicio: Distribuciones conjuntas (continuación)



Ejercicio: Probabilidad geométrica

Dos personas acuerdan encontrarse entre las 12:00 y las 12:30 con la condición de que nadie esperará más de 5 minutos por el otro. La probabilidad de que llegada para cada persona es **uniforme** entre las 12:00 y las 12:30.

¿Probabilidad de que se encuentren?

Ejercicio:

Supón que un ordenador depende de los componentes A y B, cuyas vidas respectivas X e Y se distribuyen conjuntamente con la función de densidad:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < y < \infty \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

1. Calcula la probabilidad de que B dure al menos tres unidades de tiempo más que A.
2. Calcula la probabilidad de A y B duren ambos más de 2 unidades de tiempo.
3. Calcula las funciones de densidad marginales.
4. Calcula la función de densidad condicional para X si sabemos que B ha durado 5 unidades de tiempo.
5. Calcula la función de densidad condicional para Y si sabemos que A ha durado 5 unidades de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que B dure entre 4 y 7 unidades de tiempo si A ha durado 5 unidades de tiempo?

Ejercicio:

En el ejercicio anterior (dos componentes A y B). ¿Cuál es el valor esperado para Y si $X=5$?

Ejercicio:

Tiramos dardos a una diana de radio 1 con centro en el origen. Los dardos impactan aleatoriamente en el punto (X, Y) . Supongamos que (X, Y) se distribuye uniformemente en la diana. ¿Cuál es la distancia esperada al origen?