



Übungen Analysis 1 für Ingenieure und Informatiker: Blatt 5

19. Es sei $a := 2, \overline{17}$. Bestimme mit der Dezimalbruchentwicklung $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$, sodass $a = \frac{p}{q}$ gilt.
20. (a) Es seien die Reihen $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}$ und $\sum_{k=0}^{\infty} 3^{-k}$ gegeben. Berechne die Summanden c_k des Cauchyproduktes dieser beiden Reihen und bestimme dessen Wert.
- (b) Zeige, dass für $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$ gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)q^k = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

- (c) Es seien $a_0 := 0$ und $a_k := (-1)^{k+1} \frac{1}{\sqrt{k}}$ für $k \in \mathbb{N}$. Zeige, dass die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert, aber das Cauchyprodukt der Reihe mit sich selbst divergiert.
21. Bestimme den Konvergenzradius folgender Potenzreihen

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} k^{-k} x^k$

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{k^k} x^k$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} x^{3k}$

e) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^k} x^{2k}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^k}{k}\right)^{k^2} x^k.$

22. Untersuche die folgenden Reihen auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \log \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

b) $\sum_{k=2}^{\infty} (\log k)^{-\log k}.$

23. Zeige die Konvergenz und berechne den Wert von

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}$$

d.h. den Grenzwert der Folge (a_n) mit $a_0 := 1$ und $a_{n+1} := \sqrt{1 + a_n}$.

24. Gegeben sei die Menge

$$M_1 := \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, \dots, 30, 32, 33, \dots\}$$

also die Menge aller natürlichen Zahlen, in deren Dezimaldarstellung keine 1 auftaucht. Zeige, dass

$$\sum_{n \in M_1} \frac{1}{n} < \infty.$$