



1. (NA) Minifragen

Zeigen oder widerlegen sie:

1. Wenn eine Matrix nur positive Einträge hat, sind alle ihre Eigenwerte positiv.
2. Falls A und $-A$ dieselben Eigenwerte besitzen, dann ist A nicht invertierbar.
3. Bei einer Dreiecksmatrix stehen die Eigenwerte auf der Diagonalen.

2. (A) Diagonalisieren von Matrizen

Es sei $A \in M(3 \times 3, \mathbb{K})$, $A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$.

1. Bestimmen Sie das charakteristische Polynom, die Eigenwerte inklusive ihrer algebraischen und geometrischen Vielfachheiten sowie Basen der Eigenräume von A . (2)
2. Bestimmen Sie eine invertierbare Matrix S , so dass $S^{-1}AS$ eine Diagonalmatrix ist. (1)
3. Berechnen Sie A^n für $n \in \mathbb{N}$. (1)

Führen Sie die obigen Schritte 1 und 2 auch für die Matrix B statt A durch, falls möglich:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

3. (A) Die Fibonacci-Folge

Wir betrachten die Fibonacci-Folge mit $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ und $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ für $n \geq 2$.

1. Bestimmen Sie eine Matrix $A \in M(2 \times 2, \mathbb{R})$ mit $A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$. (2)
2. Zeigen Sie, dass A diagonalisierbar ist und bestimmen Sie eine Basis des \mathbb{R}^2 aus Eigenvektoren von A . (2)
3. Bestimmen Sie A^n für beliebiges $n \in \mathbb{N}$. (1)

4. Folgern Sie aus dem letzten Schritt, dass das n -te Glied der Fibonacci-Folge die Darstellung

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

besitzt. (1)

4. (A) Eigenschaften von Eigenwerten

Zeigen Sie

- (a) Ist $A \in M(2 \times 2, \mathbb{R})$ symmetrisch, so sind alle Eigenwerte von A reell. (1)
- (b) Wenn λ ein Eigenwert von A ist, dann ist $-\lambda$ ein Eigenwert von $-A$. (1)
- (c) $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ ist genau dann nicht invertierbar, wenn 0 ein Eigenwert von A ist. (1)
- (d) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ invertierbar und $\lambda \in \mathbb{K}$ ein Eigenwert von A , dann ist $\lambda \neq 0$ und $\frac{1}{\lambda}$ ein Eigenwert von A^{-1} . (1)
- (e) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ ein Eigenwert von A , dann ist für $m \in \mathbb{N}$ auch λ^m ein Eigenwert von A^m . (1)
- (f) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$, dann haben A und A^\top das gleiche charakteristische Polynom und die gleichen Eigenwerte. (1)

5. (A) Diagonalisierbarkeit von Matrizen

- a) Eine Matrix $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ heißt nilpotent, falls es ein $m \in \mathbb{N}$ gibt, für das $A^m = 0$ gilt. Zeigen Sie:
 - i) Falls $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ nilpotent ist, dann hat A nur den Eigenwert 0. (2)
 - ii) Falls $0 \neq A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ nilpotent ist, ist A nicht diagonalisierbar. (1)
- b) Zeigen Sie: Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ symmetrisch, so sind die Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal (bzgl. des Standardskalarprodukts). (3)

6. (T),(NA) Es sei $A \in M(3 \times 3, \mathbb{K})$, $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- 1. Bestimmen Sie das charakteristische Polynom, die Eigenwerte inklusive ihrer algebraischen und geometrischen Vielfachheiten sowie Basen der Eigenräume von A .
- 2. Bestimmen Sie eine invertierbare Matrix S , so dass $S^{-1}AS$ eine Diagonalmatrix ist.
- 3. Berechnen Sie A^n für $n \in \mathbb{N}$.

Führen Sie die obigen Schritte auch für die folgende Matrix durch, falls möglich:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

7. (T), (NA)

- (a) Es sei $G = (g_{ij}) \in M(n \times n, \mathbb{R})$ eine Matrix, deren Spaltensummen alle 1 sind, d.h.

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} : \left(\sum_{i=1}^n g_{ij} = 1 \right).$$

Zeigen Sie, dass 1 ein Eigenwert von G ist.

- (b) Zeigen Sie die folgenden Aussagen über orthogonale Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:
- (a) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, wobei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das kanonische Skalarprodukt bezeichnet.
 - (b) $\det A \in \{1, -1\}$.
 - (c) Zeigen Sie, dass die orthogonalen Matrizen A mit $\det A = 1$ eine Untergruppe von $O(n)$ bilden. Diese wird mit $SO(n)$ bezeichnet.

Erläuterungen zur Bearbeitung und Abgabe:

- (NA) Die Lösung dieser Aufgabe müssen Sie nicht aufschreiben und abgeben.
- (A) Die Lösung dieser Aufgabe schreiben Sie bitte auf und geben Sie ab.
- (T) Die Aufgabe dient der Vorbereitung auf das Tutorium. Sie sollten sie mindestens in groben Zügen verstanden und durchdacht haben.
- Die Abgabe der Lösungen erfolgt **einzeln** auf Moodle als einzelne PDF Datei.
 - Wir korrigieren auf jedem Übungsblatt nur jeweils zwei Aufgaben. Eine Aufgabe wird von uns festgelegt, die andere dürfen Sie sich aussuchen. Schreiben Sie dazu bitte auf jede Abgabe eine Erst- und Zweitpräferenz von Aufgaben, die wir korrigieren sollen.