

1. Klausur zu Lineare Algebra für Informatiker und Ingenieure

Gesamtpunktzahl: 115 Punkte

Hinreichende Punktzahl für das Bestehen der Klausur: 50 Punkte

1. a) Definiere folgende Begriffe: (i) Äquivalenzrelation (ii) Ähnlichkeit von Matrizen.
b) Zeige, dass die Relation R mit

$$A R B :\Leftrightarrow A \text{ und } B \text{ sind ähnlich}$$

eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{R}^{n \times n}$ ist. (4+10 Punkte)

2. Es seien $\pi \in S_4$ und $\tau \in S_6$ mit $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ und $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

- a) Berechne π^n für $n \in \mathbb{N}$.
b) Schreibe τ als Produkt von Transpositionen. Ist die Darstellung eindeutig? Begründe.
c) Bestimme die Inversionen und das Vorzeichen von τ .
d) Gib eine geschlossene Formel für die Berechnung der Determinante einer quadratischen Matrix mit Hilfe von Permutationen an (Leibnizformel).

(3+4+3+2 Punkte)

3. Gegeben sei die lineare Abbildung $\varphi : P_3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $f \mapsto (f'(0), f'(1), f'(2) + f(2))^\top$. Zwei Basen von P_3 seien durch $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ und $\mathcal{A}' = \{1, 1-x, 1-x^2, 1-x^3\}$ gegeben. Außerdem seien zwei Basen des \mathbb{R}^3 gegeben durch

$$\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ und } \mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- a) Bestimme die Darstellungsmatrix $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{A}}(\varphi)$.
b) Bestimme die Darstellungsmatrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}'}(\varphi)$.
c) Bestimme $\dim \text{Kern}(\varphi)$ und $\dim \text{Bild}(\varphi)$.
d) Ist φ surjektiv bzw. injektiv? Begründe. (3+8+7+3 Punkte)

4. a) Definiere den Begriff Skalarprodukt.

- b) Es sei $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ das kanonische Skalarprodukt. Für $v \in \mathbb{R}^n$ bezeichne $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$ die euklidische Norm. Es seien v und w orthogonal bezüglich $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Zeige, dass dann gilt

$$\|v\|^2 + \|w\|^2 = \|v + w\|^2.$$

(2+4 Punkte)

5. Gegeben seien $v_1 = (-2, 0, -2)^\top$, $v_2 = (-a, -2, 1)^\top$, $v_3 = (0, a, \frac{1}{8})^\top$ und $a \in \mathbb{R}$.

- a) Für welche $a \in \mathbb{R}$ sind (v_1, v_2, v_3) linear unabhängig?
b) Es sei nun $A = (v_1|v_2|v_3) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Gibt es ein $a \in \mathbb{R}$, sodass das Gleichungssystem $Ax = b$ zwar eindeutig aber nicht universell lösbar ist? Falls ja, gebe ein solches a an. Falls nicht, begründe warum ein solches a nicht existiert. (5+2 Punkte)

6. Berechne den Eintrag x_3 der Lösung $x \in \mathbb{C}^4$ von $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2+2i & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 3-4i & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 4} \text{ und } b = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4$$

und bringe das Ergebnis auf die Form $a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$. (8 Punkte)

7. Zeige oder widerlege folgende Aussagen:

- a) Es sei $n \in \mathbb{N}$. Ist λ ein Eigenwert von A , dann ist λ^n ein Eigenwert von A^n .
b) Falls $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kommutieren, d.h. $AB = BA$, dann gilt $\det A = \det B$.
c) Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und λ ein Eigenwert von A mit algebraischer Vielfachheit n . Falls A nicht die Matrix ist mit den Einträgen λ auf der Diagonalen und 0 sonst, ist A nicht diagonalisierbar.

(4+3+5 Punkte)

8. Es sei die quadratische Form $f(x) = x^\top Ax = \frac{14}{9}x_1^2 + \frac{14}{9}x_2^2 + \frac{17}{9}x_3^2 - \frac{8}{9}x_1x_2 + \frac{4}{9}x_1x_3 + \frac{4}{9}x_2x_3$ gegeben mit

$$A = \begin{pmatrix} 14/9 & -4/9 & 2/9 \\ -4/9 & 14/9 & 2/9 \\ 2/9 & 2/9 & 17/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 14 & -4 & 2 \\ -4 & 14 & 2 \\ 2 & 2 & 17 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- a) Gegeben seien die Vektoren $v_1 = (1, 0, 2)^\top$ und $v_2 = (-4, 5, 2)^\top$. Zeige, dass v_1 ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 2 ist. Ist v_2 auch ein Eigenvektor von A ? Falls ja, zu welchem Eigenwert?
b) Bestimme den Eigenraum zum Eigenwert 1 von A .
c) Bestimme das charakteristische Polynom von A und zerlege es soweit wie möglich in Linearfaktoren. Verwende dabei nicht die Aufgabenteile a) und b).
d) Bestimme eine invertierbare Matrix S , so dass $f(Sx) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i x_i^2$ gilt, wobei $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ die Eigenwerte von A sind.
e) Eine Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt positiv definit, falls $x^\top Bx > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Zeige, dass eine symmetrische Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ genau dann positiv definit ist, falls B nur positive Eigenwerte besitzt.
f) Untersuche A auf positive Definitheit.
g) Zeige, dass $A^n = SD^nS^{-1}$ gilt, wobei D eine Diagonalmatrix mit den Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ auf der Hauptdiagonalen ist. Gebe S, S^{-1} und D^n explizit an.

Hinweis: Die Berechnung von A^n darf hier mit „...“ ausgeschrieben werden.

(3+4+4+9+9+2+4 Punkte)

Viel Erfolg!