

1. Quiz de Probabilidad y Estadística

Seleccione la opción correcta en cada pregunta.

1. ¿Qué es estimación puntual en estadística?
 - a) Un procedimiento para generar un conjunto de valores posibles para un parámetro poblacional desconocido.
 - b) Una aproximación mediante pruebas de hipótesis a un parámetro poblacional desconocido.
 - c) Cálculo de un intervalo en el que puede estar un parámetro poblacional desconocido.
 - d) Un único valor que sirve como estimación de un parámetro poblacional desconocido.
2. ¿Qué propiedad no se asocia generalmente con los estimadores puntuales?
 - a) Consistencia
 - b) Inssegadez
 - c) Simetría
 - d) Eficiencia
3. Para una muestra independiente e idénticamente distribuida, la función de likelihood es:
 - a) La suma de densidades
 - b) El logaritmo de las densidades
 - c) La media de densidades
 - d) El producto de densidades individuales
4. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el concepto de estimador eficiente?
 - a) Es un estimador cuyo resultado tiende al parámetro poblacional a medida que el tamaño de la muestra aumenta.
 - b) Es un estimador insesgado y consistente.
 - c) Es el estimador con mínima varianza, sea insesgado o no.
 - d) Es un estimador insesgado que minimiza la varianza entre todos los estimadores insesgados.
5. Sea $X_1, \dots, X_n \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$. El estimador por momentos de θ es:
 - a) $(1/n) \sum X_i$
 - b) $\max(X_i)$
 - c) $((n+1)/n) \max(X_i)$
 - d) $2(1/n) \sum X_i$