08/03/2022

R.R.P.

Clasificación de los números Reales



$$2 = \frac{2}{1} = \frac{10}{5}$$

NO SE PUEDE DIVIDIR POR CERO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$$\begin{array}{r|l} 30 & 4 \\ 20 & 0,75 \\ 0 & \end{array}$$

0/5 = 0 EN CAMBIO 5/0 = ERROR

$$0,6 = \frac{6}{10} \xrightarrow{:2} \frac{3}{5}$$

$$1/9 = 0,111111$$

$$0,\overset{\curvearrowright}{1}$$

$$3,5\overset{\frown}{48} = \frac{3548 - 35}{990} = \frac{3513}{990} \xrightarrow{:3} \frac{1171}{330}$$

$$3,5484848...$$

$$\frac{1}{2} \text{ y } \frac{3}{5}$$

$\times 5$ $\qquad$ $\times 2$

$$\frac{50}{100} < \frac{60}{100}$$



$$\frac{53}{100} \; ; \; \frac{57}{100}$$





$3 > 2$

$-2 < 1$

ORDEN

Anexo teórico

$\forall \quad \exists \quad \therefore \quad : \quad /$

Propiedades de los números Reales

Símbolos: $\in$ = Pertenece, $\forall$ = Para todo, $\exists$ = Existe, $\therefore$ = Por lo tanto, : ó / = Tal que

S1) ASOCIATIVA: $a+(b+c)=(a+b)+c \quad \forall \quad a,b,c \in \mathrm{R}$

S2) CONMUTATIVA: $a+b=b+a \quad \forall \quad a,b \in \mathrm{R}$

S3) EXISTE NEUTRO ADITIVO: $\exists \; 0 \in \mathrm{R}$ tal que $a+0=a \quad \forall \quad a \in \mathrm{R}$

S4) EXISTE SIMÉTRICO: $\forall \; a \in \mathrm{R}, \exists \; b \in \mathrm{R}$ tal que $a+b=0$; b es el *opuesto* de a.

M1) ASOCIATIVA: $a \cdot (b \cdot c)=(a \cdot b) \cdot c \quad \forall \; a,b,c \in \mathrm{R}$

M2) CONMUTATIVA: $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall \quad a,b \in \mathrm{R}$

M3) EXISTE NEUTRO MULTIPLICATIVO: $\exists \; 1 \in \mathrm{R}$ tal que $a \cdot 1 = a \quad \forall \quad a \in \mathrm{R}$

M4) EXISTE INVERSO MULTIPLICATIVO: Dado $a \neq 0$, $a \in \mathrm{R}$, $\exists \; b \in \mathrm{R} : a \cdot b = 1$

D1) DISTRIBUTIVA: $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall \quad a,b,c \in \mathrm{R}$

Si $a=b \Rightarrow a+c=b+c \quad \forall \; c \in \mathrm{R}$ y además $a \cdot c = b \cdot c \quad \forall \; c \in \mathrm{R}$.

Si $a \cdot b = 0 \quad \Rightarrow \quad a=0 \quad ó \quad b=0$, es decir, al menos uno de ellos debe ser nulo.

$(2+3)+4 = 2+(3+4)$

$5+4 = 2+7$

$2+6=6+2$

$9+0=9$

$9+(-9)=0$



$6 \cdot 1 = 6$

$6 \cdot 1/6 = 1$

$5 \cdot (2+3) = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3$

$(3+4) \cdot 2 = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2$

$$7(x-2) = 7 \cdot x - 7 \cdot 2$$

$$2 \cdot x - 3 = 7$$

$$2x \underbrace{\cancel{-3} + \cancel{3}} = 7 + 3$$

$$2x + 0 = 10$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x} = 10 \cdot \frac{1}{2}$$

$$1 \cdot x = 5$$

$$\underline{x = 5}$$

$$2 \cdot \left[3 + \frac{x}{2}\right] = [8] \cdot 2$$

$$6 + x = 16$$

$$x = 16 - 6$$

$$x = 10$$