

Monitoreo satelital de señales asociadas con cianobacterias

Lagos Atitlán y Amatitlán, Guatemala

Laboratorio 4 — Análisis geoespacial y sensores remotos

Grupo 1

CC3084 — Data Science

Agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Se analizaron 22 imágenes Sentinel-2 L2A, once por lago, adquiridas entre enero de 2025 y julio de 2026. Mediante Copernicus Data Space Ecosystem se calcularon NDVI, NDWI y el proxy de cianobacterias del modelo Se2WaQ, descargando únicamente las bandas necesarias. Amatitlán presentó una señal mucho más intensa, extensa y persistente: seis fechas cubrieron al menos 10% del lago con CYA mayor o igual que 40 y la extensión máxima llegó a 97.50%. Atitlán no registró fechas bajo ese criterio; su máximo calculado fue 3.14%, pero corresponde a una imagen con una discontinuidad de tesela y se interpreta con cautela. La máxima mediana robusta de ambos lagos ocurrió el 13 de abril de 2026: 262.24 en Amatitlán y 2.57 en Atitlán. Los resultados describen una respuesta espectral útil para priorizar vigilancia, no una confirmación de células, toxinas ni riesgo sanitario. Se requiere validación con mediciones de campo.

Mensaje para la gestión ambiental. El producto CYA es un modelo empírico satelital expresado en 10^3 células/ml. No sustituye el conteo de laboratorio ni demuestra toxicidad. Su valor está en reconocer contrastes espaciales y temporales que orienten muestreos de campo.

1 Problema y objetivo

Las floraciones de cianobacterias pueden reducir el oxígeno, alterar el ecosistema y afectar actividades recreativas, turísticas y de abastecimiento. La observación satelital permite revisar grandes superficies en fechas repetidas, pero responde a propiedades ópticas de la superficie y está condicionada por nubes, sombras y la calibración del modelo.

El objetivo fue describir la evolución temporal y espacial del proxy CYA en Atitlán y Amatitlán, relacionarlo con NDVI y NDWI, comparar los dos lagos y explorar extensión, persistencia, distribución y posible estacionalidad. Las interpretaciones se sustentan en las estadísticas y mapas generados; las explicaciones ambientales se presentan como hipótesis compatibles con literatura, no como causalidad demostrada.

2 Datos y delimitación espacial

Se utilizó Sentinel-2 L2A mediante la API openEO de Copernicus. La guía estableció once fechas por lago y se conservaron exactamente. Los GeoJSON entregados por el curso reproducen las cajas

rectangulares de las coordenadas publicadas: 121.7 km² para Amatitlán y 474.2 km² para Atitlán. Estas geometrías limitan la consulta, pero no siguen la orilla.

Para calcular porcentajes del lago se usaron contornos del espejo de agua obtenidos de OpenStreetMap, relaciones 11018382 y 5781818, con áreas proyectadas aproximadas de 15.02 km² y 124.70 km², respectivamente. Así se distingue la *extensión oficial de búsqueda* del *polígono usado como denominador ambiental*.

Tabla 1: Diseño del conjunto de observaciones.

Lago	Fechas	Área de recorte	Cobertura válida observada
Amatitlán	11	15.02 km ²	77.68–97.53%
Atitlán	11	124.70 km ²	43.21–98.38%

3 Procesamiento e índices

Se solicitaron únicamente B02 (azul), B03 (verde), B04 (rojo), B08 (infrarrojo cercano) y SCL (clasificación de escena). Los productos se generaron a 20 m en UTM zona 15N. Las reflectancias se obtuvieron multiplicando los enteros de Sentinel-2 por 0.0001.

$$\text{NDVI} = \frac{B08 - B04}{B08 + B04}, \quad (1)$$

$$\text{NDWI} = \frac{B03 - B08}{B03 + B08}, \quad (2)$$

$$\text{CYA} = 115530.31 \left(\frac{B03 B04}{B02} \right)^{2.38}. \quad (3)$$

La fórmula CYA coincide con Se2WaQ [1, 2]. El script define el fondo mediante NDWI y presenta CYA cuando NDWI ≥ 0 ; este criterio se reprodujo. Se excluyeron SCL 0, 1, 3, 8, 9, 10 y 11, además de reflectancias no positivas. Los píxeles excluidos permanecieron como datos faltantes y nunca se reemplazaron por cero.

La escala gráfica Se2WaQ termina en 100, pero la fórmula no. Por eso el análisis principal usa mediana y percentiles crudos. La media limitada a 0–100 se conserva solo como diagnóstico de saturación. Se definió CYA ≥ 40 como señal alta porque 40 es un corte publicado en la rampa Se2WaQ; no es un límite sanitario. También se repitió el cálculo con 20 y 60.

4 Control de calidad

Las 22 observaciones contienen NDVI, NDWI y CYA con rejillas compatibles. Tres fechas tuvieron menos de 80% de cobertura válida: Amatitlán 28-04-2026 (77.68%), Atitlán 18-01-2025 (43.21%) y Atitlán 12-02-2026 (77.08%). Además, Atitlán 17-07-2025 presenta una discontinuidad rectangular occidental compatible con un límite de tesela. La fecha se conserva para trazabilidad, pero ese parche no se interpreta como patrón natural ni se usa para seleccionar mapas representativos.

Las líneas temporales conectan fechas separadas e irregulares. No implican que el valor haya cambiado de manera lineal entre adquisiciones.

5 Análisis temporal




Figura 1: Mediana, percentil 90 y porcentaje del área total del lago con $CYA \geq 40$. La escala logarítmica permite comparar lagos con órdenes de magnitud distintos.

Amatitlán alternó dos regímenes visibles (Figura 1). Enero de 2025, noviembre de 2025 y enero–febrero de 2026 mostraron extensiones bajas. En abril de 2025 y desde el 29 de marzo hasta el 19 de junio de 2026 la señal fue generalizada. La máxima mediana ocurrió el 13-04-2026, con 262.24; el percentil 90 fue 433.04 y 97.50% del lago superó 40.

Seis fechas se clasificaron como críticas por cubrir al menos 10% del lago: 15-04-2025, 28-04-2025, 29-03-2026, 13-04-2026, 28-04-2026 y 19-06-2026. El criterio identifica extensión, no toxicidad.

Atitlán permaneció varios órdenes de magnitud por debajo. Su máxima mediana fue 2.57 el 13-04-2026 y su percentil 90 llegó a 17.43. El mayor porcentaje calculado, 3.14% el 17-07-2025, está afectado por el artefacto mencionado. Ninguna fecha alcanzó el criterio crítico de 10%.

6 Análisis espacial

Distribución espacial en fechas representativas




Figura 2: Distribución espacial en fechas representativas con buena calidad visual. La rampa común 0–100 facilita la comparación; el triángulo superior indica valores que exceden la escala.

En Amatitlán, las fechas altas no se limitaron a una bahía: ocuparon los dos lóbulos y el canal que los conecta. En el resumen por cuadrantes, el noroeste tuvo la mayor mediana típica (119.37), seguido del sureste (84.08), noreste (77.99) y suroeste (60.03). Las diferencias internas siguen siendo menores que el contraste entre fechas bajas y altas.

Atitlán presentó un fondo generalmente bajo con focos pequeños y cambiantes. La mediana típica por cuadrante varió entre 0.50 y 0.83. Los porcentajes altos fueron mayores en algunos sectores occidentales y suorientales, pero no formaron una cobertura generalizada y parte del máximo occidental de julio de 2025 es un artefacto.

Zonas persistentes de acumulación




Figura 3: Persistencia de $CYA \geq 40$. Solo se muestran píxeles con al menos seis observaciones válidas.

En Amatitlán, 90.44% del área superó 40 en al menos la mitad de sus observaciones válidas; 1.38% lo hizo en al menos tres cuartas partes. En Atitlán estas proporciones fueron 0.20% y 0.09%. La persistencia confirma que el contraste no depende de un único día, aunque el denominador variable exige cautela.

7 Correlación con NDVI y NDWI

Se calcularon Pearson, Pearson sobre $\log_{10}(CYA)$ y Spearman por lago y fecha. También se generó una submuestra espacial regular para comprobar la estabilidad del signo sin tratar cada píxel vecino como observación completamente independiente.

Tabla 2: Mediana del coeficiente de Spearman entre las once fechas.

Lago	Relación	Coeficiente mediano	Fechas negativas
Amatitlán	CYA-NDVI	0.324	2 de 11
Amatitlán	CYA-NDWI	-0.488	9 de 11
Atitlán	CYA-NDVI	0.078	5 de 11
Atitlán	CYA-NDWI	-0.776	11 de 11

Relación entre el proxy de cianobacteria y los índices espectrales




Figura 4: Dispersión entre CYA, NDVI y NDWI en fechas representativas. CYA se muestra en escala logarítmica.

La relación con NDVI fue débil en Atitlán y débil a moderada en Amatitlán, además de cambiar de signo en algunas fechas. No existe una correspondencia simple entre vegetación terrestre y el proxy dentro del agua. La relación CYA–NDWI fue predominantemente negativa. Esto no demuestra que más agua reduzca cianobacterias: ambos índices comparten bandas y el propio filtro $NDWI \geq 0$ restringe el dominio. Los valores de significancia estadística son optimistas por autocorrelación espacial y no se usan como prueba causal.

8 Comparación ambiental de los lagos




Figura 5: Comparación de intensidad típica, extensión y frecuencia de fechas críticas.

Tabla 3: Indicadores principales de comparación.

Indicador	Amatitlán	Atitlán
Mediana típica de CYA	103.35	0.84
Máxima mediana de CYA	262.24	2.57
Mediana del área alta	76.34%	0.21%
Máxima área alta	97.50%	3.14%*
Fechas críticas	6	0
Área persistente, fracción ≥ 0.50	90.44%	0.20%

*La imagen asociada contiene una discontinuidad rectangular y no se interpreta como cobertura natural completa.

El contraste de la Figura 5 es coherente con diferencias en morfología y presión de cuenca. AMSA describe Amatitlán como un lago sometido a contaminación continua, con descargas de municipios de la cuenca y escaso tratamiento [4]. Estudios sedimentarios relacionan su condición moderna con aportes excesivos de nutrientes transportados por el río Villalobos desde el área metropolitana [5].

Atitlán es más grande, profundo y endorreico. La literatura documenta aguas residuales sin tratar, erosión y escorrentía agrícola como fuentes de nutrientes [7, 6]. También ha tenido floraciones históricas; por ello, la señal menor del período estudiado no implica ausencia de riesgo futuro. Temperatura, mezcla vertical, disponibilidad de nitrógeno y fósforo, viento y precipitación pueden modificar los eventos [6]. No se contó con estas variables simultáneas, por lo que son explicaciones plausibles y no causas demostradas por este análisis.

9 Análisis exploratorio adicional

9.1 Sensibilidad del umbral

El patrón general se mantuvo con umbrales 20, 40 y 60. Por ejemplo, el 13-04-2026 Amatitlán cubrió 97.52%, 97.50% y 97.05%, respectivamente. En Atitlán, esa fecha pasó de 7.76% con 20 a 1.46% con 40

y 0.40% con 60. La magnitud exacta depende del corte, pero la diferencia entre lagos es robusta.

9.2 Distribuciones y diferencias




Figura 6: Distribución de CYA por fecha. La escala logarítmica evita que los valores altos oculten la estructura de las fechas bajas.

Los boxplots muestran que en Amatitlán no solo aumentaron máximos aislados: durante las fechas críticas se desplazó la distribución completa. En Atitlán, las cajas permanecieron bajas y los valores altos correspondieron principalmente a colas localizadas. Los mapas de diferencia confirman cambios amplios en Amatitlán y cambios puntuales en Atitlán.

9.3 Exploración estacional

No puede afirmarse un ciclo estacional. Amatitlán solo tuvo una fecha clasificada como lluviosa, frente a diez secas. Atitlán tuvo tres lluviosas y ocho secas, pero una de las lluviosas contiene el artefacto de julio de 2025. Las medianas exploratorias sugieren señal algo mayor en las fechas lluviosas, pero la muestra es demasiado pequeña e irregular para separar estación, año y eventos individuales.

10 Limitaciones

- Se2WaQ fue calibrado en otro embalse; sus unidades no equivalen a una medición local validada.
- La regla $NDWI \geq 0$ reproduce el script, pero puede excluir superficies ópticamente semejantes a vegetación, incluidas natas densas.
- Tres fechas tienen cobertura inferior a 80% y una presenta una discontinuidad de tesela.
- No hubo conteos de células, toxinas, nutrientes, temperatura o viento coincidentes con el paso satelital.
- Los píxeles tienen autocorrelación espacial; un gran número de píxeles no equivale al mismo número de muestras independientes.
- Las once fechas por lago no forman una serie regular y no permiten atribuir estacionalidad.
- El umbral de 40 y el criterio de 10% son reglas exploratorias declaradas, no normas sanitarias.

11 Conclusiones

1. Se completó un flujo reproducible que conecta con la API, utiliza los GeoJSON y fechas del curso, solicita bandas mínimas y genera NDVI, NDWI y CYA para las 22 observaciones.
2. Amatitlán mostró señales mucho más intensas, extensas y persistentes. Seis fechas fueron críticas bajo el criterio exploratorio y los máximos se concentraron en abril de 2025 y marzo-junio de 2026.
3. Atitlán presentó valores menores y focos localizados. Ninguna fecha superó 10% del lago; la mayor mediana ocurrió el 13-04-2026.
4. Las correlaciones no proporcionan un indicador independiente de causalidad. La asociación negativa con NDWI está condicionada por bandas compartidas y la máscara acuática.
5. La diferencia entre lagos es compatible con sus presiones de cuenca y dinámica física, pero solo una campaña de campo simultánea puede confirmar concentración, especie y toxicidad.
6. Los mapas permiten priorizar fechas y zonas para muestreo, especialmente durante aumentos extensos en Amatitlán y focos costeros o localizados en Atitlán.

Reproducibilidad y materiales

El análisis completo se regenera con `python scripts/analyze_full.py`. El notebook ejecutado es `notebooks/02_laboratorio_completo.ipynb`; las tablas se encuentran en `outputs/tables` y las figuras, incluidos dos mapas Folium, en `outputs/figures`. El código versionado está disponible en el [repositorio GitHub del Grupo 1](#).

Referencias

- [1] Pereira, N. S. A. (2020). *Se2WaQ – Sentinel-2 Water Quality Script*. Sentinel Hub Custom Scripts. <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/se2waq/>
- [2] Potes, M. et al. (2018). *Use of Sentinel 2-MSI for water quality monitoring at Alqueva reservoir, Portugal*. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 380, 73–79.
- [3] Copernicus Data Space Ecosystem. *openEO API documentation*. <https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/openEO/openEO.html>
- [4] Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. *Plan Estratégico Institucional 2022–2030*. https://pruebas.amsa.gob.gt/wp-content/uploads/2025/04/UTF-84287_16219_1.-Plan-Estrategico-Institucional-2022-2030-31ENE2023.pdf
- [5] Waters, M. N. et al. (2021). *Harmful algal blooms and cyanotoxins in Lake Amatitlán, Guatemala, coincided with ancient Maya occupation in the watershed*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(48). <https://doi.org/10.1073/pnas.2109919118>
- [6] Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán. (2024). *Informe anual de investigación y calidad ambiental*. <https://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2025/02/InformesDICA2024.pdf>
- [7] Weisman, D. et al. (2018). *Effects of nutrient limitations and watershed inputs on community respiration in a deep, tropical lake*. Water Resources Research, 54. <https://doi.org/10.1029/2017WR021981>
- [8] OpenStreetMap contributors. Relaciones 5781818 y 11018382. Datos bajo licencia ODbL 1.0. <https://www.openstreetmap.org/copyright>