

Modelamiento y Optimización

Clase 20

Gonzalo Muñoz

31 de Mayo 2024



Cortes de Gomory

Cortes de Gomory

Consideremos un problema entero en forma estándar

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \in \mathbb{Z}^n\end{array}$$

Supongamos que tenemos x una SBF (por ejemplo, óptima para la relajación lineal) con base B . Con esto:

$$Bx_B + Nx_N = b \Rightarrow x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$$

Usando que $x \geq 0$, podemos acotar el lado izquierdo:

$$x_B + B^{-1}N x_N \geq x_B + \underbrace{\lfloor B^{-1}N \rfloor}_{\text{termino a termino}} x_N$$

$$\lfloor -0.3 \rfloor = -1$$

$$\text{Ej: } \lfloor 0.5 \rfloor = 0$$



Cortes de Gomory

Componente a componente, obtenemos que

$$\underbrace{(x_B)_i + \lfloor \overbrace{(B^{-1}N)_i}^{\text{Fila } i\text{-ésima}} \rfloor x_N}_{\in \mathbb{Z}} \leq (B^{-1}b)_i$$

Desigualdad
válida

Ahora, podemos notar que **a la izquierda solo tenemos números enteros**, por lo tanto la siguiente desigualdad es válida para el problema entero


$$(x_B)_i + \lfloor (B^{-1}N)_i \rfloor x_N \leq \lfloor (B^{-1}b)_i \rfloor$$

Estas desigualdades se conocen como **Cortes de Gomory**, y podemos calcular una por cada variable básica.



Ejemplo

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeto a:} & -4x_1 + 6x_2 + s_1 = 9 \\ & x_1 + x_2 + s_2 = 4 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}\end{array}$$



El óptimo de la relajación lineal es $x = (1.5, 2.5, 0, 0)$ con base

$$B = \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Con esto, la relación $x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$ queda

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

De esta relación podemos calcular 2 Cortes de Gomory:

$$x_1 - s_1 + 0 \cdot s_2 \leq 1$$

$$\rightarrow \left\lfloor -\frac{1}{10} \right\rfloor = -1$$

\Leftrightarrow


$$x_1 - s_1 \leq 1$$

Similarmente

$$x_2 \leq 2$$

esta no la podemos dibujar.

Plot de x_1, x_2 :



Garantías

Se puede mostrar que si una SBF no es entera, **siempre hay un corte de Gomory que la elimina**:

Si una SBF \hat{x} no es entera, entonces existe una componente i tal que $(\hat{x}_B)_i = (B^{-1}b)_i \notin \mathbb{Z}$. El corte de Gomory de esa componente es

$$(x_B)_i + \lfloor (B^{-1}N)_i \rfloor x_N \leq \lfloor (B^{-1}b)_i \rfloor \quad (*)$$

El lado izquierdo, **evaluado en \hat{x}** , nos da:

$$(\hat{x}_B)_i + \cancel{\lfloor (B^{-1}N)_i \rfloor \hat{x}_N} \xrightarrow{0} = (\hat{x}_B)_i$$

y como

$$\lfloor (B^{-1}b)_i \rfloor < (B^{-1}b)_i$$

\uparrow
cuando $(B^{-1}b)_i \notin \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \hat{x}$ no cumple $(*)$

Branch and Cut


Branch and Cut

En la práctica, los solvers de optimización no aplican solo Branch and Bound, o solo plano cortantes. Si no que una **mezcla de ambas**. Esto se conoce como **Branch and Cut**.

Veamos un ejemplo de cómo esto puede ayudar:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & -6x_1 - 5x_2 \\ \text{sujeto a:} & 3x_1 + x_2 + s_1 = 11 \\ & -x_1 + 2x_2 + s_2 = 5 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}\end{array}$$

Plot de x_1, x_2 :



El óptimo de la relajación lineal es $x = (2.42, 3.71, 0, 0)$ con valor -33.14 .

Branch and Cut

Ahora creamos 2 ramas brancheando en x_1 . En forma estándar:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & -6x_1 - 5x_2 \\ \text{sujeto a:} & 3x_1 + x_2 + s_1 = 11 \\ & -x_1 + 2x_2 + s_2 = 5 \\ & x_1 - s_3 = 3 \quad \} \quad x_1 \geq 3 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0\end{array}$$

Óptimo $x = (3, 2, 0, 4, 0)$
Valor -28

↓
Óptimo entero, podemos
parar.

Cota superior de -28

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & -6x_1 - 5x_2 \\ \text{sujeto a:} & 3x_1 + x_2 + s_1 = 11 \\ & -x_1 + 2x_2 + s_2 = 5 \\ & x_1 + s_3 = 2 \quad \} \quad x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0\end{array}$$

Óptimo $x = (2, 3.5, 1.5, 0, 0)$
Valor -29.5

↓
sol. fraccionaria.
como $-29.5 < -28$,
deberíamos seguir
brancheando.


$$\text{Gap} = -28 - (-29.5) = 1.5 \quad (\text{absoluto})$$

Branch and Cut

Enfoquemos esfuerzos en la rama $x_1 \leq 2$:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & -6x_1 - 5x_2 \\ \text{sujeto a:} & 3x_1 + x_2 + s_1 = 11 \\ & -x_1 + 2x_2 + s_2 = 5 \\ & x_1 + s_3 = 2 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0\end{array}$$

Plot de x_1, x_2 :



Las variables básicas son $\{x_1, x_2, s_1\}$, por lo tanto

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{bmatrix}$$


Branch and Cut

$$B^{-1}N = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Veamos cómo queda el corte de Gomory para x_2 . Recordar que la relación que usamos es $x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3.5 \\ 1.5 \end{pmatrix}$$

corte : $x_2 + 0 \cdot s_2 + 0 \cdot s_3 \leq 3 \Leftrightarrow x_2 \leq 3$



nuevo óptimo : $(2, 3, \dots)$
valor ≈ -27

↳ Podemos parar.

Óptimo $(3, 2, 0, 4)$ con valor

Gap = 0

fcfm
-28.