

# Taller derivadas Cálculo 1

Daniel Orjuela

April 2025

## Reglas de derivada

Las reglas de las derivadas son:

- $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $(f/g)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

5. Suponga que  $f(5) = 1, f'(5) = 6, g(5) = -3, g'(5) = 2$ . Encuentre los valores siguientes:

- a)  $(fg)'(5)$
- b)  $(f/g)'(5)$
- c)  $(g/f)'(5)$

**Solucion:**

- a)  $(fg)'(5) = [6 * (-3)] + (1 * 2) = -16$
- b)  $(f/g)'(5) = \frac{[6 * (-3)] - (1 * 2)}{(-3)^2} = \frac{-20}{9}$
- c)  $(g/f)'(5) = \frac{(2 * 1) - [(-3) * 6]}{1^2} = 20$

6. Si  $f(x) = e^x g(x)$ , donde  $g(0) = 2, g'(0) = 5$ . Hallar  $f'(0)$ .

**Solucion:**

$$f'(0) = (e^0 * 2) + (e^0 * 5) = 7$$

7. Si  $f$  es una función derivable, encuentre una expresión para la derivada de cada una de las siguientes:

- a)  $y = x^2 f(x)$

$$\text{b) } y = \frac{x^2}{f(x)}$$

**Solucion:**

$$\text{a) } y' = (2x)f(x) + (x^2)f'(x)$$

$$\text{b) } y' = \frac{(2x)f(x) - (x^2)f'(x)}{(f(x))^2}$$

8. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva  $y = x/(x+1)$  pasan por el punto  $(1, 2)$ ? ¿En qué puntos toca la curva a estas rectas tangentes?

**Solucion:**

Suponiendo que la recta tangente toca la curva en  $x = a$ :

- Sabemos que la tangencia se presentan en  $(a, f(a))$
- La pendiente en ese punto será  $f'(a)$

La ecuación punto pendiente de la recta tangente sería:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Derivamos...

- $y = x/(x+1)$
- $y' = \frac{(1)(x+1) - (x)(1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$

Usando el punto dado inicialmente, tenemos que:

$$2 - \frac{a}{a+1} = \frac{1}{(a+1)^2}(1-a)$$

$$\frac{2a+2-a}{a+1} = \frac{1-a}{(a+1)^2}$$

$$\frac{a+2}{a+1} = \frac{1-a}{(a+1)^2}$$

$$(a+2)(a+1) = (1-a)$$

$$a^2 + 3a + 2 = 1 - a$$

$$a^2 + 4a + 1 = 0$$

Usando la formula general de las ecuaciones cuadráticas:

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Tenemos que:

$$a = \frac{-4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

$$a_1 = -2 + \sqrt{3} \text{ y } a_2 = -2 - \sqrt{3}$$

Entonces, las rectas tangentes pasan por los puntos:

$$P_1 = (-2 + \sqrt{3}, \frac{-2 + \sqrt{3}}{-1 + \sqrt{3}}) \text{ y } P_2 = (-2 - \sqrt{3}, \frac{-2 - \sqrt{3}}{-1 - \sqrt{3}})$$

Y racionalizando:

$$P_1 = (-2 + \sqrt{3}, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}) \text{ y } P_2 = (-2 - \sqrt{3}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2})$$

9. Si  $h(2) = 4$  y  $h' = -3$ , encuentre:

$$\left. \frac{d}{dx} \left[ \frac{h(x)}{x} \right] \right|_{x=2}$$

**Solucion:**

Usando la regla de la derivada del cociente:

$$\left. \frac{d}{dx} \left[ \frac{h(x)}{x} \right] \right|_{x=2} = \frac{h'(2)x - h(2)}{x^2} = \frac{-3 * 2 - 4}{2^2} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2}$$

■ Derive las siguientes funciones:

10.  $g(x) = \sqrt{x} - 2e^x$

**Solucion:**

- $\sqrt{x} = x^{1/2}$
- $g'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} - 2e^x$
- $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2e^x$

11.  $y = 4\pi^2$

**Solucion:**

Es una constante, por lo tanto:

- $y' = 0$

12.  $y = \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x}}$

**Solucion:**

- $y = (x^2 + 4x + 3)(x^{-1/2})$
- $y' = (2x + 4)(x^{-1/2}) + (x^2 + 4x + 3)(-\frac{1}{2}x^{-3/2})$
- $y' = \frac{(2x + 4)}{\sqrt{x}} - \frac{(x^2 + 4x + 3)}{2x^{3/2}}$
- $y' = \frac{(2x + 4)}{\sqrt{x}} - \frac{(x^2 + 4x + 3)}{2\sqrt{x^3}}$

13.  $v = t^2 - \frac{1}{\sqrt[4]{t^3}}$

**Solucion:**

- $v = t^2 - t^{-3/4}$
- $v' = 2t - (-\frac{3}{4})t^{-7/4}$
- $v' = 2t + \frac{3}{4t^{7/4}}$
- $v' = 2t + \frac{3}{4\sqrt[4]{t^7}}$

14.  $z = \frac{A}{y^{10}} + Be^y$

**Solucion:**

- $z = Ay^{-10} + Be^y$
- $z' = -10Ay^{-11} + Be^y$
- $z' = -\frac{10A}{y^{11}} + Be^y$

15.  $g(x) = \frac{3x - 1}{2x + 1}$

**Solucion:**

- $g'(x) = \frac{(3)(2x + 1) - (3x - 1)(2)}{(2x + 1)^2}$
- $g'(x) = \frac{(6x + 3) - (6x - 2)}{(2x + 1)^2}$

16.  $F(y) = \left( \frac{1}{y^2} - \frac{3}{y^4} \right) (y + 5y^3)$

**Solucion:**

- $F(y) = (y^{-2} - 3y^{-4})(y + 5y^3)$
- $F'(y) = (-2y^{-3} + 12y^{-5})(y + 5y^3) + (y^{-2} - 3y^{-4})(1 + 15y^2)$
- $F'(y) = \left( -\frac{2}{y^3} + \frac{12}{y^5} \right) (y + 5y^3) + \left( \frac{1}{y^2} - \frac{3}{y^4} \right) (1 + 15y^2)$

17.  $y = \frac{t^2}{3t^2 - 2t + 1}$

**Solucion:**

- $y' = \frac{(2t)(3t^2 - 2t + 1) - (t^2)(6t - 2)}{(3t^2 - 2t + 1)^2}$
- $y' = \frac{(6t^3 - 4t^2 + 2t) - (6t^3 - 2t^2)}{(3t^2 - 2t + 1)^2}$

18.  $f(x) = \frac{x}{x + \frac{c}{x}}$

**Solucion:**

- $x$

19.  $x$

**Solucion:**

- $x$