

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184088 NOVA AGUDELO - SAFARI			
FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184088
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	NOVA AGUDELO
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	CAROL GUTIERREZ	RAZA:	MESTIZO
TUTOR:	DIANA AGUDELO	EDAD:	6 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	TRANSPARENTE		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	NEGATIVO	Leu/ μL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	4.0	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	15.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.020		1,015 1,045
pH	7.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA	3.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	<4	mg/dL	
CREATININA	> 300.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.05		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	10.00	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g	Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ESCASO	
BACTERIAS	NO SE OBSERVAN		
CILINDROS	NO SE OBSERVAN		
MOCO	NO SE OBSERVA		
CRISTALES	NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	< 2 XCAP		
LEUCOCITOS	< 2 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	NO SE OBSERVAN BACTERIAS		
Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular			
OBSERVACIONES	NINGUNA		

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184088 NOVA AGUDELO - SAFARI			
FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184088
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	NOVA AGUDELO
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	CAROL GUTIERREZ	RAZA:	MESTIZO
TUTOR:	DIANA AGUDELO	EDAD:	6 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	HEMBRA
RELACIÓN PROTEÍNA/CREATININA EN ORINA (UPC)			
QUÍMICA DE ORINAS			
ANALITO	RESULTADO	UNIDAD	
Creatinina en orina	211,60	mg/dL	
Proteína en orina	43,70	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina en orina	0,21	mg/dL	
Observaciones:	Ninguna.		

Método. Enzimático colorimétrico. Equipo A15 Biosystems.

Relación UPC interpretación

Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria		

Observación 1: Estos valores son de referencia, el médico veterinario debe interpretar estos resultados junto con la clínica del paciente.
Observación 2: Los datos presentes en el encabezado son los mismos ingresados por el profesional solicitante al formulario virtual.



Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11