

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184089 GINEBRA - CLINICA VETERINARIA SPIKES

FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184089
CENTRO VETERINARIO:	CLINICA VETERINARIA SPIKES	NOMBRE MASCOTA:	GINEBRA
CORREO ELECTRÓNICO:	SPIKESLABORATOTIO2@GMAIL.CPM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	CAROLINA CEBALLOS	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	JESSICA DOMINGUEZ	EDAD:	4 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	UROCULTIVO (BACTERIOLÓGICO CON ANTIBIOGRAMA) + CITOQUÍMICO DE ORINA	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA				
ANÁLISIS FÍSICO		RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR		AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA		LIGERAMENTE TURBIO		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO				
LEUCOCITOS		500	Leu/ μL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS		NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS		NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO		4.0	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA		NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA		NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS		300.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA		1.023		1,015 1,045
pH		6.5		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)		0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO		0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA		15.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO		<4	mg/dL	
CREATININA		> 300.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)		1.00		
Relación UPC interpretación				
Canino <0,2 / Felino <0,2		Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4		Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4		Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0		Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria				
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)		50.00	mg/g	
Relación ACR interpretación				
Canino >64 mg/g		Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.				
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR				
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC				
ANÁLISIS MICROSCÓPICO		RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO		SE OBSERVA	ABUNDANTE	
BACTERIAS		NO SE OBSERVAN		
CILINDROS		NO SE OBSERVAN		
MOCO		SE OBSERVA	ABUNDANTE	
CRISTALES		NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS		NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS		NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS		NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS		2 - 5 XCAP		
LEUCOCITOS		>60 XCAP		
OTROS		NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA		RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS		NO SE OBSERVAN BACTERIAS		

Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular
OBSERVACIONES NINGUNA

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11