

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184094 9031 - CVP			
FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184094
CENTRO VETERINARIO:	CVP	NOMBRE MASCOTA:	9031
CORREO ELECTRÓNICO:	LABORATORIOCVPOBLADO@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	JOSE GABRIEL ARISTIZABAL	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	MARIA CECILIA LONDOÑEZ	EDAD:	13 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	UROCULTIVO (BACTERIOLÓGICO CON ANTIBIOGRAMA) + CITOQUÍMICO DE ORINA		
SEXO:			HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	LIGERAMENTE TURBIO		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	500	Leu/ μL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	2.0	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	0.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.015		1,015 1,045
pH	6.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA	8.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	<4	mg/dL	
CREATININA	> 300.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.00		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	26.67	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g	Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ABUNDANTE	
BACTERIAS	NO SE OBSERVAN		
CILINDROS	GRANULOSOS	ESCASOS	
MOCO	SE OBSERVA	ABUNDANTE	
CRISTALES	NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	< 2 XCAP		
LEUCOCITOS	>60 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	NO SE OBSERVAN BACTERIAS		
Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular			
OBSERVACIONES	NINGUNA		

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11