

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184099 NEWTON GOMEZ JIMENEZ - SAFARI

FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184099
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	NEWTON GOMEZ JIMENEZ
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	STEFANY MUNERA CANO	RAZA:	MESTIZO
TUTOR:	JOHN ALEX GOMEZ JIMENEZ	EDAD:	11 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	MACHO

CITOQUÍMICO DE ORINA				
ANÁLISIS FÍSICO		RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR		AMARILLO CLARO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA		TRANSPARENTE		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO				
LEUCOCITOS		NEGATIVO	Leu/ μL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS		NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS		NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO		2.0	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA		NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA		NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS		0.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA		1.010		1,015 1,045
pH		5.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)		0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO		0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA		8.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO		<4	mg/dL	
CREATININA		> 300.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)		0.00		
Relación UPC interpretación				
Canino <0,2 / Felino <0,2		Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4		Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4		Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0		Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria				
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)		26.67	mg/g	
Relación ACR interpretación				
Canino >64 mg/g		Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.				
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR				
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC				
ANÁLISIS MICROSCÓPICO		RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO		SE OBSERVA	ESCASO	
BACTERIAS		NO SE OBSERVAN		
CILINDROS		NO SE OBSERVAN		
MOCO		NO SE OBSERVA		
CRISTALES		NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS		NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS		NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS		NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS		< 2 XCAP		
LEUCOCITOS		< 2 XCAP		
OTROS		NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA		RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS		NO SE OBSERVAN BACTERIAS		
Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular				
OBSERVACIONES		NINGUNA		

Procesado por:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11

Directora técnica:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2184099 NEWTON GOMEZ JIMENEZ - SAFARI

FECHA:	2/06/2026	N° REGISTRO:	2184099
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	NEWTON GOMEZ JIMENEZ
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	STEFANY MUNERA CANO	RAZA:	MESTIZO
TUTOR:	JOHN ALEX GOMEZ JIMENEZ	EDAD:	11 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	MACHO

RELACIÓN PROTEÍNA/CREATININA EN ORINA (UPC)
QUÍMICA DE ORINAS

ANALITO	RESULTADO	UNIDAD
Creatinina en orina	53,90	mg/dL
Proteína en orina	39,10	mg/dL
Relación Proteína/Creatinina en orina	0,73	mg/dL
Observaciones:	Ninguna.	
Método. Enzimático colorimétrico. Equipo A15 Biosystems.		

Relación UPC interpretación

Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria		

Observación 1: Estos valores son de referencia, el médico veterinario debe interpretar estos resultados junto con la clínica del paciente.
Observación 2: Los datos presentes en el encabezado son los mismos ingresados por el profesional solicitante al formulario virtual.



Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11