



INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183864 MAGA OSPINA SALAZAR - SAFARI

FECHA:	25/05/2026	N° REGISTRO:	2183864
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	MAGA OSPINA SALAZAR
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	NATALY QUINTERO MORALES	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	LUZ ADRIANA OSPINA SALAZAR	EDAD:	15 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO CLARO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	TURBIO		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	500	Leu/ µL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	NORMAL (0.2 mg/dL)	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	15.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.016		1,015 1,045
pH	6.5		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	TRAZAS		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA	8.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	<4	mg/dL	
CREATININA	100.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.15		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	80.00	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g	Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ABUNDANTE	
BACTERIAS	SE OBSERVAN	ABUNDANTES	
CILINDROS	NO SE OBSERVAN		
MOCO	NO SE OBSERVA		
CRISTALES	NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	10 - 20 XCAP		
LEUCOCITOS	>60 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	BACIOS GRAM NEGATIVOS	CANTIDAD ABUNDANTE	

Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular

OBSERVACIONES NINGUNA

Procesado por:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11

Directora técnica:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183864 MAGA OSPINA SALAZAR - SAFARI

FECHA:	25/05/2026	N° REGISTRO:	2183864
CENTRO VETERINARIO:	SAFARI	NOMBRE MASCOTA:	MAGA OSPINA SALAZAR
CORREO ELECTRÓNICO:	SAFARICLINICAVET2021@GMAIL.COM	ESPECIE:	FELINO
MÉDICO VETERINARIO:	NATALY QUINTERO MORALES	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	LUZ ADRIANA OSPINA SALAZAR	EDAD:	15 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	RENAL 7 (CITOQUÍMICO DE ORINA + ÍNDICE UPC CUANTITATIVA)	SEXO:	HEMBRA

RELACIÓN PROTEÍNA/CREATININA EN ORINA (UPC)
QUÍMICA DE ORINAS

ANALITO	RESULTADO	UNIDAD
Creatinina en orina	83,00	mg/dL
Proteína en orina	71,20	mg/dL
Relación Proteína/Creatinina en orina	0,86	mg/dL
Observaciones:	Ninguna.	

Método. Enzimático colorimétrico. Equipo A15 Biosystems.

Relación UPC interpretación

Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular

Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria

Observación 1: Estos valores son de referencia, el médico veterinario debe interpretar estos resultados junto con la clínica del paciente.
Observación 2: Los datos presentes en el encabezado son los mismos ingresados por el profesional solicitante al formulario virtual.

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11