



INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183880 CRISPETA ESTRADA - SAGAPETS

FECHA:	25/05/2026	N° REGISTRO:	2183880
CENTRO VETERINARIO:	SAGAPETS	NOMBRE MASCOTA:	CRISPETA ESTRADA
CORREO ELECTRÓNICO:	INFORMES.SAGAPETS@GMAIL.COM	ESPECIE:	CANINO
MÉDICO VETERINARIO:	SARA GÓMEZ	RAZA:	MESTIZO
TUTOR:	CATALINA ESTRADA	EDAD:	11 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	CITOQUÍMICO DE ORINA (ESTUDIO FÍSICOQUÍMICO - MICROSCÓPICO E INCLUYE COLORACIÓN GRAM)	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA				
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA	
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO	
APARIENCIA	TRANSPARENTE		TRANSPARENTE	
ANÁLISIS QUÍMICO				
LEUCOCITOS	70	Leu/ µL	NEGATIVO	
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO	
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO	
UROBILINÓGENO	NORMAL (0.2 mg/dL)	mg/dL	NORMAL	
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO	+
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO	10 mg/dL
PROTEÍNAS	0.0	mg/dL	NEGATIVO	
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.020		1,016	1,06
pH	8.0		5.0	7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO	
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL		
MICROALBÚMINA	8.0	mg/dL	NEGATIVO	<1 mg/dL
CALCIO	<4	mg/dL		
CREATININA	100.0	mg/dL		
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.00			
Relación UPC interpretación				
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria		
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite		
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial		
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular		
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria				
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	80.00	mg/g		
Relación ACR interpretación				
Canino >64 mg/g	Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.			
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.				
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR				
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.				
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC				
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO		CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA		ESCASO	
BACTERIAS	NO SE OBSERVAN			
CILINDROS	NO SE OBSERVAN			
MOCO	NO SE OBSERVA			
CRISTALES	NO SE OBSERVA			
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN			
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN			
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN			
ERITROCITOS	< 2 XCAP			
LEUCOCITOS	< 2 XCAP			
OTROS	NO SE OBSERVA			
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO		CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	NO SE OBSERVAN BACTERIAS			

Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular

OBSERVACIONES NINGUNA

Procesado por:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11

Directora técnica:

Carolina Martinez

Microbióloga y bioanalista.

RP:5-6880-11