

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183891 ARON - BIAVET			
FECHA:	26/05/2026	N° REGISTRO:	2183891
CENTRO VETERINARIO:	BIAVET	NOMBRE MASCOTA:	ARON
CORREO ELECTRÓNICO:	BIAVETSASLAB@GMAIL.COM	ESPECIE:	CANINO
MÉDICO VETERINARIO:	LUISA FERNANDA ARBOLEDA	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	VICTOR ZAPATA	EDAD:	12 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	CITOQUÍMICO DE ORINA (ESTUDIO FÍSICOQUÍMICO - MICROSCÓPICO E INCLUYE COLORACIÓN GRAM)	SEXO:	MACHO

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	TRANSPARENTE		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	TRAZAS (15)	Leu/ µL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	NORMAL (0.2 mg/dL)	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	0.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.012		1,016 1,06
pH	8.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA	8.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	<4	mg/dL	
CREATININA	200.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.00		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointersticial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	40.00	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g	Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.		
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ESCASO	
BACTERIAS	NO SE OBSERVAN		
CILINDROS	NO SE OBSERVAN		
MOCO	NO SE OBSERVA		
CRISTALES	NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	< 2 XCAP		
LEUCOCITOS	< 2 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	NO SE OBSERVAN BACTERIAS		

Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular

OBSERVACIONES NINGUNA

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11