

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183521 NAHOMY - FISIOVITAL			
FECHA:	11/05/2026	N° REGISTRO:	2183521
CENTRO VETERINARIO:	FISIOVITAL	NOMBRE MASCOTA:	NAHOMY
CORREO ELECTRÓNICO:	ALEJOBOTE@HOTMAIL.ES	ESPECIE:	CANINO
MÉDICO VETERINARIO:	ALEJANDRO BOTERO SANCHEZ	RAZA:	CRIOLLO
TUTOR:	KAREN CASTAÑO	EDAD:	13 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	GERIÁTRICO 2 (HEMOGRAMA + ALT + AST + FA + COLESTEROL TOTAL + CREATININA + GLUCOSA + UREA + BUN + T4L + T4T ESPECÍFICA + CITOQUÍMICO DE ORINA)	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	TURBIO		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	TRAZAS (15)	Leu/ µL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	NORMAL (0.2 mg/dL)	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	+		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	0.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.045		1,016 1,06
pH	7.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	0.0	mg/dL	
MICROALBÚMINA	3.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	30	mg/dL	
CREATININA	100.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.00		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointerstial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	30.00	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g		Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.	
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ABUNDANTE	
BACTERIAS	SE OBSERVAN	ABUNDANTES	
CILINDROS	NO SE OBSERVAN		
MOCO	NO SE OBSERVA		
CRISTALES	OXALATO DE CALCIO	ESCASOS	
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	NO SE OBSERVAN		
LEUCOCITOS	10 - 20 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	BACILOS GRAM NEGATIVOS	CANTIDAD ABUNDANTE	

Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular

OBSERVACIONES NINGUNA

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11