

INFORME DE RESULTADOS

Resultados precisos, comprometidos
con la salud animal

2183546 POLO - SAN LUIS			
FECHA:	12/05/2026	N° REGISTRO:	2183546
CENTRO VETERINARIO:	SAN LUIS	NOMBRE MASCOTA:	POLO
CORREO ELECTRÓNICO:	RESULTADOSCLINICAPETS@GMAIL.COM	ESPECIE:	CANINO
MÉDICO VETERINARIO:	OCTAVIO GOMEZ	RAZA:	HUSKY
TUTOR:	CYNTHIA K	EDAD:	7 AÑOS
EXAMENES SOLICITADOS:	CITOQUÍMICO DE ORINA (ESTUDIO FÍSICOQUÍMICO - MICROSCÓPICO E INCLUYE COLORACIÓN GRAM), COPROLÓGICO (DIRECTO + LUGOL + TÉCNICA DE FLOTACIÓN)	SEXO:	HEMBRA

CITOQUÍMICO DE ORINA			
ANÁLISIS FÍSICO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
COLOR	AMARILLO		AMARILLO CLARO A LIGERA. OSCURO
APARIENCIA	LIGERAMENTE TURBIO		TRANSPARENTE
ANÁLISIS QUÍMICO			
LEUCOCITOS	NEGATIVO	Leu/ μL	NEGATIVO
CUERPOS CETÓNICOS	NEGATIVO		NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
UROBILINÓGENO	NORMAL (0.2 mg/dL)	mg/dL	NORMAL
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO +
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dL	NEGATIVO 10 mg/dL
PROTEÍNAS	0.0	mg/dL	NEGATIVO
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.011		1,016 1,06
pH	6.0		5.0 7.0
HEMOGLOBINA (SANGRE)	0 (NEGATIVO)		NEGATIVO
ÁCIDO ASCÓRBICO	100	mg/dL	
MICROALBÚMINA	1.0	mg/dL	NEGATIVO <1 mg/dL
CALCIO	10	mg/dL	
CREATININA	100.0	mg/dL	
Relación Proteína/Creatinina (UPC)	0.00		
Relación UPC interpretación			
Canino <0,2 / Felino <0,2	Normal	No presenta proteinuria	
Canino 0,2 - 0,5 / Felino 0,2 - 0,4	Intermedio	Proteinuria límite	
Canino >0,5 / Felino >0,4	Patológico	Proteinuria persistente. Probable enfermedad renal crónica glomerular o tubulointerstial	
Canino >2,0 / Felino >2,0	Patológico	Sugiere fuertemente enfermedad glomerular	
Referencia: International Renal Interest Society (IRIS) Substaging by Proteinuria			
Observación: Relación UPC semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar UPC de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Relación Albúmina/Creatinina (ACR)	10.00	mg/g	
Relación ACR interpretación			
Canino >64 mg/g		Marcador de daño renal temprano, permeabilidad glomerular elevada.	
Referencia canino: Evaluation of Albumin Creatinine Ratio as an Early Urinary Biomarker for Chronic Kidney Disease in Dogs. Kang et al. JVC. 2023.			
Referencia felino: No se cuenta con valores de referencia en felinos para ACR			
Observación: Relación ACR semicuantitativa (tirilla). Se recomienda confirmar ACR de forma cuantitativa mediante Química de orinas.			
Método. Tira reactiva semicuantitativa. Refractometría. Equipo. URIT-50. RHC-200ATC			
ANÁLISIS MICROSCÓPICO	RESULTADO	CANTIDAD	
SEDIMENTO	SE OBSERVA	ESCASO	
BACTERIAS	NO SE OBSERVAN		
CILINDROS	NO SE OBSERVAN		
MOCO	NO SE OBSERVA		
CRISTALES	NO SE OBSERVA		
CÉLULAS BAJAS	NO SE OBSERVAN		
CÉLULAS INTERMEDIAS	2 - 5 XCAP		
CÉLULAS ALTAS	NO SE OBSERVAN		
ERITROCITOS	NO SE OBSERVAN		
LEUCOCITOS	< 2 XCAP		
OTROS	NO SE OBSERVA		
COLORACIÓN GRAM DE ORINA	RESULTADO	CANTIDAD	
MICROORGANISMOS	NO SE OBSERVAN BACTERIAS		
Método. Microscopía óptica. Coloración Gram. Equipo. Amscope B120c Compuesto binocular			
OBSERVACIONES	NINGUNA		

Procesado por:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11

Directora técnica:
Carolina Martinez
Microbióloga y bioanalista.
RP:5-6880-11