

Теоретико-категорная семантика модальной теории типов, основанной на интуиционистской эпистемической логике

1 Приложение А. Глоссарий по теории категорий.

Определение 1. Категория \mathcal{C} состоит из:

- Класа объектов $Ob_{\mathcal{C}}$;
- Для любых объекта $A, B \in Ob_{\mathcal{C}}$ определено множество стрелок (или морфизмов) из A в B $Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$;
- Если $f \in Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$ и $g \in Hom_{\mathcal{C}}(B, C)$, то $g \circ f \in Hom_{\mathcal{C}}(A, C)$;
- Для любого объекта $A \in Ob_{\mathcal{C}}$, определен тождественный морфизм $id_A \in Hom_{\mathcal{C}}(A, A)$;
- Для любой стрелки $f \in Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$, для любой стрелки $g \in Hom_{\mathcal{C}}(B, C)$ и для любой стрелки $h \in Hom_{\mathcal{C}}(C, D)$, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
- Для любой стрелки $f \in Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$, $f \circ id_A = f$ и $id_B \circ f = f$.

Определение 2. Функтор

Пусть \mathcal{C}, \mathcal{D} – категории. Функтором называется отображение $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, такое, что:

- $F : A \mapsto FA$, где $A \in Ob_{\mathcal{C}}$;
- $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$;
- $F(id_A) = id_{FA}$.

Определение 3. Естественное преобразование Пусть $\mathcal{F}, \mathcal{G} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ – функторы. Естественным преобразованием $\alpha : \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}$ называется такое индексированное семейство стрелок $(\alpha_X)_{X \in Ob_{\mathcal{C}}}$, что для любых $A, B \in Ob_{\mathcal{C}}$, для любой стрелки $f \in Hom_{\mathcal{C}}(A, B)$, диаграмма коммутрует:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{F}A & \xrightarrow{\mathcal{F}(f)} & \mathcal{F}B \\
 \alpha_A \downarrow & & \downarrow \alpha_B \\
 \mathcal{G}A & \xrightarrow{\mathcal{G}(f)} & \mathcal{G}B
 \end{array}$$

Определение 4. *Моноидальная категория*

Моноидальная категория – это категория \mathcal{C} с дополнительной структурой:

- Бифунктор $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, который мы будем называть тензором;
- Единица $\mathbb{1}$;
- Изоморфизм, который мы будем называть ассоциатором: $\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \cong A \otimes (B \otimes C)$;
- Изоморфизм $L_A : \mathbb{1} \otimes A \cong A$;
- Изоморфизм $R_A : A \otimes \mathbb{1} \cong A$;
- Первое условие когерентности (пятиугольник Маклейна) (данная диаграмма коммутует):

$$\begin{array}{ccc}
 & (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & \\
 \alpha_{A,B,C} \otimes id_D \nearrow & & \searrow \alpha_{A,B \otimes C,D} \\
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & & A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) \\
 \alpha_{A \otimes B,C,D} \downarrow & & \downarrow id_A \otimes \alpha_{B,C,D} \\
 (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C \otimes D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D))
 \end{array}$$

- Второе условие когерентности (тождество треугольника):

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes \mathbb{1}) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A,\mathbb{1},B}} & A \otimes (\mathbb{1} \otimes B) \\
 & \searrow R_A \otimes id_B & \swarrow id_A \otimes L_B \\
 & A \otimes B &
 \end{array}$$

- Моноидальная категория \mathcal{C} называется симметрической, если для любых $A, B \in Ob_{\mathcal{C}}$, имеет место изоморфизм $\sigma_{A,B} : A \otimes B \cong B \otimes A$.

Определение 5. *Декартово замкнутая категория*

Декартово замкнутая категория – это категория с терминальным объектом, конечными произведениями и экспоненцированием.

Заметим, что декартово замкнутая категория – это частный случай (симметрической) моноидальной категории, в котором тензор – это произведение, а единица – это терминальный объект.

Определение 6. *Нестрогий моноидальный функтор*

Пусть $\langle \mathcal{C}, \otimes_1, \mathbb{1}_{\mathcal{C}} \rangle$ и $\langle \mathcal{D}, \otimes_2, \mathbb{1}_{\mathcal{D}} \rangle$ моноидальные категории.

Нестрогий моноидальный функтор $\mathcal{F} : \langle \mathcal{C}, \otimes_1, \mathbb{1}_{\mathcal{C}} \rangle \rightarrow \langle \mathcal{D}, \otimes_2, \mathbb{1}_{\mathcal{D}} \rangle$ это функтор $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ с дополнительными естественными преобразованиями:

- $u : \mathbb{1}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{F}\mathbb{1}_{\mathcal{C}}$;
- $*_{A,B} : \mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}B \rightarrow \mathcal{F}(A \otimes_{\mathcal{C}} B)$.

и условиями когерентности:

- Ассоциативность:

$$\begin{array}{ccc}
(\mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}B) \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}C & \xrightarrow{\alpha_{\mathcal{F}A, \mathcal{F}B, \mathcal{F}C}^{\mathcal{D}}} & \mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} (\mathcal{F}B \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}C) \\
\downarrow *_{A, B} \otimes_{\mathcal{D}} id_{\mathcal{F}B} & & \downarrow id_{\mathcal{F}A} \otimes_{\mathcal{D}} *_{B, C} \\
\mathcal{F}(A \otimes_{\mathcal{C}} B) \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}C & & \mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}(B \otimes_{\mathcal{C}} C) \\
\downarrow *_{A \otimes_{\mathcal{C}} B, C} & & \downarrow *_{A, B \otimes_{\mathcal{C}} C} \\
\mathcal{F}((A \otimes_{\mathcal{C}} B) \otimes_{\mathcal{C}} C) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\alpha_{A, B, C}^{\mathcal{C}})} & \mathcal{F}(A \otimes_{\mathcal{C}} (B \otimes_{\mathcal{C}} C))
\end{array}$$

- Свойство левой единицы:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{1}_{\mathcal{D}} \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}A & \xrightarrow{u \otimes_{\mathcal{D}} id_{\mathcal{F}A}} & \mathcal{F}\mathbb{1}_{\mathcal{C}} \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}A \\
\downarrow L_{\mathcal{F}A}^{\mathcal{D}} & & \downarrow *_{\mathbb{1}_{\mathcal{C}}, A} \\
\mathcal{F}A & \xleftarrow{\mathcal{F}(L_A^{\mathcal{C}})} & \mathcal{F}(\mathbb{1}_{\mathcal{C}} \otimes_{\mathcal{C}} A)
\end{array}$$

- Свойство правой единицы:

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} \mathbb{1}_{\mathcal{D}} & \xrightarrow{id_{\mathcal{F}A} \otimes_{\mathcal{D}} u} & \mathcal{F}A \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{F}\mathbb{1}_{\mathcal{C}} \\
\downarrow R_{\mathcal{F}A}^{\mathcal{D}} & & \downarrow *_{A, \mathbb{1}_{\mathcal{C}}} \\
\mathcal{F}A & \xleftarrow{\mathcal{F}(R_A^{\mathcal{C}})} & \mathcal{F}(A \otimes_{\mathcal{C}} \mathbb{1}_{\mathcal{C}})
\end{array}$$

Определение 7. Тензорно-сильный функтор – это эндифунктор над моноидальной категорией с дополнительным естественным преобразованием и условиями когерентности для него (ниже соответствующие коммутующие диаграммы):

$$\begin{array}{ccc}
(A \otimes B) \otimes \mathcal{K}C & \xrightarrow{\tau_{A \otimes B, C}} & \mathcal{K}((A \otimes B) \otimes C) \\
\downarrow \alpha_{A, B, \mathcal{K}C} & & \downarrow \mathcal{K}(\alpha_{A, B, C}) \\
A \otimes (B \otimes \mathcal{K}C) & \xrightarrow{id_A \otimes \tau_{B, C}} A \otimes \mathcal{K}(B \otimes C) \xrightarrow{\tau_{A, (B \otimes C)}} & \mathcal{K}(A \otimes (B \otimes C)) \\
& & \downarrow \mathcal{K}(R_A) \\
& & \mathcal{K}A
\end{array}$$

$\mathbb{1} \otimes \mathcal{K}A \xrightarrow{\mu_{\mathbb{1}, A}} \mathcal{K}(\mathbb{1} \otimes A) \xrightarrow{R_{\mathcal{K}A}} \mathcal{K}A$

Определение 8. Аппликативный функтор

Аппликативный функтор – это тройка $\langle \mathcal{C}, \mathcal{K}, \eta \rangle$, где \mathcal{C} – это моноидальная категория, \mathcal{K} – это тензорно-сильный нестрогий моноидальный эндифунктор и $\eta : Id_{\mathcal{C}} \Rightarrow \mathcal{K}$ – это естественное преобразование, такое, что:

- $u = \eta_{\mathbb{1}}$;

- $*_{A,B} \circ (\eta_A \otimes \eta_B) = \eta_{A \otimes B}$, то есть диаграмма коммутует:

$$\begin{array}{ccc}
 A \otimes B & \xrightarrow{\eta_A \otimes \eta_B} & \mathcal{K}A \otimes \mathcal{K}B \\
 & \searrow \eta_{A \otimes B} & \downarrow *_{A,B} \\
 & & \mathcal{K}(A \otimes B)
 \end{array}$$

- $\tau_{A,B} = *_{A,B} \circ \eta_A \otimes id_{\mathcal{K}B}$.

По умолчанию мы будем рассматривать ниже аппликативный функтор над декартово замкнутой категорией.