

# Análisis complejo

Matemáticas en LaTeX

14 de junio de 2023

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
1.1. Series complejas con índice en los enteros . . . . .	3
1.2. Singularidades aisladas . . . . .	4
1.3. Aplicaciones conformes . . . . .	7
1.4. Transformaciones de Möbius . . . . .	8
<b>2. Conformalidad y funciones abiertas en el disco unidad</b>	<b>12</b>
2.1. Funciones meromorfas . . . . .	12
2.2. Aplicaciones conformes . . . . .	13
2.3. Dominios conformemente equivalentes al plano complejo y al plano complejo extendido .	14
2.4. Funciones holomorfas en el disco unidad . . . . .	17
2.5. El teorema de Schwarz-Pick . . . . .	18
2.6. Subordinación . . . . .	21
2.7. La métrica de Poincaré . . . . .	24
<b>3. Familias normales</b>	<b>28</b>
3.1. Familias normales . . . . .	28
3.2. El teorema de Montel . . . . .	28
3.3. El teorema de Stieltjes-Vitali . . . . .	33
3.4. Teoremas de Hurwitz . . . . .	35
<b>4. El teorema de Riemann de la aplicación conforme</b>	<b>37</b>
4.1. Preliminares . . . . .	37
4.2. Dominios simplemente conexos . . . . .	37
4.3. El teorema de Riemann de la aplicación conforme . . . . .	40
4.4. Clasificación de los dominios simplemente conexos . . . . .	43
4.5. El teorema de extensión de Carathéodory . . . . .	44
<b>5. Funciones armónicas</b>	<b>47</b>
5.1. Funciones armónicas y funciones holomorfas . . . . .	47
5.2. El problema de Dirichlet para el disco unidad . . . . .	52
5.3. La integral de Poisson . . . . .	54
5.4. Desigualdades de Harnack . . . . .	63
<b>6. El teorema de factorización de Weierstrass</b>	<b>67</b>
6.1. Funciones holomorfas sin ceros o con finitos ceros . . . . .	67
6.2. Productos infinitos . . . . .	68
6.3. Funciones holomorfas definidas por productos infinitos . . . . .	72
6.4. El teorema de factorización de Weierstrass . . . . .	75
6.5. Exponente de convergencia y género de una sucesión . . . . .	79
6.6. Factorización canónica de una función entera . . . . .	80
6.7. Factorización de funciones holomorfas en un dominio . . . . .	81

<b>7. Funciones enteras. Crecimiento y distribución de los ceros</b>	<b>83</b>
7.1. La fórmula de Jensen . . . . .	83
7.2. La fórmula de Poisson-Jensen . . . . .	87
7.3. Introducción a los espacios de Hardy . . . . .	88
7.4. Orden de crecimiento de una función entera . . . . .	90
7.5. Propiedades aritméticas . . . . .	91
7.6. Orden de los factores primos de Weierstrass . . . . .	92
7.7. Orden de una función entera expresada en sus coeficientes de Taylor . . . . .	92
7.8. Relación entre el orden de crecimiento y el exponente de convergencia de los ceros . . .	93
7.9. Orden de los productos canónicas de Weierstrass . . . . .	94
7.10. Factorización de Hadamard . . . . .	94

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Series complejas con índice en los enteros

**Definición 1.1.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , la serie  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge si el límite

$$\lim_{N \rightarrow \infty, M \rightarrow \infty} \sum_{n=-M}^N z_n$$

existe en  $\mathbb{C}$ .

Aquí,  $N \rightarrow \infty$  y  $M \rightarrow \infty$  de forma independiente. Es decir, existe  $z^* \in \mathbb{C}$  tal que para todo  $\varepsilon > 0$  existen dos naturales  $N_0, M_0$  tales que si  $N \geq N_0$ ,  $M \geq M_0$ , entonces

$$\left| \sum_{n=-M}^N z_n - z^* \right| < \varepsilon.$$

**Definición 1.2.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , diremos que  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge absolutamente si  $\sum_{-\infty}^{\infty} |z_n|$  converge.

*Observación.* Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , si  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge a  $z^* \in \mathbb{C}$  entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N z_n = z^*.$$

El recíproco no es cierto. Por ejemplo, si  $z_n = n$  para todo  $n$ , se tiene que  $\sum_{n=-N}^N z_n = 0$  para todo  $N$ , pero se puede comprobar que  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  no converge.

Veamos ahora que una serie de este tipo se puede poner como suma de dos series de las que ya conocíamos.

**Proposición 1.1.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , se tiene que  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge si y solo si  $\sum_{-\infty}^{-1} z_n$  y  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  convergen. En ese caso,

$$\sum_{-\infty}^{\infty} z_n = \sum_{-\infty}^{-1} z_n + \sum_{n=0}^{\infty} z_n.$$

*Observación.* La serie  $\sum_{-\infty}^{-1} z_n$  es de las que ya conocíamos, pues  $\sum_{-\infty}^{-1} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} z_{-n}$ .

De forma más general se tiene lo siguiente.

**Proposición 1.2.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$  y  $n_0 \in \mathbb{Z}$ , se tiene que  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge si y solo si  $\sum_{-\infty}^{n_0} z_n$  y  $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} z_n$  convergen. En ese caso,

$$\sum_{-\infty}^{\infty} z_n = \sum_{-\infty}^{n_0} z_n + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} z_n.$$

**Proposición 1.3.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , si  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge absolutamente entonces  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge. También existe un resultado más general para la convergencia absoluta.

**Proposición 1.4.** Dada  $\{z_n\}_{-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$  y  $n_0 \in \mathbb{Z}$ , se tiene que  $\sum_{-\infty}^{\infty} z_n$  converge absolutamente si y solo si  $\sum_{-\infty}^{n_0} z_n$  y  $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} z_n$  convergen absolutamente. En ese caso,

$$\sum_{-\infty}^{\infty} z_n = \sum_{-\infty}^{n_0} z_n + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} z_n.$$

## 1.2. Singularidades aisladas

**Definición 1.3.** Si  $a \in \mathbb{C}$  y  $0 \leq R_1 < R_2 \leq \infty$ , se define la corona de centro  $a$  y radios  $R_1$  y  $R_2$  como:

$$A(a, R_1, R_2) = \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - a| < R_2\}.$$

**Teorema 1.5.** Si  $a \in \mathbb{C}$ ,  $0 \leq R_1 < R_2 \leq \infty$  y  $f$  es holomorfa en  $A(a, R_1, R_2)$ , entonces existe una única sucesión  $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

- $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$  converge para todo  $z \in A(a, R_1, R_2)$ .
- $f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$  para todo  $z \in A(a, R_1, R_2)$ .

Para cada  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz,$$

siendo  $\gamma$  cualquiera camino que esté en  $A(a, R_1, R_2)$  con  $n(\gamma, a) = 1$

Además, la serie  $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$  converge absoluta y uniformemente a cada subconjunto compacto de  $A(a, R_1, R_2)$ .

A esta serie se le llama desarrollo de Laurent de  $f$  en  $A(a, R_1, R_2)$ .

**Definición 1.4.**  $f$  tiene una singularidad aislada en  $a \in \mathbb{C}$  si existe  $R > 0$  tal que  $f$  está definida y es holomorfa en  $D(a, R) \setminus \{a\} = A(a, 0, R)$ .

Podemos considerar el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $D(a, R) \setminus \{a\}$ . Existe una única sucesión en  $\mathbb{C}$ ,  $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$ , tal que:

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n, \quad z \in D(a, R) \setminus \{a\}.$$

Como la sucesión  $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$  no depende de  $R$ , a este desarrollo se le puede llamar desarrollo de Laurent de  $f$  en  $a$  o en un entorno perforado de  $a$ .

**Proposición 1.6.** Sea  $f$  una función con una singularidad aislada en  $a \in \mathbb{C}$  y sea  $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$  el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $a$ . Entonces:

1.  $a$  es una singularidad evitable de  $f \Leftrightarrow a_n = 0$  si  $n < 0 \Leftrightarrow \{n < 0 : a_n \neq 0\} = \emptyset$ .
2.  $a$  es un polo de orden  $N$  de  $f \Leftrightarrow a_{-N} \neq 0$  y  $a_n = 0$  si  $n < -N$ . Luego  $a$  es un polo de  $f \Leftrightarrow \{n < 0 : a_n \neq 0\}$  es finito y no vacío.

3.  $a$  es una singularidad esencial de  $f \Leftrightarrow \{n < 0 : a_n \neq 0\}$  es infinito.

**Definición 1.5.**  $f$  tiene una singularidad aislada en  $\infty$  si existe  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ .

1. Es una singularidad evitable de  $f$  si  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$  existe en  $\mathbb{C}$ .
2. Es un polo de  $f$  si  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$ .
3. Es una singularidad esencial en otro caso.

Si  $f$  tiene una singularidad aislada en  $\infty$ , entonces  $f$  es holomorfa en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$  para un cierto  $R > 0$ . Entonces la función  $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$  es holomorfa en  $D\left(0, \frac{1}{R}\right) \setminus \{0\}$ , por lo que tiene una singularidad aislada en 0.

Entonces:

1.  $f$  tiene una singularidad evitable en  $\infty \Leftrightarrow g$  tiene una singularidad evitable en 0.
2.  $f$  tiene un polo en  $\infty \Leftrightarrow g$  tiene un polo en 0.
3.  $f$  tiene una singularidad esencial en  $\infty \Leftrightarrow g$  tiene una singularidad esencial en 0.

**Proposición 1.7.** Sea  $f$  una función con una singularidad aislada en  $\infty$ . Entonces:

1.  $\infty$  es una singularidad evitable de  $f \Leftrightarrow f$  está acotada en un entorno perforado de  $\infty$ . Es decir, si existe  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa y está acotada en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ .
2.  $\infty$  es un polo de  $f \Leftrightarrow$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^N}$  existe en  $\mathbb{C}$  y es distinto de 0. En este caso,  $N$  es único y se denomina el orden de  $\infty$  como polo de  $f$ .
3.  $\infty$  es una singularidad esencial de  $f \Leftrightarrow f(\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\})$  es denso en  $\mathbb{C}$  para todo  $R > 0$  suficientemente grande.

*Observación.* En (2), el orden de  $\infty$  como polo de  $f$  coincide con el orden de 0 como polo de  $f\left(\frac{1}{z}\right)$ .

Si  $f$  tiene una singularidad aislada en  $\infty$ , entonces existe  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} = A(0, R, \infty)$ . Podemos considerar el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $A(0, R, \infty)$ : existe una única sucesión  $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C} \text{ con } |z| > R.$$

Como no depende de  $R$ , se le puede llamar desarrollo de Laurent de  $f$  en  $\infty$ .

**Proposición 1.8.** Sea  $f$  una función con una singularidad aislada en  $\infty$  y sea  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$  el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $\infty$ . Entonces:

1.  $\infty$  es una singularidad evitable de  $f \Leftrightarrow a_n = 0$  si  $n > 0$ .
2.  $\infty$  es un polo de  $f$  de orden  $N \Leftrightarrow a_N \neq 0$  y  $a_n = 0$  si  $n > N$ .
3.  $\infty$  es una singularidad esencial de  $f \Leftrightarrow \{n > 0 : a_n \neq 0\}$  es infinito.

**Definición 1.6.** Si  $f$  tiene una singularidad aislada en  $a \in \mathbb{C}$  y  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-a)^n$  es el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $a$ , se define  $\text{Res}(f, a) = a_{-1}$ .

**Proposición 1.9.** Sea  $a \in \mathbb{C}$  y  $f$  una función con una singularidad aislada en  $a$ . Sea  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $D(a, R) \setminus \{a\}$ . Entonces, para todo  $r \in (0, R)$ , se tiene que:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} f(z) dz.$$

**Proposición 1.10.** Sea  $f$  una función con una singularidad aislada en  $\infty$ . Sea  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ . Se define:

$$\text{Res}(f, \infty) = \frac{-1}{2\pi i} \int_{|z|=r} f(z) dz, \quad \text{siendo } r > R$$

**Proposición 1.11.** Si  $f$  tiene una singularidad aislada en  $\infty$  y  $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n z^n$  es el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $\infty$ , entonces  $\text{Res}(f, \infty) = -a_{-1}$ .

**Teorema 1.12** (Teorema de los residuos). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  holomorfa en  $D$  salvo por singularidades aisladas, es decir, existe  $A \subset D$ ,  $A$  sin puntos de acumulación en  $D$ , tal que  $f$  es holomorfa en  $D \setminus A$ . Sea  $\gamma$  un camino cerrado en  $D \setminus A$ , con  $n(\gamma, z) = 0$  para todo  $z \in \mathbb{C} \setminus D$ . Entonces:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{a \in A} \text{Res}(f, a) n(\gamma, a).$$

**Teorema 1.13** (Teorema de la función inversa). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  holomorfa en  $D$ , con  $a \in D$  tal que  $f'(a) \neq 0$ . Entonces existen  $U$  y  $V$  abiertos en  $\mathbb{C}$  con  $a \in U \subset D$ ,  $f(a) \in V$ , tales que:

1.  $f$  es inyectiva en  $U$ .
2.  $f(U) = V$ .
3.  $f'(z) \neq 0$  para todo  $z \in U$ .
4.  $f^{-1} : V \rightarrow U$  es holomorfa y además:

$$(f^{-1})'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)}, \quad \forall z \in U.$$

**Teorema 1.14.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $f$  holomorfa en  $D$  no constante y  $a \in D$ . Sea  $n$  el orden de  $a$  como cero de  $f - f(a)$ , es decir, el primer natural para el que  $f^{(n)}(a) \neq 0$ . Entonces  $f$  es localmente una aplicación  $n \rightarrow 1$  cerca de  $a$ . Es decir, existe  $\alpha > 0$  con  $D(a, \alpha) \subset D$  tal que para todo  $0 < \varepsilon < \alpha$  existe  $\delta > 0$  tal que cada punto  $w \in D(f(a), \delta) \setminus \{f(a)\}$  es la imagen de exactamente  $n$  puntos distintos  $z_1, z_2, \dots, z_n \in D(a, \varepsilon) \setminus \{a\}$ . En particular,  $f(D(a, \varepsilon)) \supset D(f(a), \delta)$ .

**Definición 1.7.** Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  holomorfa en  $D$  salvo por polos. Si  $a \in D$  es un polo de  $f$ , se tiene que  $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ . Definimos  $f(a) = \infty$ . Entonces  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  y es continua. Se dice que  $f$  es meromorfa en  $D$ .

**Teorema 1.15.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  meromorfa en  $D$ , con  $a \in D$  un polo de orden  $n$  de  $f$ . Entonces  $f$  es localmente una aplicación  $n \rightarrow 1$  cerca de  $a$ . Es decir, existe  $\alpha > 0$  tal que  $D(a, \alpha) \subset D$ ,  $f$  es holomorfa en  $D(a, \alpha) \setminus \{a\}$  y se verifica que para todo  $0 < \varepsilon < \alpha$  existe  $R > 0$  tal que cada punto  $w \in \mathbb{C}$  con  $|w| > R$  es la imagen de exactamente  $n$  puntos distintos  $z_1, z_2, \dots, z_n \in D(a, \varepsilon) \setminus \{a\}$ . En particular,  $f(D(a, \varepsilon) \setminus \{a\}) \supset \{w \in \mathbb{C} : |w| > R\}$ .

**Teorema 1.16.** Sea  $f$  una función con un polo de orden  $n$  en  $\infty$ . Entonces  $f$  es localmente una aplicación  $n \rightarrow 1$  cerca de  $\infty$ . Es decir, existe  $R_0 > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R_0\}$  y se verifica que para todo  $R > R_0$  existe  $R' > 0$  tal que cada punto  $w \in \mathbb{C}$  con  $|w| > R'$  es la imagen de exactamente  $n$  puntos distintos  $z_1, \dots, z_n$  de  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ . En particular,  $f(\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}) \supset \{w \in \mathbb{C} : |w| > R'\}$ .

**Teorema 1.17** (Teorema de la aplicación abierta). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  holomorfa y no constante. Entonces  $f$  es una aplicación abierta. En particular,  $f(D)$  es un dominio.

**Lema 1.18.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  holomorfa en  $D$ .

- Sea  $a \in D$ . Entonces  $f'(a) \neq 0$  si y solo si  $f$  es inyectiva en un entorno de  $a$ .
- Si  $f$  es inyectiva en  $D$ , entonces  $f'(z) \neq 0$  para todo  $z \in D$ .

### 1.3. Aplicaciones conformes

**Definición 1.8.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  holomorfa e inyectiva. Sea  $D' = f(D)$ . Entonces:

- $D'$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ .
- $f : D \rightarrow D'$  es biyectiva.
- $f^{-1} : D' \rightarrow D$  es holomorfa.

En ese caso decimos que  $f$  es una aplicación conforme de  $D$  sobre  $D'$ .

*Observación.*

1. Si  $f$  es una aplicación conforme de  $D$  sobre  $D'$ , entonces  $f^{-1}$  es una aplicación conforme de  $D'$  sobre  $D$ .
2. Si  $D_1, D_2$  y  $D_3$  son dominios en  $\mathbb{C}$  con  $f$  aplicación conforme de  $D_1$  sobre  $D_2$  y  $g$  aplicación conforme de  $D_2$  sobre  $D_3$ , entonces  $g \circ f$  es una aplicación conforme de  $D_1$  sobre  $D_3$ .

**Definición 1.9.** Si  $D_1$  y  $D_2$  son dominios en  $\mathbb{C}$ , se dice que  $D_1$  y  $D_2$  son conformemente equivalentes si existe una aplicación conforme  $f$  de  $D_1$  sobre  $D_2$ .

En el conjunto de los dominios en  $\mathbb{C}$ , se tiene la relación de equivalencia "ser conformemente equivalentes".

**Definición 1.10.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$ .  $D$  es simplemente conexo si  $\mathbb{C}^* \setminus D$  es conexo. Equivalentemente,  $D$  es simplemente conexo si todo camino cerrado  $\gamma$  en  $D$  es homólogo a cero módulo  $D$ , es decir,  $n(\gamma, z) = 0$  para todo  $z \in \mathbb{C} \setminus D$ .

**Teorema 1.19.** Sean  $D_1$  y  $D_2$  dos dominios en  $\mathbb{C}$  que son conformemente equivalentes. Entonces  $D_1$  es simplemente conexo si y solo si  $D_2$  es simplemente conexo.

**Definición 1.11.** Si  $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , el ángulo formado por  $z_1$  y  $z_2$  se define como:

$$\theta(z_1, z_2) = \arg \frac{z_2}{z_1} \in (-\pi, \pi].$$

*Observación.* Si  $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  y  $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ , entonces  $\theta(\lambda_1 z_1, \lambda_2 z_2) = \theta(z_1, z_2)$ .

**Definición 1.12.** Sea  $\gamma$  un camino con origen en un punto  $a \in \mathbb{C}$ . Se dice que  $\gamma$  es regular en  $a$  si existe una parametrización  $\mathcal{C}^1$  a trozos de  $\gamma$ ,  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ , tal que  $\gamma'(0) \neq 0$ .

**Definición 1.13.** Sean  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  dos caminos con origen  $a \in \mathbb{C}$  que son regulares en  $a$ . El ángulo que forman  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  en  $a$ ,  $\theta_a(\gamma_1, \gamma_2)$ , se define como sigue.

Sean  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  parametrizaciones  $\mathcal{C}^1$  a trozos de  $\gamma_1, \gamma_2$  respectivamente tales que  $\gamma_1'(0), \gamma_2'(0) \neq 0$ . Entonces  $\theta_a(\gamma_1, \gamma_2) = \theta(\gamma_1'(0), \gamma_2'(0))$ .

**Definición 1.14.** Si  $\gamma$  es una curva en  $\mathbb{C}$  y  $f : \text{sop}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  es continua, se define la curva imagen de  $\gamma$  por  $f$  como la curva  $\Gamma$  que tiene por parametrización  $f \circ \gamma$ , siendo  $\gamma$  una parametrización de  $\gamma$ .

**Definición 1.15.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $f$  holomorfa en  $D$  y  $a \in D$ . Diremos que  $f$  preserva ángulos en  $a$  o que  $f$  es conforme en  $a$  si se verifica lo siguiente.

Si  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  son caminos con origen  $a$ , regulares en  $a$ , entonces las curvas imagen de  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  por  $f$  de  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  respectivamente son caminos con origen  $f(a)$ , que son regulares en  $f(a)$  y se tiene que:

$$\theta_{f(a)}(\Gamma_1, \Gamma_2) = \theta_a(\gamma_1, \gamma_2).$$

**Teorema 1.20.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $f$  holomorfa en  $D$  y  $a \in D$ . Si  $f'(a) \neq 0$ , entonces  $f$  es conforme en  $a$ .



*Demostración.* Sean  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  caminos en  $D$ , con origen en  $a$  y regulares en  $a$ . Sean  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  parametrizaciones de  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  respectivamente, ambas  $\mathcal{C}^1$  a trozos con  $\gamma_1'(0), \gamma_2'(0) \neq 0$ . Consideramos las curvas imagen de  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  por  $f$ :

$$\begin{aligned}\Gamma_1 &= f \circ \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \\ \Gamma_2 &= f \circ \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}.\end{aligned}$$

$\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  son  $\mathcal{C}^1$  a trozos. Además,  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  son caminos con origen  $f(a)$ , porque:

$$\Gamma_1(0) = f(\gamma_1(0)) = f(a) = f(\gamma_2(0)) = \Gamma_2(0)$$

Observamos que  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$  son regulares en  $a$ :

$$\begin{aligned}\Gamma_1'(0) &= f'(\gamma_1(0))\gamma_1'(0) = f'(a)\gamma_1(0) \neq 0, \\ \Gamma_2'(0) &= f'(\gamma_2(0))\gamma_2'(0) = f'(a)\gamma_2(0) \neq 0.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\theta_{f(a)}(\Gamma_1, \Gamma_2) = \theta(\Gamma_1'(0), \Gamma_2'(0)) = \arg \frac{\Gamma_2'(0)}{\Gamma_1'(0)} = \theta(\gamma_1'(0), \gamma_2'(0)) = \theta_a(\gamma_1, \gamma_2).$$

□

**Ejemplo** (Contraejemplo). Sean  $D = \mathbb{C}$ ,  $f(z) = z^2$  y  $a = 0$ . Observamos que  $f'(a) = 0$ . Sea  $\gamma_1$  el segmento  $[0, 1]$  y  $\gamma_2$  el segmento  $[0, i]$ . Es claro que  $\theta_0(\gamma_1, \gamma_2) = \frac{\pi}{2}$ . Si consideramos las curvas imagen de  $\gamma_1$  y  $\gamma_2$  por  $f$ ,  $\Gamma_1$  y  $\Gamma_2$ , podemos ver que  $\Gamma_1$  es el segmento  $[0, 1]$  y  $\Gamma_2$  el segmento  $[0, -1]$ , que tienen  $\theta_0(\Gamma_1, \Gamma_2) = \pi \neq \frac{\pi}{2}$ .

De hecho, se tiene la equivalencia. Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $f$  holomorfa en  $D$  y  $a \in D$ . Entonces  $f'(a) \neq 0 \Leftrightarrow f$  es conforme en  $a$ .

## 1.4. Transformaciones de Möbius

**Definición 1.16.** Una transformación de Möbius es una aplicación  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  de la forma

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}, \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

*Observación.* Las aplicaciones conformes de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$  son las transformaciones de Möbius.

Sea  $\mathcal{M}$  el conjunto de las transformaciones de Möbius. A cada  $T \in \mathcal{M}$  se le hace corresponder la matriz de los coeficientes:

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \rightarrow A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

Esta matriz no es única. Por tanto, no tenemos una aplicación, sino una correspondencia. Se tiene que

- Si  $T_1, T_2 \in \mathcal{M}$  con matrices  $A_1$  y  $A_2$  respectivamente, entonces  $T_2 \circ T_1 \in \mathcal{M}$  y le corresponde la matriz producto  $A_2 A_1$ .
- A la transformación de Möbius identidad,  $T(z) = z$ , le corresponde la matriz identidad.
- Si  $T \in \mathcal{M}$  con matriz  $A$ , entonces  $T^{-1} \in \mathcal{M}$  y le corresponde la matriz inversa  $A^{-1}$ . También le corresponde la matriz indicada a continuación:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\alpha\delta - \beta\gamma} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Es decir, no es necesario dividir entre el determinante.

Por tanto,  $\mathcal{M}$  es un grupo con la composición. El grupo  $(\mathcal{M}, \circ)$  está generado por las transformaciones de Möbius siguientes:

- Traslaciones:

$$T(z) = z + a, \quad a \in \mathbb{C}.$$

- Rotaciones:

$$T(z) = e^{i\theta} z, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

- Dilataciones ( $r > 1$ ), contracciones ( $r < 1$ ) e identidad ( $r = 1$ ):

$$T(z) = rz, \quad r > 0.$$

- Inversión con respecto a la circunferencia unidad:

$$T(z) = \frac{1}{z}.$$

Observemos que  $T(0) = \infty$  y  $T(\infty) = 0$ . Además, si  $r > 0$  y  $\theta \in \mathbb{R}$  se tiene que

$$T(re^{i\theta}) = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta},$$

con lo que podemos ver en qué se transforman las circunferencias de centro 0 y las semirrectas con origen 0.

El hecho de que el grupo  $\mathcal{M}$  esté generado por estas transformaciones de Möbius quiere decir que cualquier transformación de Möbius se puede expresar como composición de un número finito de transformaciones de Möbius de los tipos anteriores.

**Lema 1.21.** *Si  $T$  es una transformación de Möbius que fija tres puntos, entonces  $T$  es la identidad.*

**Proposición 1.22.** *Si  $z_1, z_2$  y  $z_3$  son tres puntos distintos de  $\mathbb{C}^*$  y  $w_1, w_2$  y  $w_3$  son otros tres puntos distintos de  $\mathbb{C}^*$ , entonces existe una única transformación de Möbius  $T$  con  $T(z_j) = w_j$ , para  $j = 1, 2, 3$ .*

**Lema 1.23.** *La ecuación general de una circunferencia o recta en  $\mathbb{C}$  viene dada por*

$$\alpha|z|^2 + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0, \quad \beta \in \mathbb{C}, \alpha, \gamma \in \mathbb{R}, |\beta|^2 > \alpha\gamma.$$

*El caso  $\alpha = 0$  corresponde a una recta y el caso  $\alpha \neq 0$  a una circunferencia.*

*Observación.* Cuando se condiera una recta  $R$  en  $\mathbb{C}^*$  se supone que  $\infty \in R$ . Es decir,  $R = R' \cup \{\infty\}$ , siendo  $R'$  una recta en  $\mathbb{C}$ . Por tanto,  $R$  será de la forma

$$R = \{z \in \mathbb{C} : \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0\} \cup \{\infty\}, \quad \beta \in \mathbb{C}, \beta \neq 0, \gamma \in \mathbb{R}.$$

En el contexto de las transformaciones de Möbius se consideran las rectas en  $\mathbb{C}^*$ .

**Proposición 1.24.** *Sea  $T$  una transformación de Möbius. Si  $R$  es una recta, entonces  $T(R)$  es una circunferencia o una recta. Si  $C$  es una circunferencia, entonces  $T(C)$  es una circunferencia o una recta.*

*Observación.* En  $\mathbb{C}^*$ , tres puntos distintos determinan una circunferencia o una recta. Es decir, dados  $z_1, z_2$  y  $z_3$  tres puntos distintos de  $\mathbb{C}^*$ , existe una única circunferencia o recta  $C$  con  $z_1, z_2, z_3 \in C$ .

*Observación.* Si  $C_1$  y  $C_2$  son circunferencias o rectas, entonces existe  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(C_1) = C_2$ .

*Observación.* Si  $T \in \mathcal{M}$ , entonces  $T$  preserva ángulos en  $a$  para todo  $a \in \mathbb{C}$  tal que  $a$  no es un polo de  $T$ .

Sea  $T$  una transformación de Möbius, sea  $C_1$  una circunferencia o recta y sea  $C_2 = T(C_1)$ . Entonces  $C_2$  es una circunferencia o recta. Sean  $A_1$  y  $B_1$  las dos componentes conexas de  $\mathbb{C}^* \setminus C_1$  y sean  $A_2$  y  $B_2$  las dos componentes conexas de  $\mathbb{C}^* \setminus C_2$ . Entonces  $T(A_1) = A_2$  y  $T(B_1) = B_2$ , o bien  $T(A_1) = B_2$  y  $T(B_1) = A_2$ . Ahora bien, si fijamos una orientación en  $C_1$ , esta determina mediante  $T$  una orientación en  $C_2$ . Enrtonces, respecto a esas orientaciones, la componente de  $\mathbb{C}^* \setminus C_1$  que queda a la derecha de  $C_1$  se transforma en la componente de  $\mathbb{C}^* \setminus C_2$  que queda a la derecha de  $C_2$ , y la que queda a la izquierda se transforma en la que queda a la izquierda.

*Observación.* Dados una pareja de disco abierto, exterior de disco y semiplano, existe  $T \in \mathcal{M}$  que aplica el uno en el otro.

**Ejemplo.** La transformación de Möbius

$$P(z) = \frac{1+z}{1-z}$$

aplica  $\partial\mathbb{D}$  en el eje imaginario y  $\mathbb{D}$  en el semiplano de la derecha.

**Proposición 1.25.** Sea  $T \in \mathcal{M}$ . Entonces  $T(\mathbb{R} \cup \{\infty\}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  si y solo si existen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$  con  $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$  tales que

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

**Lema 1.26.** Sea  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(\mathbb{R} \cup \{\infty\}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Entonces  $T(\bar{z}) = \overline{T(z)}$ , para todo  $z \in \mathbb{C}^*$ .

*Observación.* Se considera  $\overline{\infty} = \infty$ .

*Observación.* Sea  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(\mathbb{R} \cup \{\infty\}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Si  $A \subset \mathbb{C}^*$  y  $A$  es simétrico respecto al eje real, entonces  $T(A)$  también es simétrico con respecto al eje real.

**Definición 1.17.** Sea  $C$  una circunferencia o una recta y sea  $a \in \mathbb{C}^*$ . Se define  $a^*$  como el simétrico de  $a$  con respecto a  $C$  de la siguiente forma. Sea  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(C) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Definimos

$$a^* = T^{-1}(\overline{T(a)}).$$

*Observación.*

1.  $a^* = a \Leftrightarrow a \in \mathbb{C}$ .
2.  $(a^*)^* = a$ .
3. Si  $C$  es una recta, el simétrico es el usual, siendo  $\infty^* = \infty$ .
4. Sea  $C$  una circunferencia o recta y sea  $a \in \mathbb{C}^*$ . Entonces, si  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(C) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ , se tiene que  $T(a^*) = \overline{T(a)}$ .

**Lema 1.27.** Sean  $C_1$  y  $C_2$  dos circunferencias o rectas y sea  $S \in \mathcal{M}$  con  $S(C_1) = C_2$ . Entonces  $S$  transforma puntos simétricos con respecto a  $C_1$  en puntos simétricos con respecto a  $C_2$ .

**Lema 1.28.** Si  $C = \partial\mathbb{D}$ , se tiene que  $0^* = \infty$ ,  $\infty^* = 0$  y

$$z^* = \frac{1}{\bar{z}}, \quad \text{si } z \in \mathbb{C}^* \setminus \{0, \infty\}.$$

*Observación.* Si  $z = re^{i\theta}$ , entonces  $z^* = \frac{1}{r}e^{i\theta}$ .

**Lema 1.29.** Sea  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Si  $C = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = R\}$  se tiene que  $a^* = \infty$ ,  $\infty^* = a$  y

$$z^* = a + \frac{R^2}{\bar{z} - \bar{a}}, \quad \text{si } z \in \mathbb{C}^* \setminus \{a, \infty\}.$$

De forma geométrica, si  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq a$ , entonces  $z^*$  está en la semirrecta con origen  $a$  que pasa por  $z$ , siendo

$$\frac{|z^* - a|}{R} = \frac{R}{|z - a|}.$$

Por tanto, si  $0 < |z - a| < R$  entonces  $|z^* - a| > R$ , y si  $|z - a| > R$  entonces  $|z^* - a| < R$ .

*Observación.* Si  $z = a + re^{i\theta}$ , entonces  $z^* = a + \frac{R^2}{r}e^{i\theta}$ .

*Notación.* Si  $a \in \mathbb{C}$  con  $|a| \neq 1$ , consideramos las transformaciones de Möbius siguientes:

$$S_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad T_a(z) = \frac{z + a}{1 + \bar{a}z}, \quad \varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}.$$

Se tiene que:

- $T_a = S_{-a}$ .
- $\varphi_a = -S_a$ .
- $S_a$  y  $T_a$  son inversas la una de la otra.
- $\varphi_a \circ \varphi_a$  es la identidad.

**Proposición 1.30.** *El conjunto de las transformaciones de Möbius que aplican  $\partial\mathbb{D}$  en  $\partial\mathbb{D}$  es*

$$\begin{aligned} & \{\lambda S_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{C}, |a| \neq 1\} \cup \left\{ \frac{\lambda}{z} : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1 \right\} = \\ & = \{\lambda T_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{C}, |a| \neq 1\} \cup \left\{ \frac{\lambda}{z} : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1 \right\} = \\ & = \{\lambda \varphi_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{C}, |a| \neq 1\} \cup \left\{ \frac{\lambda}{z} : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1 \right\}. \end{aligned}$$

**Proposición 1.31.** *El conjunto de las transformaciones de Möbius que aplican  $\mathbb{D}$  en  $\mathbb{D}$  es*

$$\{\lambda T_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\} = \{\lambda S_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\} = \{\lambda \varphi_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\}.$$

## Capítulo 2

# Conformalidad y funciones abiertas en el disco unidad

### 2.1. Funciones meromorfas

**Definición 2.1.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}^*$ . La función  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  es meromorfa en  $D$  si dado  $a \in D$  se verifica una de las siguientes posibilidades:

- $a \in \mathbb{C}$  y  $f$  es holomorfa en  $a$ .
- $a \in \mathbb{C}$  y  $f$  tiene un polo en  $a$ , es decir,  $f(a) = \infty$ .
- $a = \infty$  y  $f$  tiene una singularidad evitable en  $\infty$ , es decir,  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty) \in \mathbb{C}$ .
- $a = \infty$  y  $f$  tiene un polo en  $a$ , es decir,  $f(\infty) = \infty$ .

Entonces  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  es continua.

*Observación.* En el caso  $D \subset \mathbb{C}$ , la definición es la que ya conocíamos de función meromorfa. Si además  $f(D) \subset \mathbb{C}$ , se tiene una función holomorfa en  $D$ .

*Observación.* Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}^*$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  continua. Supongamos que  $f$  es holomorfa en  $\{z \in D \cap \mathbb{C} : f(z) \in \mathbb{C}\}$  y que el conjunto  $\{z \in D : f(z) = z\}$  no tiene puntos de acumulación en  $D$ . Entonces  $f$  es meromorfa en  $D$ .

*Observación.* Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}^*$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $f$  meromorfa e inyectiva en  $A = \{z \in D \cap \mathbb{C} : f(z) \in \mathbb{C}\}$ . Entonces  $f$  tiene a lo sumo un polo y tal polo es simple. Además,  $f'(a) \neq 0$  para todo  $a \in A$ , por lo que  $f$  es conforme en  $a$  para todo  $a \in A$ .

**Teorema 2.1** (Teorema de la aplicación abierta). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  una función meromorfa y no constante en  $D$ . Entonces  $f$  es una aplicación abierta. En particular,  $f(D)$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$ .*

Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  meromorfa e inyectiva, con  $D' = f(D)$ . Entonces:

1.  $D'$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$ .
2.  $f^{-1} : D' \rightarrow D$  es meromorfa e inyectiva.

Veamos que (2) es cierto. Como  $f$  es una aplicación abierta, se tiene que  $f^{-1}$  es continua. Sea  $w \in D' \cap \mathbb{C}$  tal que  $z = f^{-1}(w) \in \mathbb{C}$ , veamos que  $f^{-1}$  es holomorfa en  $w$ . Como  $z \in \mathbb{C} \cap D$  y  $f(z) \in \mathbb{C}$ ,  $f$  es holomorfa en  $z$  con  $f'(z) \neq 0$ . Por el teorema de la función inversa,  $f^{-1}$  es holomorfa en  $w$ .

## 2.2. Aplicaciones conformes

**Definición 2.2.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{C}^*$  meromorfa e inyectiva en  $D$ . Sea  $D' = f(D)$ . Entonces diremos que  $f$  es una aplicación conforme de  $D$  sobre  $D'$ .

En este caso, se tiene que  $D'$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$  y que  $f^{-1} : D' \rightarrow D$  es meromorfa e inyectiva en  $D'$ . Por tanto,  $f : D \rightarrow D'$  es un homeomorfismo, con  $f$  y  $f^{-1}$  meromorfas.

*Observación.*

1. Si  $f$  es una aplicación conforme de  $D$  sobre  $D'$ , entonces  $f^{-1}$  es una aplicación conforme de  $D'$  sobre  $D$ .
2. Si  $D_1, D_2$  y  $D_3$  son dominios en  $\mathbb{C}^*$ , con  $f$  aplicación conforme de  $D_1$  sobre  $D_2$  y  $g$  aplicación conforme de  $D_2$  sobre  $D_3$ , entonces  $g \circ f$  es una aplicación conforme de  $D_1$  sobre  $D_3$ .

Se puede comprobar que, sean  $G_1, G_2$  abiertos en  $\mathbb{C}^*$  y  $f : G_1 \rightarrow \mathbb{C}, g : G_2 \rightarrow \mathbb{C}$  meromorfas tal que  $f(G_1) \subset G_2$ , entonces  $g \circ f : G_1 \rightarrow \mathbb{C}$  es meromorfa.

**Definición 2.3.** Sean  $D_1$  y  $D_2$  dominios en  $\mathbb{C}^*$ . Diremos que  $D_1$  y  $D_2$  son conformemente equivalentes si existe una aplicación conforme  $f$  de  $D_1$  sobre  $D_2$ .

En el conjunto de los dominios en  $\mathbb{C}^*$ , el ser conformemente equivalentes es una relación de equivalencia.

**Definición 2.4.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$ . Diremos que  $D$  es simplemente conexo si  $\mathbb{C}^* \setminus D$  es conexo.

**Ejemplo.**

- $D = \mathbb{C}$ .
- $D = \mathbb{C}^* \setminus \{a\}, a \in \mathbb{C}$ .
- $D = \mathbb{C}^* \setminus \overline{D}(a, R), a \in \mathbb{C}, R > 0$ .
- $D = D(a, R), a \in \mathbb{C}, R > 0$ .
- Un semiplano sin  $\infty$ .
- Un sector sin  $\infty$ .
- El plano menos dos semirrectas.
- $D = \mathbb{C} \setminus \{a\}, a \in \mathbb{C}$ , no es simplemente conexo, porque  $\mathbb{C}^* \setminus D = \{a, \infty\}$  no es conexo.

**Lema 2.2.** Dado  $a \in \mathbb{C}$ , la transformación  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, T(z) = \frac{1}{z-a}$  si  $z \in \mathbb{C} \setminus \{a\}, T(a) = \infty$  y  $T(\infty) = 0$ , es una aplicación conforme de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$ .

**Lema 2.3.** Sea  $H$  un homeomorfismo de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$ . Si  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$ , entonces  $H(D)$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$ .

*Demostración.* Como  $H : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  y  $D$  es abierto y conexo en  $\mathbb{C}^*$ , entonces  $H(D)$  es abierto y conexo en  $\mathbb{C}^*$ . Luego  $H(D)$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$ . Como además  $\mathbb{C}^* \setminus D$  es conexo, entonces  $\mathbb{C}^* \setminus H(D) = H(\mathbb{C}^* \setminus D)$  es conexo. Por tanto,  $H(D)$  es un dominio simplemente conexo.  $\square$

**Teorema 2.4.** Sean  $D_1$  y  $D_2$  dos dominios en  $\mathbb{C}^*$  que son conformemente equivalentes. Entonces  $D_1$  es simplemente conexo si y solo si  $D_2$  es simplemente conexo.

*Demostración.* Sea  $F : D_1 \rightarrow D_2$  aplicación conforme. Consideramos todos los posibles casos teniendo en cuenta que los papeles de  $D_1$  y  $D_2$  son intercambiables.

- Si  $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$ , se cumple.
- Si  $D_1 = \mathbb{C}^*$ , como  $\mathbb{C}^*$  es cerrado y  $F$  es un homeomorfismo, se tiene que  $D_2$  es compacto y por tanto cerrado. Entonces  $D_2$  es abierto y cerrado en  $\mathbb{C}^*$ , que es conexo. Por tanto,  $D_2 = \mathbb{C}^* = D_1$ , ambos simplemente conexos.

- Si  $D_1, D_2 \neq \mathbb{C}^*$ , consideramos dos casos.
  - Supongamos que  $\infty \notin D_1$  y  $\infty \in D_2$ .  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $D_2$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$ . Sea  $a \in \mathbb{C}^* \setminus D_2$ , de hecho  $a \in \mathbb{C} \setminus D_2$ . Tomamos la aplicación conforme  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $T(z) = \frac{1}{z-a}$  si  $z \in \mathbb{C}^* \setminus \{a\}$ ,  $T(a) = \infty$ . Tenemos el diagrama:

$$D_1 \xrightarrow{F} D_2 \xrightarrow{T} T(D_2).$$

$T(D_2)$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$ . Como  $a \notin D_2$ , entonces  $T(a) = \infty \notin T(D_2)$ . Así que  $T(D_2)$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  conformemente equivalente a  $D_1$ . Luego  $D_1$  es simplemente conexo si y solo si  $T(D_2)$  es simplemente conexo. Por el lema anterior, esto es equivalente a que  $D_2$  sea simplemente conexo.

- Supongamos que  $\infty \in D_1, D_2$ . Se sigue de un razonamiento similar usando el apartado anterior.

□

## 2.3. Dominios conformemente equivalentes al plano complejo y al plano complejo extendido

Veremos que hay tres clases de equivalencia de dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}^*$ :  $\mathbb{C}^*$ ,  $\mathbb{C}$  y el disco unidad  $\mathbb{D} = D(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ .

$\mathbb{C}^*$  es compacto. Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$  que es conformemente equivalente a  $\mathbb{C}^*$ , entonces  $D$  es compacto y por tanto cerrado. Como  $D$  es abierto, entonces  $D = \mathbb{C}^*$ .

$\mathbb{C}$  y  $\mathbb{D}$  son homeomorfos. Por ejemplo,  $T : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $T(z) = \frac{z}{1-|z|}$  es un homeomorfismo.

**Proposición 2.5.**  $\mathbb{C}$  y  $\mathbb{D}$  no son conformemente equivalentes.

*Demostración.* Supongamos que existe una aplicación conforme  $F$  de  $\mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{D}$ . Entonces  $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$  es entera y acotada. Por el teorema de Liouville,  $F$  es constante. Esto contradice que  $F$  sea una aplicación conforme. □

**Proposición 2.6.** Sea  $f$  entera e inyectiva, entonces  $f$  es de la forma

$$f(z) = \alpha z + \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0.$$

*Demostración.* Sea  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ,  $z \in \mathbb{C}$ , el desarrollo de Taylor de  $f$  en 0. Entonces  $\infty$  es una singularidad aislada de  $f$  y el desarrollo anterior coincide con el desarrollo de Laurent de  $f$  en  $\infty$ .

- Si  $\infty$  es una singularidad evitable de  $f$ , entonces  $a_n = 0$  si  $n \geq 1$ , así que  $f$  es constante. Esto no es posible.
- Si  $\infty$  es un polo de orden  $N$  de  $f$ , entonces  $a_N \neq 0$  y  $a_n = 0$  si  $n > N$ . Luego  $f$  es un polinomio de grado  $N$ .  $f'$  es un polinomio de grado  $N - 1$ , con  $f'(z) \neq 0$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Así que  $f'$  es constante, por tanto  $N - 1 = 0 \Rightarrow N = 1$ .
- Si  $\infty$  es una singularidad esencial de  $f$ , entonces  $f(\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\})$  es denso en  $\mathbb{C}$ . Por el teorema de la aplicación abierta,  $f(\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\})$  es abierto en  $\mathbb{C}$ . Estos conjuntos son disjuntos por ser  $f$  inyectiva, y esto no es posible.

□

Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  que es conformemente equivalente a  $\mathbb{C}$ , entonces  $D = \mathbb{C}$ . Veamos que esto es verdad. Sea  $f : \mathbb{C} \rightarrow D$  aplicación conforme.  $f$  es entera e inyectiva, así que  $f(z) = \alpha z + \beta$ , con  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ,  $\alpha \neq 0$ . Luego  $D = f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ .

Las aplicaciones conformes de  $\mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{C}$  son de la forma:

$$f(z) = \alpha z + \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0.$$

Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$  que es conformemente equivalente a  $\mathbb{C}$ .

- Si  $\infty \notin D$ , entonces  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  conformemente equivalente a  $\mathbb{C}$  y, por tanto,  $D = \mathbb{C}$ .
- Si  $\infty \in D$ , consideramos  $F : \mathbb{C} \rightarrow D$  aplicación conforme. Como sabemos que  $D \neq \mathbb{C}^*$ , existe  $\alpha \in \mathbb{C}^* \setminus D$ , de hecho  $\alpha \in \mathbb{C} \setminus D$ . Sea

$$T : D \rightarrow T(D), \quad T(z) = \frac{1}{z - \alpha}.$$

Tenemos el diagrama:

$$\mathbb{C} \xrightarrow{F} D \xrightarrow{T} T(D) = D'.$$

$D'$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  conformemente equivalente a  $\mathbb{C}$ , así que  $D' = \mathbb{C} = \mathbb{C}^* \setminus \{\infty\}$ . Por tanto,  $D = \mathbb{C}^* \setminus \{\alpha\}$ .

Hemos probado que si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}^*$  conformemente equivalente a  $\mathbb{C}$ , entonces  $D = \mathbb{C}$  o  $D = \mathbb{C}^* \setminus \{\alpha\}$ , con  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Es decir,  $D = \mathbb{C}^* \setminus \{\alpha\}$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ .

Los dominios en  $\mathbb{C}^*$  que son conformemente equivalentes a  $\mathbb{C}$  son  $\mathbb{C}^* \setminus \{\alpha\}$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ .

### Aplicaciones conformes de $\mathbb{C}^*$ sobre $\mathbb{C}^*$

Sea  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  aplicación conforme. Sea  $a \in \mathbb{C}^*$  tal que  $T(a) = \infty$ . Consideramos dos casos:

1. Si  $a = \infty$ ,  $T(\infty) = \infty$ .  $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  es una aplicación conforme, así que  $T(z) = \alpha z + \beta$ , con  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ,  $\alpha \neq 0$ .
2. Si  $a \in \mathbb{C}$ ,  $T(a) = \infty$ .  $T$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ , así que  $a$  es un polo simple de  $T$ . Consideramos el desarrollo de Laurent de  $T$  en  $a$ .

$$T(z) = \frac{A_{-1}}{z - a} + \sum_{n=0}^{\infty} A_n(z - a)^n, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{a\}, \quad A_{-1} \neq 0.$$

$\infty$  es una singularidad aislada de  $T$ . De hecho, es una singularidad evitable.

Sea  $F(z) = T(z) - \frac{A_{-1}}{z - a}$ ,  $z \in \mathbb{C} \setminus \{a\}$ .  $F$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ .  $a$  es singularidad evitable de  $F$  y  $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = T(\infty) \in \mathbb{C}$ , así que  $\infty$  es una singularidad evitable también. Evitando la singularidad de  $F$  en  $a$ , tenemos que  $F$  es entera y acotada. Por tanto  $F$  es constante. Así que  $F(z) = a_0$ , para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Entonces:

$$T(z) = F(z) + \frac{A_{-1}}{z - a} = a_0 + \frac{A_{-1}}{z - a} = \frac{a_0 z + (A_{-1} - a_0 a)}{z - a}.$$

En cualquiera de los dos casos,  $T$  es de la forma:

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}.$$

No todas las aplicaciones de esta forma son aplicaciones conformes de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$ .

**Ejemplo** (Contraejemplo). No es una aplicación conforme si  $\alpha = \beta = 0$  o  $(\alpha, \beta)$  y  $(\gamma, \delta)$  son proporcionales. Por ejemplo:

$$T(z) = \frac{3z + 2}{6z + 4} = \frac{1}{2}.$$



Para que las aplicaciones de esa forma sean aplicaciones conformes de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$ , se tiene que verificar que:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} \neq 0.$$

En el caso (1),  $T(z) = Az + B = \frac{Az+B}{0z+1}$ , con  $A, B \in \mathbb{C}$ ,  $A \neq 0$ , luego:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = A \neq 0.$$

En el caso (2),

$$\begin{vmatrix} a_0 & A_{-1} - a_0 a \\ 1 & -a \end{vmatrix} = -a_0 a - A_{-1} + a_0 a = -A_{-1} \neq 0.$$

**Teorema 2.7.** *Las aplicaciones conformes de  $\mathbb{C}^*$  en  $\mathbb{C}^*$  son de la forma:*

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

*Demostración.* Sea  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  una aplicación de esa forma.

- Si  $\gamma = 0$ , entonces:

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\delta} z + \frac{\beta}{\delta}, \quad \alpha, \delta \neq 0.$$

$T$  es una aplicación conforme de  $\mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{C}$ , con  $\lim_{z \rightarrow \infty} T(z) = \infty$ . Definiendo  $T(\infty) = \infty$ , tenemos que  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  es una aplicación conforme.

- Si  $\gamma \neq 0$ , entonces  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,

$$\begin{aligned} T(z) &= \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}, \\ T\left(-\frac{\delta}{\gamma}\right) &= \infty, \\ T(\infty) &= \frac{\alpha}{\gamma}. \end{aligned}$$

$T$  es meromorfa en  $\mathbb{C}^*$  y  $T$  es inyectiva.

Veamos que  $T$  es sobreyectiva. Sea  $w \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{\alpha}{\gamma} \right\}$  y sea  $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$ . Entonces:

$$T(z) = w \Leftrightarrow \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} = w \Leftrightarrow \alpha z + \beta = \gamma z w + \delta w \Leftrightarrow (\alpha - \gamma w)z = \delta w - \beta \Leftrightarrow z = \frac{\delta w - \beta}{-\gamma w + \alpha}.$$

Por tanto,  $T$  es una aplicación conforme de  $\mathbb{C}^*$  sobre  $\mathbb{C}^*$ .

Además, hemos probado que  $T^{-1}$  es de la forma:

$$T^{-1}(z) = \frac{\delta z - \beta}{-\gamma z + \alpha}, \quad \begin{vmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

Si  $\gamma = 0$ , también es válida esta expresión. □

## 2.4. Funciones holomorfas en el disco unidad

**Teorema 2.8** (Lema de Schwarz). *Sea  $\varphi$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  tal que  $\varphi(0) = 0$  y  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Entonces:*

1.  $|\varphi(z)| \leq |z|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .
2.  $|\varphi'(0)| \leq 1$ .

Además, se da la igualdad en (1) para algún  $z \in \mathbb{D}$  con  $z \neq 0$  o bien se da la igualdad en (2) si y solo si  $\varphi$  es una rotación de  $\mathbb{D}$ , es decir, si existe  $\lambda \in \mathbb{C}$  con  $|\lambda| = 1$  tal que  $\varphi(z) = \lambda z$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

*Observación.* Si  $\varphi$  es una rotación, entonces se da la igualdad en (1) para todo  $z \in \mathbb{D}$  y se da la igualdad en (2).

*Observación.* El teorema se puede enunciar de forma equivalente con la condición  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \overline{\mathbb{D}}$  en lugar de  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Es decir, si  $\varphi$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $\varphi(0) = 0$  y  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \overline{\mathbb{D}}$ , entonces  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Veamos que esto es cierto. Supongamos que existe  $z_0 \in \mathbb{D}$  con  $|\varphi(z_0)| = 1$ . Como  $|\varphi(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , por el principio del máximo  $\varphi$  es constante, luego  $\varphi \equiv \varphi(0) = 0$ . Esto contradice que  $|\varphi(z_0)| = 1$ .

Sea  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Sea  $a \in \mathbb{D}$  y  $b = f(a) \in \mathbb{D}$ . Definimos:

$$T_a(z) = \frac{z+a}{1+\bar{a}z}, \quad T_a \in \mathcal{M}, \quad T_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}, \quad T_a(0) = a,$$

$$S_b(z) = \frac{z-b}{1-\bar{b}z}, \quad S_b \in \mathcal{M}, \quad S_b(\mathbb{D}) = \mathbb{D}, \quad S_b(b) = 0.$$

Sea  $\varphi = S_b \circ f \circ T_a$ .  $\varphi$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $\varphi(0) = 0$ . Por el lema de Schwarz,

1.  $|\varphi(z)| \leq |z|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .
2.  $|\varphi(0)| \leq 1$ .

Además, se da la igualdad en (1) para algún  $z \in \mathbb{D}$ ,  $z \neq 0$ , o bien se da la igualdad en (2) si y solo si  $\varphi$  es una rotación.

Desarrollamos las dos expresiones:

1. Sea  $z \in \mathbb{D}$ . Consideramos  $T_a^{-1}(z) \in \mathbb{D}$ .

$$|\varphi(T_a^{-1}(z))| \leq |T_a^{-1}(z)| \Leftrightarrow |S_b(f(z))| \leq |S_a(z)| \Leftrightarrow \left| \frac{f(z)-b}{1-\bar{b}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{f(z)-f(a)}{1-\bar{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

Además, si se da la igualdad para algún  $z \in \mathbb{D}$ ,  $z \neq a$ , entonces  $\varphi$  es una rotación. Entonces,  $f = S_b^{-1} \circ \varphi \circ T_a^{-1} \in \mathcal{M}$ , con  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ .

2. Por la regla de la cadena,  $\varphi'(0) = T_a'(0)f'(a)S_b'(b)$ .

$$T_a'(z) = \frac{1+\bar{a}z-(z+a)\bar{a}}{(1+\bar{a}z)^2}, \quad T_a'(0) = 1-|a|^2,$$

$$S_b'(z) = \frac{1-\bar{b}z+(z-b)\bar{b}}{(1-\bar{b}z)^2}, \quad S_b'(b) = \frac{1-|b|^2}{(1-|b|^2)} = \frac{1}{1-|b|^2}.$$

Así que:

$$\varphi'(0) = (1-|a|^2)f'(a)\frac{1}{1-|b|^2}.$$

Por tanto:

$$|\varphi'(0)| \leq 1 \Leftrightarrow (1 - |a|^2)f'(a) \frac{1}{1 - |b|^2} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Además, si se da la igualdad, entonces  $\varphi$  es una rotación y por tanto  $f \in \mathcal{M}$ , con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Por tanto, hemos probado lo siguiente:

1. Para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\left| \frac{f(z) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - a}{1 - \overline{a}z} \right|.$$

Si se da la igualdad para algún  $z \in \mathbb{D}$  con  $z \neq a$  entonces  $f \in \mathcal{M}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ .

- 2.

$$\frac{|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Si se da la igualdad entonces  $f \in \mathcal{M}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ .

## 2.5. El teorema de Schwarz-Pick

**Teorema 2.9** (Teorema de Schwarz-Pick). *Sea  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Entonces:*

1. Para todo  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ ,

$$\left| \frac{f(z_2) - f(z_1)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z_2)} \right| \leq \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right|.$$

2. Para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Además, se da la igualdad en (1) para algún par de puntos  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  con  $z_1 \neq z_2$  o bien se da la igualdad en (2) para algún  $z \in \mathbb{D}$  si y solo si  $f \in \mathcal{M}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ , en cuyo caso se da la igualdad en (1) para todo  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  y se da la igualdad en (2) para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

**Proposición 2.10.** *Sea  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ . Entonces:*

1. Para todo  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ ,

$$\left| \frac{T(z_2) - T(z_1)}{1 - \overline{T(z_1)}T(z_2)} \right| = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right|.$$

2. Para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\frac{|T'(z)|}{1 - |T(z)|^2} = \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

**Definición 2.5.** Dados  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ , definimos:

$$\rho(z_1, z_2) = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right|.$$

Observamos que si  $1 - \overline{z_1}z_2 = 0$  entonces  $\overline{z_1}z_2 = 1 \Rightarrow |z_1||z_2| = 1$ . Como esto no ocurre,  $\rho$  está bien definida.

La primera parte del teorema de Schwarz-Pick se puede reescribir usando  $\rho$ .

Sea  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Entonces:

$$\rho(f(z_1), f(z_2)) \leq \rho(z_1, z_2), \quad \text{si } z_1, z_2 \in \mathbb{D}.$$

Además, se da la igualdad para algún par de puntos distintos  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  si y solo si  $f \in \mathcal{M}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ , en cuyo caso se da la igualdad para todo  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ .

Vamos a ver que  $\rho$  es una distancia en  $\mathbb{D}$ .

$$\begin{aligned} \rho : D \times D &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (z_1, z_2) &\mapsto \rho(z_1, z_2) = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right|. \end{aligned}$$

- $\rho(z_1, z_2) \leq 0$ .
- $\rho(z_1, z_2) = \rho(z_2, z_1)$ .
- $\rho(z_1, z_2) = 0 \Leftrightarrow z_1 = z_2$ .
- $\rho(z_1, z_3) \leq \rho(z_1, z_2) + \rho(z_2, z_3)$ .

**Lema 2.11.** Para todo  $a, z \in \mathbb{D}$ ,

$$\frac{||z| - |a||}{1 - |a||z|} \leq \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |a||z|}.$$

Observamos que si  $a, z \in \mathbb{D}$ , tenemos:

$$\rho(a, z) = \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| = |S_a(z)| < 1, \quad S_a \in \mathcal{M}, S_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}.$$

Dados  $a \in \mathbb{D}$  y  $0 < r < 1$ , denotamos:

$$\Delta(a, r) = \{z \in \mathbb{D} : \rho(z, a) < r\}.$$

Entonces, dado  $z \in \mathbb{D}$ , se tiene que:

$$z \in \Delta(a, r) \Leftrightarrow \rho(z, a) < r \Leftrightarrow |S_a(z)| < r \Leftrightarrow S_a(z) \in D(0, r) \Leftrightarrow z \in S_a^{-1}(D(0, r)) \Leftrightarrow z \in T_a(D(0, r)).$$

Entonces  $\Delta(a, r) = T_a(D(0, r))$ .

$T_a(\partial D(0, r))$  es una circunferencia  $C$  contenida en  $\mathbb{D}$ . Sean  $c$  y  $R$  el centro y el radio de  $C$ , con  $c \in \mathbb{C}$ ,  $R > 0$ . Entonces  $T_a(D(0, r)) = D(c, R)$ . Por tanto:

$$\Delta(a, r) = T_a(D(0, r)) = D(c, R).$$

Así que  $\Delta(a, r)$  es un disco euclídeo. Como  $T_a(0) = a$  tenemos que  $a \in \Delta(a, r)$ , pero  $a$  no tiene por qué ser el centro del disco.

Vamos a calcular  $c$  y  $R$ . Si  $a = 0$ ,  $T_a(z) = z$  luego  $T_a(D(0, r)) = D(0, r)$ . Supongamos que  $a \neq 0$ . Sea  $L$  la recta que pasa por  $0$  y  $a$ . Calculamos  $S_a(L)$  hallando la imagen de tres puntos.

$$S_a(0) = -a, \quad S_a(a) = 0, \quad S_a\left(\frac{1}{\bar{a}}\right) = \infty.$$

$L' = S_a(L)$  es la recta que pasa por  $0$  y por  $-a$ , luego  $L'$  coincide con  $L$ . Como  $L'$  es perpendicular a  $\partial D(0, r)$  en los dos puntos de corte y  $T_a$  preserva ángulos en esos dos puntos, entonces  $L$  es perpendicular a  $C$ . Por tanto  $c$  está en  $L$ .

El diámetro  $\left[-r\frac{a}{|a|}, r\frac{a}{|a|}\right]$  se aplica mediante  $T_a$  en un diámetro de  $C$ , que es:

$$\left[T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right), T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right)\right].$$

Entonces:

$$c = \frac{1}{2} \left( T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right) + T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right) \right),$$

$$R = \frac{1}{2} \left| T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right) - T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right) \right|.$$

Calculamos:

$$T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right) = \frac{-r\frac{a}{|a|} + a}{1 - \bar{a}r\frac{a}{|a|}} = \frac{-ra + a|a|}{|a| - r|a|^2} = \frac{a(|a| - r)}{|a|(1 - r|a|)},$$

$$T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right) = \frac{r\frac{a}{|a|} + a}{1 + \bar{a}r\frac{a}{|a|}} = \frac{ra + a|a|}{|a| + r|a|^2} = \frac{a(|a| + r)}{|a|(1 + r|a|)}.$$

Se llega a que:

$$c = \frac{1 - r^2}{1 - r^2|a|^2}a,$$

$$R = \frac{r(1 - |a|^2)}{1 - r^2|a|^2}.$$

Observamos que los puntos de mayor y menor módulo de  $C$  son  $T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right)$  y  $T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right)$  Veamos que, de hecho,

$$\left| T_a\left(-r\frac{a}{|a|}\right) \right| = \frac{||a| - r|}{1 - r|a|} \leq \frac{r + |a|}{1 + r|a|} = \left| T_a\left(r\frac{a}{|a|}\right) \right|.$$

■ Si  $|a| \geq r$ ,

$$\frac{|a| - r}{1 - r|a|} \leq \frac{r + |a|}{1 + r|a|} \Leftrightarrow |a| + r|a|^2 - r - r^2|a| \leq r + |a| - r^2|a| - r|a|^2 \Leftrightarrow 2r|a|^2 \leq 2r \Leftrightarrow |a| \leq 1.$$

■ Si  $|a| < r$  se razona de forma análoga.

Entonces, para todo  $z \in \partial D(0, r)$  se tiene que:

$$\frac{||a| - r|}{1 - r|a|} \leq T_a(z) \leq \frac{r + |a|}{1 + r|a|} \Leftrightarrow \frac{||a| - r|}{1 - r|a|} \leq \left| \frac{z + a}{1 + \bar{a}z} \right| \leq \frac{r + |a|}{1 + r|a|} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{||a| - |z||}{1 - |z||a|} \leq \left| \frac{z + a}{1 + \bar{a}z} \right| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |z||a|} \leq |z| + |a|.$$

Hemos probado esto para  $a, z \in \mathbb{D}$ ,  $a, z \neq 0$ . Pero si  $a = 0$  o  $z = 0$  la desigualdad es trivial. Por tanto, esta cadena de desigualdades es cierta para todo  $a, z \in \mathbb{D}$ .

Cambiando  $a$  por  $-a$ , tenemos:

$$\frac{||a| - |z||}{1 - |z||a|} \leq \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |z||a|} \leq |z| + |a|, \quad z, a \in \mathbb{D}.$$

Las desigualdades primera y segunda corresponden al último lema.

Por otro lado,

$$\rho(a, z) \leq |z| + |a|, \quad z, a \in \mathbb{D}.$$

Como  $\rho(z_1, 0) = |z_1|$  y  $\rho(0, z_2) = |z_2|$ , entonces:

$$\rho(a, z) \leq \rho(a, 0) + \rho(0, z), \quad a, z \in \mathbb{D}.$$

Este es un caso particular de la desigualdad triangular.

Sean  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ . Tenemos, usando el teorema de Schwarz-Pick,

$$\begin{aligned} \rho(z_1, z_3) &= \rho(S_{z_2}(z_1), S_{z_2}(z_3)) \leq \rho(S_{z_2}(z_1), 0) + \rho(0, S_{z_2}(z_3)) = \\ &= \rho(S_{z_2}(z_1), S_{z_2}(z_2)) + \rho(S_{z_2}(z_2), S_{z_2}(z_3)) = \rho(z_1, z_2) + \rho(z_2, z_3). \end{aligned}$$

Así que  $\rho$  verifica la desigualdad triangular. Por tanto,  $\rho$  es una distancia en  $\mathbb{D}$  que se denomina distancia pseudohiperbólica en  $\mathbb{D}$ .

$$\rho(z_1, z_2) = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right| = |S_{z_1}(z_2)| < 1.$$

Si  $a \in \mathbb{D}$  y  $0 < r < 1$ , el disco pseudohiperbólico de centro  $a$  y radio  $r$  es:

$$\Delta(a, r) = \{z \in \mathbb{D} : \rho(z, a) < r\}.$$

No consideramos  $r \geq 1$  porque  $\Delta(a, r) = \mathbb{D}$ . Sabemos que  $\Delta(a, r)$  es un disco euclídeo, en concreto un disco abierto de centro  $\frac{1-r^2}{1-r^2|a|^2}a$  y radio  $\frac{r(1-|a|^2)}{1-r^2|a|^2}$ . Si  $a = 0$ ,  $\Delta(a, r) = D(0, r)$ .

Esta distancia es equivalente a la distancia euclídea en  $\mathbb{D}$ .

Si  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ , se tiene que:

$$\rho(T(z_1), T(z_2)) = \rho(z_1, z_2), \quad z_1, z_2 \in \mathbb{D}.$$

Además, si  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , se tiene que:

$$\rho(f(z_1), f(z_2)) \leq \rho(z_1, z_2), \quad z_1, z_2 \in \mathbb{D}.$$

## 2.6. Subordinación

**Definición 2.6.** Sean  $f, F$  holomorfas en  $\mathbb{D}$ . Diremos que  $f$  está subordinada a  $F$ ,  $f \prec F$ , si existe  $w$  holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con  $w(0) = 0$  y  $w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  tal que  $f = F \circ w$ .

*Observación.*  $w$  está en las condiciones del lema de Schwarz.

Veamos algunas propiedades:

- $f(0) = F(w(0)) = F(0)$ .
- $f(\mathbb{D}) = F(w(\mathbb{D})) \subset F(\mathbb{D})$ .
- Si  $0 < r < 1$ , veamos que

$$f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

Si  $z \in D(0, r)$ ,  $f(z) = F(w(z))$ . Por el lema de Schwarz,

$$|w(z)| \leq |z| < r.$$

- Si  $0 < r < 1$ , veamos que

$$\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \max_{|z|=r} |F(z)|.$$

Si  $|z| = r$ , como por el lema de Schwarz  $|w(z)| \leq |z| = r$ , entonces:

$$|f(z)| = |F(w(z))| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)| \Rightarrow \max_{|z|=r} |f(z)| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)|.$$

- Si  $|z| = r$ , como por el lema de Schwarz  $|w'(0)| \leq 1$  y además  $f'(0) = F'(w(0))w'(0) = F'(0)w'(0)$ , entonces:

$$|f(z)| = |F(w(z))| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)| \Rightarrow \max_{|z|=r} |f(z)| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)|.$$

- No se verifica para todo  $r \in (0, 1)$  que

$$\max_{|z|=r} |f'(z)| \leq \max_{|z|=r} |F'(z)|.$$

**Ejemplo** (Contraejemplo). Sean  $f(z) = z^2$  y  $F(z) = z$ . Podemos tomar  $w(z) = z^2$ , que verifica  $w(0) = 0$  y  $w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , luego  $f \prec F$ . Si  $0 < r < 1$ ,

$$\begin{aligned} \max_{|z|=r} |f'(z)| &= \max_{|z|=r} 2|z| = 2r, \\ \max_{|z|=r} |F'(z)| &= 1. \end{aligned}$$

Observamos que no se cumple que  $2r \leq 1$  para todo  $r \in (0, 1)$ .

Por la segunda parte del teorema de Schwarz-Pick,

$$\frac{|w'(z)|}{1 - |w(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}, \quad z \in \mathbb{D}.$$

Entonces, si  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$|f'(z)| = |F'(w(z))||w'(z)| \leq |F'(w(z))| \frac{1 - |w(z)|^2}{1 - |z|^2} \Leftrightarrow (1 - |z|^2)|f'(z)| \leq (1 - |w(z)|^2)|F'(w(z))|.$$

Entonces, si  $0 < r \leq 1$ , tenemos que:

$$\sup_{|z| < r} (1 - |z|^2)|f'(z)| \leq \sup_{|z| < r} (1 - |z|^2)|F'(z)|.$$

Veamos que esto es cierto. Si  $|z| < r$ , como  $|w(z)| \leq |z| < r$ ,

$$(1 - |z|^2)|f'(z)| \leq (1 - |w(z)|^2)|F'(w(z))| \leq \sup_{|z| < r} (1 - |z|^2)|F'(z)|.$$

**Proposición 2.12.** Sean  $f, F$  holomorfas en  $\mathbb{D}$ , con  $f \prec F$ . Entonces:

1.  $f(0) = F(0)$ .
2.  $f(\mathbb{D}) \subset F(\mathbb{D})$ .
3. Para todo  $r \in (0, 1)$ ,

$$f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

4. Para todo  $r \in (0, 1)$ ,

$$\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \max_{|z|=r} |F(z)|.$$

5.  $|f'(0)| \leq |F'(0)|$ .

6. Para todo  $r \in (0, 1]$ ,

$$\sup_{|z| < r} (1 - |z|^2)|f'(z)| \leq \sup_{|z| < r} (1 - |z|^2)|F'(z)|.$$

La última propiedad tiene mucha relación con el espacio de Bloch  $\mathcal{B}$  de las funciones holomorfas en  $\mathbb{D}$  que satisfacen:

$$\sup_{z \in \mathbb{D}} (1 - |z|^2)|f'(z)| < \infty.$$

*Observación.* Veamos qué se puede decir sobre los coeficientes de Taylor. Sean  $f$  y  $F$  holomorfas en  $\mathbb{D}$  con  $f \prec F$ . Consideramos los desarrollos de Taylor de  $f$  y  $F$  para  $z \in \mathbb{D}$ :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n.$$

Usando (1), observamos que:

$$\begin{cases} a_0 = f(0) \\ A_0 = F(0) \end{cases} \Rightarrow a_0 = A_0.$$

Con (2), vemos que:

$$\begin{cases} a_1 = f'(0) \\ A_1 = F'(0) \end{cases} \Rightarrow |a_1| \leq |A_1|.$$

No podemos decir nada más. Por ejemplo, dado  $N \geq 2$ , podemos considerar  $f(z) = z^N$  y  $F(z) = z$ . Observamos que  $f \prec F$  con  $w(z) = z^N$ . Observamos que  $a_N = 1$  y  $A_N = 0$ , luego no es cierto que  $|a_n| \leq |A_n|$ .

Veamos ahora un ejemplo importante de subordinación. Sea  $F$  una aplicación conforme de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$ , siendo  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Si  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset D$  y  $f(0) = F(0)$ , entonces  $f \prec F$ .

Sea  $w = F^{-1} \circ f$ .  $w$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $w(0) = F^{-1}(f(0)) = F^{-1}(F(0)) = 0$  y  $w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Además,  $f = F \circ w$ .

Por ejemplo:

$$P(z) = \frac{1+z}{1-z}.$$

Esta es una transformación de Möbius que aplica  $\partial\mathbb{D}$  en el eje imaginario.  $P(\mathbb{D})$  es el semiplano de la derecha  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$  y  $P(0) = 1$ . Entonces, si  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $f(\mathbb{D}) \subset \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$  y  $f(0) = P(0)$ , entonces  $f \prec P$ . Es decir, si  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $\operatorname{Re}(f(z)) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$  y  $f(0) = 1$ , entonces  $f \prec P$ .

Sea  $\mathcal{P} = \{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : \operatorname{Re}(f(z)) > 0 \forall z \in \mathbb{D}, f(0) = 1\}$ . Entonces:

- $P \in \mathcal{P}$ .
- $f \in \mathcal{P} \Rightarrow f \prec P$ . De hecho,  $\mathcal{P} = \{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : f \prec P\}$ .
- $f \in \mathcal{P} \Rightarrow \frac{1}{f} \in \mathcal{P}$ .

**Teorema 2.13.** Si  $f \in \mathcal{P}$ , entonces:

1. Para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

2.  $|f'(0)| \leq 2$

Veamos cuáles son las aplicaciones conformes de  $\mathbb{D}$  sobre  $\mathbb{D}$ .

Sea  $f$  una aplicación conforme de  $\mathbb{D}$  sobre  $\mathbb{D}$ . Sea  $a = f(0) \in \mathbb{D}$ . Aplicando la segunda parte del teorema de Schwarz-Pick a  $f$  en 0, tenemos que

$$\frac{|f'(0)|}{1-|a|^2} \leq 1,$$

y si se diera igualdad  $f$  sería una transformación de Möbius.

Sea  $g = f^{-1}$ , que es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Aplicando lo mismo en el punto  $a$  tenemos que

$$|g'(a)| \leq \frac{1}{1-|a|^2},$$



y si se diera igualdad  $g$  sería una transformación de Möbius.

Tenemos que:

$$|f'(0)| \leq 1 - |a|^2 \leq \frac{1}{|g'(a)|} = |f'(0)|.$$

Por tanto se da igualdad, así que  $f$  es una transformación de Möbius con  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ . En conclusión, las aplicaciones conformes de  $\mathbb{D}$  sobre  $\mathbb{D}$  son:

$$\{\lambda T_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\} = \{\lambda S_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\} = \{\lambda \varphi_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\}.$$

## 2.7. La métrica de Poincaré

Si  $\gamma$  es un camino en  $\mathbb{C}$  y  $f : \text{sop}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  es continua, entonces:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt, \\ \int_{\gamma} f(z) |dz| &= \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt. \end{aligned}$$

siendo  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  una parametrización  $\mathcal{C}^1$  a trozos de  $\gamma$ .

Veamos algunas propiedades:

1. Si  $f$  es real, entonces  $\int_{\gamma} f(z) |dz| \in \mathbb{R}$ . Si además  $f$  es no negativa, entonces  $\int_{\gamma} f(z) |dz| \geq 0$ .

2. Si  $f(z) = 1$ ,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \text{long}(\gamma).$$

3.

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \max_{z \in \text{sop}(\gamma)} |f(z)| \text{long}(\gamma).$$

4. Si  $f, g : \text{sop}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$  continuas y  $f \leq g$ , entonces:

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| \leq \int_{\gamma} g(z) |dz|.$$

5.

$$\int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) |dz| = \int_{\gamma_1} f(z) |dz| + \int_{\gamma_2} f(z) |dz|.$$

6.

$$\int_{-\gamma} f(z) |dz| = \int_{\gamma} f(z) |dz|.$$

7.

$$\int_{\gamma} (af(z) + bg(z)) |dz| = a \int_{\gamma} f(z) |dz| + b \int_{\gamma} g(z) |dz|, \quad a, b \in \mathbb{C}.$$

Sean  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ . Sea  $\gamma$  un camino en  $\mathbb{D}$  con origen  $z_1$  y extremo  $z_2$ . Podemos considerar la integral

$$\int_{\gamma} \frac{1}{1 - |z|^2} |dz| = \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1 - |z|^2}.$$

Como la función  $z \in \mathbb{D} \mapsto \frac{1}{1-|z|^2}$  es real y positiva, entonces la integral es no negativa. Definimos:

$$\delta(z_1, z_2) = \inf \left\{ \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1-|z|^2} : \gamma \text{ camino en } \mathbb{D} \text{ con origen } z_1 \text{ y extremo } z_2 \right\}.$$

Entonces:

- $\delta(z_1, z_2) \geq 0$ .
- $\delta(z_1, z_2) = \delta(z_2, z_1)$ .
- $\delta(z_1, z_2) = 0 \Leftrightarrow z_1 = z_2$ .

Sean  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ . Consideramos:

$$A_{12} = \left\{ \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1-|z|^2} : \gamma \text{ camino en } \mathbb{D} \text{ con origen } z_1 \text{ y extremo } z_2 \right\}.$$

Se definen de manera análoga  $A_{13}$  y  $A_{23}$ . Observamos que  $A_{12} + A_{23} \subset A_{13}$ . Por tanto:

$$\inf(A_{12} + A_{13}) = \inf A_{12} + \inf A_{23} \geq \inf A_{13} \Leftrightarrow \delta(z_1, z_3) \leq \delta(z_1, z_2) + \delta(z_2, z_3).$$

$\delta$  es una distancia en  $\mathbb{D}$ , denominada distancia hiperbólica en  $\mathbb{D}$ .

**Proposición 2.14.**

1. Si  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , entonces:

$$\delta(f(z_1), f(z_2)) \leq \delta(z_1, z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{D}.$$

2. Si  $T \in \mathcal{M}$  con  $T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ , entonces:

$$\delta(T(z_1), T(z_2)) = \delta(z_1, z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{D}.$$

*Demostración.*

1. Sea  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y sean  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ .

$$\begin{aligned} \delta(z_1, z_2) &= \inf \left\{ \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1-|z|^2} : \gamma \text{ camino de } z_1 \text{ a } z_2 \right\}, \\ \delta(f(z_1), f(z_2)) &= \inf \left\{ \int_{\Gamma} \frac{|dw|}{1-|w|^2} : \Gamma \text{ camino de } f(z_1) \text{ a } f(z_2) \right\}. \end{aligned}$$

Sea  $\gamma$  un camino en  $\mathbb{D}$  con origen  $z_1$  y extremo  $z_2$ , con parametrización  $\mathcal{C}^1$  a trozos  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ . Entonces  $\Gamma = f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  es una parametrización  $\mathcal{C}^1$  a trozos de un camino  $\Gamma$  en  $\mathbb{D}$  con origen  $f(z_1)$  y extremo  $f(z_2)$ . Tenemos:

$$\int_{\Gamma} \frac{|dw|}{1-|w|^2} = \int_a^b \frac{|\Gamma'(t)|}{1-|\Gamma(t)|^2} dt = \int_a^b \frac{|f'(\gamma(t))||\gamma'(t)|}{1-|f(\gamma(t))|^2} dt.$$

Usando la segunda parte del teorema de Schwarz-Pick:

$$\int_a^b \frac{|f'(\gamma(t))||\gamma'(t)|}{1-|f(\gamma(t))|^2} dt \leq \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2} dt = \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1-|z|^2}.$$

Luego tenemos que:

$$\delta(f(z_1), f(z_2)) \leq \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1-|z|^2}, \quad \text{para todo camino } \gamma.$$

Por tanto,  $\delta(f(z_1), f(z_2)) \leq \delta(z_1, z_2)$ .

2. Se tiene aplicando (1) a  $T$  y  $T^{-1}$ .

□

**Proposición 2.15.** Si  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ , entonces:

$$\delta(z_1, z_2) = \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1 + \rho(z_1, z_2)}{1 - \rho(z_1, z_2)} \right).$$

*Demostración.* Si  $z_1 = z_2$  es trivial. Supongamos  $z_1 \neq z_2$ . Consideramos:

$$S_{z_1}(z) = \frac{z - z_1}{1 - \bar{z}_1 z}.$$

Se tiene que  $S_{z_1} \in \mathcal{M}$ ,  $S_{z_1}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $S_{z_1}(z_1) = 0$ . Sabemos que  $S_{z_1}(z_2) \neq 0$ . Además,

$$\delta(z_1, z_2) = \delta(0, S_{z_1}(z_2)).$$

Tomamos  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $|\lambda| = 1$ , tal que  $\lambda S_{z_1}(z_2) \in (0, 1)$ . Sea  $r = \lambda S_{z_1}(z_2)$ . Entonces:

$$\delta(z_1, z_2) = \delta(0, S_{z_1}(z_2)) = \delta(0, r).$$

Además,  $r = |\lambda S_{z_1}(z_2)| = |S_{z_1}(z_2)| = \rho(z_1, z_2)$ . Calculamos  $\delta(0, r)$ .

$$\delta(0, r) = \inf \left\{ \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1 - |z|^2} : \gamma \text{ camino en } \mathbb{D} \text{ con origen } 0 \text{ y extremo } r \right\}.$$

Si  $\gamma = [0, r]$ ,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{|dz|}{1 - |z|^2} &= \int_0^r \frac{dt}{1 - t^2} = \frac{1}{2} \int_0^r \left( \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \frac{1}{2} [-\text{Log}(1-t) + \text{Log}(1+t)]_0^r = \\ &= \frac{1}{2} \left[ \text{Log} \left( \frac{1+t}{1-t} \right) \right]_0^r = \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+r}{1-r} \right). \end{aligned}$$

Luego  $\delta(0, r) \leq \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+r}{1-r} \right)$ .

Sea  $\gamma$  un camino en  $\mathbb{D}$  con origen 0 y extremo  $r$ . Veamos que

$$\int_{\gamma} \frac{|dz|}{1 - |z|^2} \geq \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+r}{1-r} \right).$$

Sea  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  una parametrización  $\mathcal{C}^1$  a trozos de  $\gamma$ . Sean  $u = \text{Re}(f)$  y  $v = \text{Im}(f)$ , de forma que  $\gamma = u + iv$ .  $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{C}^1$  a trozos.

$$\int_{\gamma} \frac{|dz|}{1 - |z|^2} = \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} dt.$$

Tenemos que:

$$\begin{cases} |\gamma(t)|^2 \geq u(t)^2 \Rightarrow 0 < 1 - |\gamma(t)|^2 \leq 1 - u(t)^2 \Rightarrow \frac{1}{1 - |\gamma(t)|^2} \geq \frac{1}{1 - u(t)^2}, \\ |\gamma'(t)| \geq |u'(t)| \geq 0. \end{cases}$$

Así que:

$$\frac{|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} \geq \frac{|u'(t)|}{1 - u(t)^2} \geq \frac{u'(t)}{1 - u(t)^2}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2} dt &\geq \int_a^b \frac{u'(t)}{1-u(t)^2} dt = \frac{1}{2} \int_a^b \left( \frac{u'(t)}{1-u(t)} + \frac{u'(t)}{1+u(t)} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} [-\text{Log}(1-u(t)) + \text{Log}(1+u(t))]_a^b = \frac{1}{2} \left[ \text{Log} \left( \frac{1+u(t)}{1-u(t)} \right) \right]_a^b = \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+r}{1-r} \right), \end{aligned}$$

porque  $u(a) = 0$  y  $u(b) = r$ . Por tanto,

$$\delta(z_1, z_2) = \delta(0, r) = \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+r}{1-r} \right) = \frac{1}{2} \log \left( \frac{1+\rho(z_1, z_2)}{1-\rho(z_1, z_2)} \right).$$

□

*Observación.* Sea  $h(x) = \frac{1}{2} \text{Log} \left( \frac{1+x}{1-x} \right)$ ,  $x \in [0, 1)$ . Observamos que si  $x < 1$ , entonces  $1+x \geq 1-x > 0 \Rightarrow \frac{1+x}{1-x} \geq 1$ , así que  $h : [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ .  $h$  es creciente, con  $h(0) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \infty$ . Podemos escribir  $\delta = h \circ \rho : \mathbb{D} \times \mathbb{D} \xrightarrow{\rho} [0, 1) \xrightarrow{h} [0, \infty)$ . Fijado  $a \in \mathbb{D}$ , si  $\{z_n\}_{n=1}^\infty$  está en  $\mathbb{D}$  con  $|z_n| \rightarrow 1$ , entonces:

$$\rho(a, z_n) = |S_a(z_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Por tanto,  $\delta(a, z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ .

$\mathbb{D}$  con esta distancia  $\delta$  es un modelo de la geometría hiperbólica. Si  $\gamma$  es un camino en  $\mathbb{D}$ , la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_\gamma \frac{|dz|}{1-|z|^2}.$$

La geodésica que une  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  es el camino  $\gamma$  para el que:

$$\delta(z_1, z_2) = \int_\gamma \frac{|dz|}{1-|z|^2}.$$

Las geodésicas con respecto a  $\delta$  son los diámetros de  $\partial\mathbb{D}$  y los arcos de circunferencia ortogonales a  $\partial\mathbb{D}$ .

## Capítulo 3

# Familias normales

### 3.1. Familias normales

**Teorema 3.1** (Teorema de convergencia de Weierstrass). *Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sean  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  una sucesión de funciones holomorfas en  $D$  y  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ . Si  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ , entonces  $f$  es holomorfa en  $D$  y  $f'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f'$  uniformemente en cada subconjunto compacto. Para todo  $k \in \mathbb{N}$ ,  $f_n^{(k)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f^{(k)}$  uniformemente en cada compacto.*

**Definición 3.1.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ . Diremos que  $\mathcal{F}$  es finitamente normal si para cada sucesión  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  en  $\mathcal{F}$  existe una subsucesión  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  de  $\{f_n\}$  que converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

*Observación.* El límite  $f$  de tal subsucesión es una función holomorfa en  $D$ , pero no tiene por qué pertenecer a  $\mathcal{F}$ .

**Definición 3.2.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ . Diremos que  $\mathcal{F}$  es compacta si para cada sucesión  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  en  $\mathcal{F}$  existe una subsucesión  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  de  $\{f_n\}$  que converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$  a una función que pertenece a  $\mathcal{F}$ .

En el conjunto  $\text{Hol}(D)$  de las funciones holomorfas en  $D$ , con  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$ , se puede definir una distancia  $d$  tal que  $(\text{Hol}(D), d)$  es un espacio métrico completo, y en el que:

$$f_n \xrightarrow{d} f \Leftrightarrow f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en cada subconjunto compacto de } D.$$

Si  $\mathcal{F} \subset \text{Hol}(D)$ ,  $\mathcal{F}$  es finitamente normal si y solo si  $\mathcal{F}$  es relativamente compacto. Los compactos coinciden con la definición de familia compacta dada.

### 3.2. El teorema de Montel

**Lema 3.2.** *Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ . Entonces son equivalentes:*

1.  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en cada subconjunto compacto de  $D$ .
2. Para cada  $a \in D$  existe  $r_a > 0$  con  $D(a, r_a) \subset D$  y  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $D(a, r_a)$ .

**Lema 3.3.** *Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sean  $f_n : D \rightarrow \mathbb{C}$  para  $n = 1, 2, \dots$  y  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ . Entonces son equivalentes:*

1.  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .
2. Para cada  $a \in D$  existe  $r_a > 0$  con  $D(a, r_a) \subset D$  tal que  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $D(a, r_a)$ .

**Lema 3.4.** Sean  $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ , con  $C_1 \cap C_2 = \emptyset$  y  $C_1, C_2 \neq \emptyset$ . Si  $C_1$  es compacto y  $C_2$  es cerrado, entonces:

$$\text{dist}(C_1, C_2) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in C_1, z_2 \in C_2\} > 0.$$

*Observación.* Si  $C_1$  no es compacto no es cierto en general.

**Lema 3.5.** Sea  $A \subset \mathbb{C}$ ,  $A \neq \emptyset$  y sea

$$F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, F(z) = \text{dist}(z, A) = \inf\{|z - a| : a \in A\}.$$

Entonces  $F$  es continua y  $F(z) = 0$  para todo  $z \in A$ . Si además  $A$  es cerrado, entonces  $F(z) = \min\{|z - a| : a \in A\}$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ .

**Lema 3.6.** Sea  $A \subset \mathbb{C}$ ,  $A \neq \emptyset$  y sea  $\varepsilon > 0$ . Consideramos los conjuntos:

$$B = \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, A) < \varepsilon\},$$

$$C = \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, A) \leq \varepsilon\}.$$

Entonces  $B$  es abierto y  $C$  es cerrado, con  $A \subset B \subset C$ . Si además  $A$  es acotado, entonces  $B$  es acotado y  $C$  es compacto.

**Proposición 3.7.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ . Supongamos que  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $D$ . Sea  $K$  un subconjunto compacto de  $D$ . Entonces existe  $A > 0$  tal que:

$$|f(z_2) - f(z_1)| \leq A|z_2 - z_1|, \quad \forall z_1, z_2 \in K, \forall f \in \mathcal{F}.$$

*Demostración.* Sea  $M > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M$  para todo  $z \in D$  y para toda  $f \in \mathcal{F}$ . Sean  $K \subset D$ ,  $K$  compacto. Sea  $d > 0$  con  $d < \text{dist}(K, \mathbb{C} \setminus D)$ . Si  $D = \mathbb{C}$ , tomamos  $d > 0$  cualquiera. Sea  $z_0 \in K$ . Entonces  $D(z_0, d) \subset D$ . De hecho, podemos tomar  $\varepsilon > 0$  tal que  $D(z_0, d + \varepsilon) \subset D$ . Dada  $f \in \mathcal{F}$ , por la fórmula de Cauchy,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi - z_0|=d} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi \quad \text{si } z \in D\left(z_0, \frac{d}{2}\right).$$

Entonces:

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} 2\pi \max_{|\xi - z_0|=d} \frac{|f(\xi)|}{|\xi - z|^2}.$$

Podemos acotar:

$$|\xi - z| = |(\xi - z_0) + (z_0 - z)| \geq |\xi - z_0| - |z_0 - z| \geq d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2}.$$

Así que  $|\xi - z|^2 \geq \frac{d^2}{4} > 0$ . Luego:

$$|f'(z)| \leq d \frac{M}{d^2/4} = \frac{4M}{d}.$$

Hemos probado que si  $z_0 \in K$ ,  $f \in \mathcal{F}$  y  $z \in D(z_0, \frac{d}{2}) \subset D$ , entonces  $|f'(z)| \leq \frac{4M}{d}$ .

Ahora, sean  $z_1, z_2 \in K$  y  $f \in \mathcal{F}$ . Supongamos que  $|z_1 - z_2| < \frac{d}{2}$ . Si  $\xi \in [z_1, z_2]$ , entonces  $z_2 \in D(z_1, \frac{d}{2}) \subset D$  y  $|\xi - z_1| \leq |z_1 - z_2| < \frac{d}{2}$ ,  $\xi \in D(z_1, \frac{d}{2})$ . Entonces  $\xi \in D$  y  $|f'(\xi)| \leq \frac{4M}{d}$ . Por tanto:

$$|f(z_2) - f(z_1)| = \left| \int_{[z_1, z_2]} f'(\xi) d\xi \right| \leq |z_2 - z_1| \max_{\xi \in [z_1, z_2]} |f'(\xi)| \leq |z_2 - z_1| \frac{4M}{d}.$$

Entonces, si  $z_1, z_2 \in K$ ,  $|z_1 - z_2| < \frac{d}{2}$  y  $f \in \mathcal{F}$ , se tiene que:

$$|f(z_2) - f(z_1)| \leq A|z_2 - z_1|.$$

Ahora, si  $z_1, z_2 \in K$ ,  $|z_2 - z_1| \geq \frac{d}{2}$  y  $f \in \mathcal{F}$ , tenemos:

$$|f(z_2) - f(z_1)| \leq |f(z_2)| + |f(z_1)| \leq 2M = 2M \frac{d}{2} \frac{2}{d} \leq \frac{4M}{d} |z_2 - z_1| = A |z_2 - z_1|.$$

□

**Teorema 3.8** (Teorema de Arzelá-Ascoli). Sean  $(X_1, d_1)$  y  $(X_2, d_2)$  dos espacios métricos, siendo  $(X_1, d_1)$  separable y  $(X_2, d_2)$  completo. Sea  $\mathcal{F}$  una familia de aplicaciones continuas de  $X_1$  en  $X_2$  que verifica:

1.  $\mathcal{F}$  es puntualmente equicontinua. Es decir, dado  $x \in X_1$  se verifica que, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que si  $y \in X_1$  con  $d_1(x, y) < \delta$ , entonces  $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$  para toda  $f \in \mathcal{F}$ .
2. Para todo  $x \in X_1$ , el conjunto  $\{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$  es relativamente compacto.

Entonces, si  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  es una sucesión en  $\mathcal{F}$ , existe una subsucesión  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  de  $\{f_n\}$  que converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $X_1$ .

**Teorema 3.9** (Teorema de Montel). Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ . Entonces son equivalentes:

1.  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.
2.  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en cada subconjunto compacto de  $D$ . Es decir, para cada  $K \subset D$ ,  $K$  compacto, existe  $M_K > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M_K$  para toda  $f \in \mathcal{F}$  y para todo  $z \in K$ .

*Demostración.*

⇒ Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ , con  $\mathcal{F}$  finitamente normal. Supongamos por reducción al absurdo que existe  $K \subset D$ ,  $K$  compacto, tal que  $\mathcal{F}$  no está uniformemente acotada en  $K$ . Entonces existen  $\{z_n\}_{n=1}^\infty$  en  $K$  y  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  en  $\mathcal{F}$  tales que  $|f_n(z_n)| \rightarrow \infty$ .

Como  $\mathcal{F}$  es una familia finitamente normal, existe  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  subsucesión de  $\{f_n\}$  tal que  $\{f_{n_k}\}$  converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$  a una función  $f$  holomorfa en  $D$ . Como  $f$  es continua en  $K$  y  $K$  es compacto, existe  $M > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M$  para todo  $z \in K$ . Por otro lado, como  $f_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f$  uniformemente en  $K$ , existe  $k_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $k \geq k_0$ ,  $z \in K \Rightarrow |f_{n_k}(z) - f(z)| < 1$ . Entonces  $|f_{n_k}(z)| \leq |f_{n_k}(z) - f(z)| + |f(z)| < 1 + M$ ,  $z \in K$ ,  $k \geq k_0$ . En particular,  $|f_{n_k}(z_{n_k})| < 1 + M$  si  $k \geq k_0$ . Esta es una contradicción.

⇐ Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D$ , uniformemente acotada en cada subconjunto compacto de  $D$ . Tomamos  $X_1 = D$  y  $X_2 = \mathbb{C}$ .

1. Sea  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , veamos que existe  $\delta > 0$  tal que, si  $z_1 \in D$ ,  $|z_1 - z_0| < \delta$ ,  $f \in \mathcal{F}$ , entonces  $|f(z_1) - f(z_0)| < \varepsilon$ . Sea  $R > 0$  con  $\overline{D}(0, R) \subset D$ .  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $\overline{D}(z_0, R)$  y por tanto en  $D(z_0, R)$ . Sea  $K = \overline{D}(z_0, \frac{R}{2})$ , que es un subconjunto compacto de  $D(z_0, R)$ . Por la proposición anterior, existe  $A > 0$  tal que

$$|f(z_2) - f(z_1)| \leq A |z_2 - z_1|, \quad \text{si } z_1, z_2 \in K, f \in \mathcal{F}.$$

Entonces, si  $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{A}, \frac{R}{2}\right)$ ,  $z_1 \in D$ ,  $|z_1 - z_0| < \delta$  y  $f \in \mathcal{F}$ , entonces  $z_1 \in \overline{D}(z_0, \frac{R}{2}) = K$ , así que:

$$|f(z_1) - f(z_0)| \leq A |z_1 - z_0| < A\delta \leq A \frac{\varepsilon}{A} = \varepsilon.$$

2. Sea  $z \in D$ . El conjunto  $\{f(z) : f \in \mathcal{F}\}$  está acotado, ya que  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $\{z\}$ . Por tanto, su clausura es compacta.

Entonces, por el teorema de Arzelá-Ascoli, existe una subsucesión  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  de  $\{f_n\}$  que converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Por tanto,  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.

□

*Observación.*

1. Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$ . Si  $\mathcal{F}$  es una familia finitamente normal de funciones holomorfas en  $D$ , entonces la familia  $\mathcal{F}' = \{f' : f \in \mathcal{F}\}$  es finitamente normal. En general, si  $k \in \mathbb{N}$ , la familia  $\mathcal{F}^{(k)} = \{f^{(k)} : f \in \mathcal{F}\}$  es finitamente normal.  
Sea  $\{g_n\}_{n=1}^\infty$  en  $\mathcal{F}'$ . Entonces  $g_n = f'_n$ ,  $f_n \in \mathcal{F}$ . Existe  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  subsucesión de  $\{f_n\}$  que converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$  a una función  $f$  holomorfa en  $D$ . Entonces  $g_{n_k} = f'_{n_k} \rightarrow f'$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .
2. Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $\mathcal{G}$  familia finitamente normal de funciones holomorfas en  $D$  con  $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ . Entonces  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.
3. Si  $a \in \mathbb{C}$ ,  $R > 0$  y  $K \subset D(a, R)$ ,  $K$  compacto, entonces existe  $r \in (0, R)$  tal que  $K \subset \overline{D}(a, r)$ .

**Ejemplo.**

1.  $\mathcal{F} = \{f : f \text{ es entera y } |f(z)| \leq n \text{ si } |z| = n, n = 1, 2, \dots\}$ . Sea  $K \subset \mathbb{C}$ ,  $K$  compacto, y sea  $f \in \mathcal{F}$ . Existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $K \subset \overline{D}(0, n_0)$ . Además,  $|f(z_0)| \leq n_0$  si  $|z| = n_0$ . Por el principio del máximo,  $|f(z)| \leq n_0$  si  $|z| \leq n_0$ . En particular,  $|f(z)| \leq n_0$  si  $z \in K$  y  $f \in \mathcal{F}$ .  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $K$ . Por el teorema de Montel,  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.
2.  $\mathcal{P} = \{f : f \text{ es holomorfa en } \mathbb{D}, f(0) = 1, \operatorname{Re}(f(z)) > 0 \forall z \in \mathbb{D}\}$ . Sea  $K \subset \mathbb{D}$ ,  $K$  compacto. Si  $f \in \mathcal{P}$  y  $z \in K$ ,

$$|f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}.$$

Existe  $R \in (0, 1)$  tal que  $K \subset \overline{D}(0, R)$ . Entonces, si  $f \in \mathcal{P}$  y  $z \in K$ ,

$$|f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|} \leq \frac{1 + R}{1 - R}.$$

$\mathcal{P}$  está uniformemente acotada en  $K$  para todo subconjunto compacto  $K$  de  $\mathbb{D}$ . Por el teorema de Montel,  $\mathcal{P}$  es finitamente normal.

*Observación.* Si quitamos la condición  $f(0) = 1$  en  $\mathcal{P}$ , la familia deja de ser finitamente normal. Por ejemplo,  $f_n(z) = n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ,  $\{f_n : n = 1, 2, \dots\} \subset \mathcal{P}$ . Si tomamos  $K = \{0\}$ ,  $\mathcal{P}$  no está uniformemente acotada en  $K$ , así que  $\mathcal{P}$  no es finitamente normal.

Recordemos que  $\mathcal{P} = \{f : f \text{ es holomorfa en } \mathbb{D}, f \prec P\}$ , con  $P(z) = \frac{1+z}{1-z}$ . Esto es un caso particular del siguiente ejemplo.

3. Sea  $F$  holomorfa en  $\mathbb{D}$  y sea

$$\mathcal{F}_F = \{f : f \text{ holomorfa en } \mathbb{D}, f \prec F\}.$$

Entonces  $\mathcal{F}_F$  es finitamente normal.

4. Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Sea  $\mathcal{F}$  una familia finitamente normal de funciones holomorfas en  $D(a, R)$ . Para cada  $f \in \mathcal{F}$ , consideramos el desarrollo de Taylor de  $f$  centrado en  $a$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(f)(z-a)^n, \quad z \in D(a, R).$$

Entonces  $M_n = \sup_{f \in \mathcal{F}} |a_n(f)| < \infty$  para cada  $n$  y la serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} M_n(z-a)^n$  tiene radio de convergencia mayor o igual que  $R$ , y por tanto define una función holomorfa en  $D(a, R)$ .



*Demostración.* Fijado  $n$ , si  $f \in \mathcal{F}$  tenemos:

$$a_n(f) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \Rightarrow |a_n(f)| = \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}.$$

La familia  $\mathcal{F}^{(n)}$  es finitamente normal y por tanto está uniformemente acotada en el conjunto  $\{a\}$ , por lo que  $\{f^{(n)}(a) : f \in \mathcal{F}\}$  está acotado. Es decir,  $\sup_{f \in \mathcal{F}} |f^{(n)}(a)| < \infty$ . Entonces  $M_n = \sup_{f \in \mathcal{F}} |a_n(f)| = \sup_{f \in \mathcal{F}} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} < \infty$ . Consideramos la serie de potencias:

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n (z-a)^n.$$

Si  $r \in (0, R)$ , tenemos que  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $\overline{D}(a, r)$ , y por tanto existe  $M(r) > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M(r)$  si  $z \in \overline{D}(a, r)$  y  $f \in \mathcal{F}$ . Si  $f \in \mathcal{F}$ , por la fórmula de Cauchy,

$$a_n(f) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad \text{si } r \in (0, R), n = 0, 1, 2, \dots$$

Así que:

$$|a_n(f)| \leq \frac{1}{2\pi} 2\pi r \max_{|z-a|=r} \frac{|f(z)|}{|z-a|^{n+1}} \leq r \frac{M(r)}{r^{n+1}} = \frac{M(r)}{r^n}, \quad \text{si } r \in (0, R), n = 0, 1, 2, \dots, f \in \mathcal{F}.$$

Tomando supremo en  $f \in \mathcal{F}$  tenemos que:

$$|M_n| = M_n \leq \frac{M(r)}{r^n} \Rightarrow \sqrt[n]{M_n} \leq \frac{\sqrt[n]{M(r)}}{r}, \quad \text{si } r \in (0, R), n = 0, 1, 2, \dots$$

Por tanto:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{M(r)}}{r} = \frac{1}{r}, \quad \text{si } r \in (0, R).$$

Haciendo  $r \rightarrow R$ ,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M_n} \leq \frac{1}{R}.$$

Entonces el radio de convergencia es mayor o igual que  $R$ . □

5.  $\mathcal{F} = \{f : f \text{ es holomorfa en } \mathbb{D} \text{ y } \iint_{\mathbb{D}} |f(z)| dx dy \leq M\}$ , siendo  $M > 0$ . Veamos que  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.

Sea  $K \subset \mathbb{D}$ ,  $K$  compacto. Tomamos  $r \in (0, 1)$  con  $K \subset D(0, r)$ . Sea  $f \in \mathcal{F}$  y  $z \in K$ , por la fórmula de Cauchy:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(\rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta} - z} \rho d\theta, \quad r \leq \rho < 1.$$

Podemos acotar

$$|f(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|f(\rho e^{i\theta})|}{|\rho e^{i\theta} - z|} \rho d\theta, \quad r \leq \rho < 1.$$

Entonces:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 |f(z)| d\rho \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|f(\rho e^{i\theta})|}{|\rho e^{i\theta} - z|} \rho d\theta d\rho = \frac{1}{2\pi} \iint_{\frac{1}{2} < |w| < 1} \frac{|f(w)|}{|w-z|} dx dy.$$

Como  $|w - z| \geq |w| - |z| > \frac{1+r}{2} - r = \frac{1-r}{2} > 0$ ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \iint_{\frac{1+r}{2} < |w| < 1} \frac{|f(w)|}{|w - z|} dx dy &\leq \frac{1}{2\pi} \frac{2}{1-r} \iint_{\frac{1+r}{2} < |w| < 1} |f(w)| dx dy \leq \\ &\leq \frac{1}{\pi(1-r)} \iint_{\mathbb{D}} |f(w)| dx dy \leq \frac{M}{\pi(1-r)}. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\int_{\frac{1+r}{2}}^1 |f(z)| d\rho = |f(z)| \left(1 - \frac{1+r}{2}\right) = |f(z)| \frac{1-r}{2}.$$

Entonces:

$$|f(z)| \frac{1-r}{2} \leq \frac{M}{\pi(1-r)} \Rightarrow |f(z)| \leq \frac{2M}{\pi(1-r)^2}.$$

Por tanto,  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $K$ .

**Teorema 3.10.** Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Sea  $\mathcal{F}$  una familia de funciones holomorfas en  $D(a, R)$ . Las siguientes condiciones son equivalentes:

1.  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.
2. Existe una sucesión  $\{M_n\}_{n=0}^{\infty}$  con  $M_n \geq 0$  para todo  $n$  tal que la serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} M_n(z - a)^n$  tiene radio de convergencia mayor o igual que  $R$  y tal que, si para cada  $f \in \mathcal{F}$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(f)(z - a)^n, \quad z \in D(a, r)$$

, se tiene que  $|a_n(f)| \leq M_n$  para todo  $n$  y para toda  $f \in \mathcal{F}$ .

*Demostración.*

$$\boxed{\Rightarrow} \quad M_n = \sup_{f \in \mathcal{F}} |a_n(f)|.$$

$$\boxed{\Leftarrow} \quad \text{Sea } K \subset D(a, R), \text{ } K \text{ compacto. Existe } r \in (0, R) \text{ tal que } K \subset \overline{D}(a, r). \text{ Si } z \in K \text{ y } f \in \mathcal{F}, \text{ se tiene que}$$

$$|f(z)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n(f)(z - a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n(f)| |z - a|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} M_n |z - a|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n < \infty,$$

ya que  $\sum_{n=0}^{\infty} M_n(z - a)^n$  converge para  $z = a + r$ .  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $K$ . □

### 3.3. El teorema de Stieltjes-Vitali

**Teorema 3.11** (Teorema de Stieltjes-Vitali). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $\mathcal{F}$  una familia finitamente normal de funciones holomorfas en  $D$ . Sea  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión en  $\mathcal{F}$ . Si existe  $A \subset D$  tal que  $A$  tiene algún punto de acumulación en  $D$ , para el que existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) \in \mathbb{C}$  para todo  $a \in A$ , entonces  $\{f_n\}$  converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

*Demostración.*

1. Veamos que  $\{f_n\}$  converge puntualmente en  $D$ . Sea  $z^* \in D$ . Supongamos por reducción al absurdo que  $\{f_n(z^*)\}$  no converge. Como  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en el conjunto  $\{z^*\}$ , tenemos que  $\{f_n(z^*)\}$  está acotado. Por tanto, existen  $\{f_{n_i}\}_{i=1}^{\infty}$  y  $\{f_{m_i}\}_{i=1}^{\infty}$  subsucesiones de  $\{f_n\}$ , y  $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$  distintos, tales que  $f_{n_i}(z^*) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} w_1$ ,  $f_{m_i}(z^*) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} w_2$ . Como  $\mathcal{F}$  es finitamente normal, existen  $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$  y  $\{h_k\}_{k=1}^{\infty}$  subsucesiones de  $\{f_{n_i}\}$  y  $\{f_{m_i}\}$ , respectivamente, que convergen

uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Sean  $g$  y  $h$  los respectivos límites. Entonces  $g$  y  $h$  son holomorfas en  $D$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned} g_k(z^*) &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} w_1, & g(z^*) &= w_1, \\ h_k(z^*) &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} w_2, & h(z^*) &= w_2. \end{aligned}$$

Si  $a \in A$ , existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) \in \mathbb{C}$ , así que  $g(a) = h(a)$ .  $g$  y  $h$  son holomorfas en  $D$ ,  $g = h$  en  $A$  y  $A$  tiene algún punto de acumulación en  $D$ . Por el teorema de identidad,  $g = h$  en  $D$ . Pero  $g(z^*) = w_1 \neq w_2 = h(z^*)$ . Esto contradice nuestro supuesto.

2. Sea  $K \subset D$ ,  $K$  compacto. Sea  $\alpha > 0$  tal que  $2\alpha < \text{dist}(K, \mathbb{C} \setminus D)$ . Si  $D = \mathbb{C}$ , tomamos  $\alpha > 0$  cualquiera. Sean  $G = \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, K) < \alpha\}$  y  $K_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, K) \leq \alpha\}$ .  $G$  es abierto,  $K_1$  es compacto y  $K \subset G \subset K_1 \subset D$ .

Veamos que  $K_1 \subset D$ . Si  $z \in K_1$ ,  $\text{dist}(z, K) \leq \alpha$ . Supongamos que  $z \in D$ . Tomamos  $w \in K$  con  $|z - w| < 2\alpha$ . Entonces  $2\alpha < \text{dist}(K, \mathbb{C} \setminus D) \leq |w - z| < 2\alpha$ . Esto contradice nuestra hipótesis.

$\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $K_1$  y por tanto en  $G$ .  $K \subset G$ ,  $K$  compacto. Por una proposición previa, existe  $A > 0$  tal que  $|f(z_2) - f(z_1)| \leq A|z_2 - z_1|$  si  $z_1, z_2 \in K$  y  $f \in \mathcal{F}$ . Vamos a ver que  $\{f_n\}$  es uniformemente de Cauchy en  $K$ . Sea  $\varepsilon > 0$  y sea  $\delta = \frac{\varepsilon}{3A} > 0$ . Tenemos que si  $z_1, z_2 \in K$ ,  $|z_1 - z_2| < \delta$  y  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| \leq A|z_1 - z_2| < A\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ . Consideramos la familia  $\{D(z, \delta) : z \in K\}$ . Como  $K$  es compacto, existen  $z_1, z_2, \dots, z_N \in K$  tales que  $K \subset \bigcup_{j=1}^N D(z_j, \delta)$ . Para cada  $j \in \{1, \dots, N\}$ , la sucesión  $\{f_n(z_j)\}_{n=1}^\infty$  es de Cauchy, ya que  $\{f_n\}$  converge puntualmente en  $D$ . Por tanto, existe  $n_j \in \mathbb{N}$  tal que  $n, m \geq n_j \Rightarrow |f_n(z_j) - f_m(z_j)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Sea  $n_0 = \max\{n_j : j = 1, \dots, N\}$ . Si  $n, m \geq n_0$  y  $z \in K$ , hay que probar que  $|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$ . Tomamos  $j \in \{1, \dots, N\}$  con  $z \in D(z_j, \delta)$ .

$$|f_n(z) - f_m(z)| \leq |f_n(z) - f_n(z_j)| + |f_n(z_j) - f_m(z_j)| + |f_m(z_j) - f_m(z)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

□

**Ejemplo.** Para  $x \geq 0$ , tenemos que  $(1 + \frac{x}{n})^n$  es una sucesión creciente y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

Veamos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ , siendo la convergencia uniforme en cada subconjunto compacto de  $\mathbb{C}$ .

Sea  $D = \mathbb{C}$ ,  $f_n(z) = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Cada  $f_n$  es una función entera. Veamos que  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.

Sea  $K \subset \mathbb{C}$ ,  $K$  compacto. Tomamos  $R > 0$  con  $K \subset \overline{D}(0, R)$ . Si  $k \in K$  y  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$|f_n(z)| = \left|1 + \frac{z}{n}\right|^n \leq \left(1 + \frac{|z|}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{R}{n}\right)^n \leq e^R.$$

Sea  $A = [0, 1]$ .  $A$  tiene puntos de acumulación en  $\mathbb{C}$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = e^x$  para todo  $x \in A$ . Por el teorema de Stieltjes-Vitali,  $\{f_n\}$  converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $\mathbb{C}$ . Sea  $f$  el límite, entonces  $f$  es entera. Si  $x \in A$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = e^x$ . Por el teorema de identidad,  $f(z) = e^z$  si  $z \in \mathbb{C}$ .

**Teorema 3.12** (Teorema de Lindelöf). *Sea  $f$  holomorfa y acotada en  $\mathbb{D}$ . Sea  $\xi \in \partial\mathbb{D}$  y supongamos que existe el límite radial, es decir,  $\lim_{r \rightarrow 1^-} f(r\xi) = L \in \mathbb{C}$ . Entonces para todo  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$  existe el límite tangencial de  $f$  en  $\xi$ , es decir,*

$$\lim_{z \rightarrow \xi, z \in S_\alpha(\xi)} f(z) = L,$$

siendo  $S_\alpha(\xi)$  el vector de vértice  $\xi$  y ángulo  $2\alpha$ , simétrico con respecto al segmento  $[0, \xi]$ .

**Teorema 3.13.** Sea  $f$  holomorfa y acotada en  $D(1, 1)$ . Supongamos que existe  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L \in \mathbb{C}$ . Entonces para todo  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$  existe

$$\lim_{z \rightarrow 0, |\operatorname{Arg}(z)| < \alpha} f(z) = L.$$

*Demostración.* Sea  $M > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M$  si  $z \in D(1, 1)$ . Consideramos la sucesión  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ ,  $f_n(z) = f(\frac{z}{n})$ . Cada  $f_n$  es holomorfa en  $D(1, 1)$ . La familia  $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  está uniformemente acotada en  $D$ , porque si  $z \in D$  y  $n \in \mathbb{N}$  se tiene que  $|f_n(z)| = |f(\frac{z}{n})| \leq M$ . Así que  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.

Sea  $A = (0, 1)$ . Si  $x \in A$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{x}{n}) = L$ . Por el teorema de Stieltjes-Vitali,  $\{f_n\}$  converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D(1, 1)$ . Sea  $g$  el límite, entonces  $g$  es holomorfa en  $D(1, 1)$  y  $g(x) = L$  para todo  $x \in A$ . Por el teorema de identidad,  $g(z) = L$  para todo  $z \in D(1, 1)$ . Hemos probado que  $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

Sea  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ . Sea  $K = \left\{z \in \mathbb{C} : \frac{\cos(\alpha)}{2} \leq |z| \leq \cos(\alpha), |\operatorname{Arg}(z)| \leq \alpha\right\}$ .  $K$  es un subconjunto compacto de  $D(1, 1)$ , así que  $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$  uniformemente en  $K$ . Es decir, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que, si  $n \geq n_0$  y  $z \in K$ , entonces  $|f_n(z) - L| < \varepsilon$ .

Sea  $\delta = \frac{\cos(\alpha)}{2n_0} > 0$ . Sea  $z$  tal que  $0 < |z| < \delta$  y  $|\operatorname{Arg}(z)| < \alpha$ . Observamos que  $|z| < \frac{\cos(\alpha)}{2n_0} \leq \frac{\cos(\alpha)}{2}$ . Tomamos  $n_z$  el primer natural para el que  $n_z|z| \geq \frac{\cos(\alpha)}{2}$ . Como  $|z| < \frac{\cos(\alpha)}{2n_0} \Leftrightarrow n_0|z| < \frac{\cos(\alpha)}{2}$ , entonces  $1 \leq n_0 < n_z$ . Por otro lado,

$$(n_z - 1)|z| < \frac{\cos(\alpha)}{2} \Leftrightarrow n_z|z| - |z| < \frac{\cos(\alpha)}{2} \Leftrightarrow n_z|z| < |z| + \frac{\cos(\alpha)}{2} < \frac{\cos(\alpha)}{2} + \frac{\cos(\alpha)}{2} = \cos(\alpha).$$

Así que  $\frac{\cos(\alpha)}{2} \leq n_z|z| = |n_z z| < \cos(\alpha)$ . Además,  $|\operatorname{Arg}(n_z z)| = |\operatorname{Arg}(z)| < \alpha$ . Por tanto,  $n_z z \in K$ . Entonces:

$$|f_{n_k}(n_z z) - L| = |f(z) - L| < \varepsilon.$$

□

### 3.4. Teoremas de Hurwitz

**Teorema 3.14** (Teorema de Rouché). Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  y sea  $J$  un camino de Jordan en  $D$ . Sean  $f$  y  $g$  funciones holomorfas en  $D$  tales que

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \quad \text{si } z \in J.$$

Entonces:

1.  $I(J) \subset D$ .
2. Ni  $f$  ni  $g$  se anulan en  $J$ .
3.  $f$  y  $g$  tienen el mismo número de ceros en  $I(J)$ .

**Teorema 3.15** (Primer teorema de Hurwitz). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  una sucesión de funciones holomorfas y nunca nulas en  $D$ , que converge uniformemente en cada subconjunto de  $D$  a una función  $f$ . Entonces  $f$  es nunca nula en  $D$  o bien  $f$  es idénticamente nula en  $D$ .

*Demostración.* Si  $f \equiv 0$  en  $D$ , no hay nada que hacer. Supongamos que  $f \not\equiv 0$  en  $D$ . Supongamos por reducción al absurdo que existe  $a \in D$  con  $f(a) = 0$ . Entonces  $a$  es un cero aislado de  $f$ . Podemos tomar  $R > 0$  tal que  $D(a, 2R) \subset D$  y  $f$  no tiene ceros en  $D(a, 2R) \setminus \{a\}$ .

Sea  $C_R$  la circunferencia  $|z - a| = R$ . Como  $f$  no tiene ceros en  $C_R$ , existe  $\alpha > 0$  tal que  $|f(z)| > \alpha$  para todo  $z \in C_R$ . Como  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en  $C_R$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $n \geq n_0, z \in C_R \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \alpha$ . Entonces, si  $n \geq n_0$  y  $z \in C_R$ , se tiene que

$$|f_n(z) - f(z)| < \alpha < |f(z)|.$$

Por el teorema de Rouché,  $f_n$  y  $f$  tienen el mismo número de ceros en  $D(a, R)$ . Pero  $f_n$  es nunca nula en  $D$ , por lo que no tiene ceros en  $D(a, R)$ , mientras que  $f(a) = 0$ . Esta es una contradicción. Entonces  $f$  es nunca nula en  $D$ .  $\square$

**Teorema 3.16** (Segundo teorema de Hurwitz). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de funciones holomorfas e inyectivas en  $D$ . Si  $\{f_n\}$  converge uniformemente a  $f$  en cada subconjunto compacto de  $D$ , entonces  $f$  es inyectiva o constante.*

*Demostración.* Sabemos que  $f$  es holomorfa en  $D$ . Supongamos que  $f$  no es constante. Sean  $a, b \in D$  con  $a \neq b$ . Veamos que  $f(a) \neq f(b)$ .  $D \setminus \{a\}$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , sea  $g_n(z) = f_n(z) - f_n(a)$  si  $z \in D \setminus \{a\}$ . Cada  $g_n$  es holomorfa y nunca nula en  $D \setminus \{a\}$ .  $f_n \rightarrow f$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Sea  $g(z) = f(z) - f(a)$ ,  $z \in D \setminus \{a\}$ . Entonces  $g_n \rightarrow g$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D \setminus \{a\}$ . Por el teorema anterior,  $g \equiv 0$  en  $D \setminus \{a\}$  o bien  $g$  es nunca nula en  $D \setminus \{a\}$ .

1. Si  $g \equiv 0$  en  $D \setminus \{a\}$ , entonces  $f(z) = f(a)$  si  $z \in D \setminus \{a\} \Rightarrow f(z) = f(a)$  si  $z \in D$ .  $f$  es constante, lo que contradice nuestra hipótesis.
2. Si  $g(z) \neq 0$  si  $z \in D \setminus \{a\}$ , en particular  $g(b) = f(b) - f(a) \neq 0 \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ .

$\square$

## Capítulo 4

# El teorema de Riemann de la aplicación conforme

### 4.1. Preliminares

Recordemos algunos conceptos y resultados.

**Definición 4.1.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  una función holomorfa en  $D$ .

- $g$  es una rama de  $\sqrt{f}$  en  $D$  si  $g : D \rightarrow \mathbb{C}$  es una función continua tal que  $g(z)^2 = f(z)$  para todo  $z \in D$ .
- $g$  es una rama de  $\log(f)$  en  $D$  si  $g : D \rightarrow \mathbb{C}$  es una función continua tal que  $e^{g(z)} = f(z)$  para todo  $z \in D$ .

**Proposición 4.1.** Sean  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $f$  una función holomorfa y nunca nula en  $D$ .

1. Si  $g$  es una rama de  $\sqrt{f}$  en  $D$ , entonces  $g$  es holomorfa en  $D$  y  $g'(z) = \frac{f'(z)}{2g(z)}$  para todo  $z \in D$ .
2. Si  $g$  es una rama de  $\log(f)$  en  $D$ , entonces  $g$  es holomorfa en  $D$  y  $g'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$  para todo  $z \in D$ .
3. Existe una rama de  $\log(f)$  en  $D$  si y solo si  $\frac{f'}{f}$  tiene primitiva en  $D$ .

**Proposición 4.2.** Sean  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  una función continua en  $D$ . Entonces  $f$  tiene primitiva en  $D$  si y solo si  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$  para todo camino cerrado  $\gamma$  en  $D$ .

**Definición 4.2.** Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $\Gamma$  es un ciclo en  $D$ , se dice que  $\Gamma$  es homólogo a cero módulo  $D$ , y se denota  $\Gamma \sim 0 \pmod{D}$ , si  $n(\Gamma, a) = 0$  para todo  $a \in \mathbb{C} \setminus D$ .

**Teorema 4.3** (Versión general del teorema de Cauchy). Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\Gamma$  un ciclo en  $D$ . Las dos siguientes condiciones son equivalentes:

1.  $\Gamma \sim 0 \pmod{D}$ .
2.  $\int_{\Gamma} f(z)dz = 0$  para toda función  $f$  holomorfa en  $D$ .

### 4.2. Dominios simplemente conexos

**Definición 4.3.** Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ , se dice que  $D$  es simplemente conexo si  $\mathbb{C}^* \setminus D$  es conexo.

Hay una serie de caracterizaciones para los dominios simplemente conexos, que se pueden deducir de los resultados anteriores.

**Teorema 4.4.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Las siguientes condiciones son equivalentes:

1.  $D$  es simplemente conexo.
2. Todo ciclo en  $D$  es homólogo a cero módulo  $D$ .
3. Todo camino cerrado en  $D$  es homólogo a cero módulo  $D$ .
4.  $\int_{\Gamma} f(z)dz = 0$  para toda  $f$  holomorfa en  $D$  y para todo ciclo  $\Gamma$  en  $D$ .
5.  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$  para toda  $f$  holomorfa en  $D$  y para todo camino cerrado  $\gamma$  en  $D$ .
6. Toda función holomorfa en  $D$  tiene primitiva.
7. Para toda función  $f$  holomorfa y nunca nula en  $D$ , existe una rama de  $\log(f)$  en  $D$ .
8. Para toda función  $f$  holomorfa y nunca nula en  $D$ , existe una rama de  $\sqrt{f}$  en  $D$ .

Recordamos que:

- Dos dominios  $D_1$  y  $D_2$  en  $\mathbb{C}^*$  son conformemente equivalentes si existe una aplicación conforme  $f$  de  $D_1$  sobre  $D_2$ .
- En el conjunto de los dominios en  $\mathbb{C}^*$ , el ser conformemente equivalentes es una relación de equivalencia.
- Si  $D_1$  y  $D_2$  son dos dominios en  $\mathbb{C}^*$  que son conformemente equivalentes, entonces  $D_1$  es simplemente conexo si y solo si  $D_2$  es simplemente conexo.
- $\mathbb{C}^*$ ,  $\mathbb{C}$  y el disco unidad  $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$  son tres dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}^*$ , que no son conformemente equivalentes.
- El único dominio en  $\mathbb{C}^*$  conformemente equivalente a  $\mathbb{C}^*$  es  $\mathbb{C}^*$ .

Vamos a ver que, además de  $\mathbb{C}^*$ ,  $\mathbb{C}$  y  $\mathbb{D}$ , no hay más dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}^*$  módulo la relación de equivalencia. Es decir, si  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$ , entonces  $D$  es conformemente equivalente a uno de los tres:  $\mathbb{C}^*$ ,  $\mathbb{C}$  o  $\mathbb{D}$ . Por tanto se tendrá que, si  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ , con  $D \neq \mathbb{C}$ , entonces  $D$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ .

**Definición 4.4.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}^*$ . Llamamos automorfismos de  $D$  a aquellas aplicaciones conformes de  $D$  sobre  $D$ . El conjunto de todos los automorfismos de  $D$  se denota  $\text{Aut}(D)$ , y tiene estructura de grupo con la composición.

Tenemos que

$$\begin{aligned}\text{Aut}(\mathbb{C}^*) &= \mathcal{M}, \\ \text{Aut}(\mathbb{C}) &= \{f_{\alpha,\beta} : f_{\alpha,\beta}(z) = \alpha z + \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0\} = \{T \in \mathcal{M} : T(\mathbb{C}) = \mathbb{C}\}, \\ \text{Aut}(\mathbb{D}) &= \{\lambda T_a : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}\} = \{T \in \mathcal{M} : T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}\}.\end{aligned}$$

**Ejemplo.** Veamos algunos ejemplos de dominios en  $\mathbb{C}$  para los que podemos encontrar una aplicación conforme del dominio sobre  $\mathbb{D}$ .

1. Un disco abierto,  $D(a, R)$ ,  $a \in \mathbb{C}, R > 0$ .

$$\begin{aligned}\mathbb{D} &\rightarrow D(a, R) \\ z &\mapsto a + rz\end{aligned}$$

2. Un semiplano.

$$\begin{aligned}\mathbb{D} &\rightarrow \mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 0\} \\ z &\mapsto P(z)\end{aligned}$$

donde  $P(z) = \frac{1+z}{1-z}$ , es una aplicación conforme.

Componiendo con una rotación y una traslación, vemos que  $\mathbb{D}$  es conformemente equivalente a cualquier semiplano.

$$\begin{aligned}\mathbb{D} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto a + e^{i\theta} P(z)\end{aligned}$$

con  $a \in \mathbb{C}$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ .

3. El exterior de un disco,  $\{z \in \mathbb{C} : |z - a| > R\} \cup \{\infty\}$ ,  $a \in \mathbb{C}$ ,  $R > 0$ .

$$\begin{aligned}D(a, R) &\rightarrow \{z \in \mathbb{C} : |z - a| > R\} \cup \{\infty\} \\ z &\mapsto \frac{1}{z}\end{aligned}$$

4. El plano menos una semirrecta,  $\mathbb{C} \setminus \{a + re^{i\theta}, r \geq 0\}$ ,  $a \in \mathbb{C}$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned}\mathbb{H} &\rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \\ z &\mapsto z^2\end{aligned}$$

es una aplicación conforme. Así que

$$\begin{aligned}\mathbb{H} &\rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \\ z &\mapsto P(z)^2 = \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2\end{aligned}$$

es una aplicación conforme.

Componiendo con una rotación y una traslación, vemos que  $\mathbb{D}$  es conformemente equivalente al plano menos una semirrecta cualquiera.

5. La función exponencial no es inyectiva.

$$z = x + iy_0 \mapsto e^z = e^{x+iy_0} = e^x(\cos(y_0) + i\sin(y_0)).$$

Es inyectiva en cualquier banda horizontal abierta de amplitud menor o igual que  $2\pi$ . Por ejemplo,

$$\exp : \left\{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im}(z)| < \frac{\pi}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{H}$$

es una aplicación conforme. Como  $\mathbb{H}$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ , tenemos que esta banda es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ .

Componiendo con el producto por un número real, una rotación y una traslación, vemos que  $\mathbb{D}$  es conformemente equivalente a cualquier banda.

6. Sectores.

$$\left\{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im}(z)| < \frac{\alpha}{2}\right\} \xrightarrow{\exp} S,$$

donde  $S$  es el sector de vértice 0 y amplitud  $\alpha$ , es una aplicación conforme.

7.  $\mathbb{D}^+ = \{z \in \mathbb{D} : \operatorname{Im}(z) > 0\}$ .

$$\mathbb{D}^+ \xrightarrow{P} \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0, \operatorname{Im}(z) > 0\}$$

es una aplicación conforme. El dominio  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0, \operatorname{Im}(z) > 0\}$  es un sector, así que es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ .



### 4.3. El teorema de Riemann de la aplicación conforme

**Teorema 4.5** (Teorema de Riemann de la aplicación conforme). *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$  y sea  $z_0 \in D$ . Entonces existe una única aplicación conforme  $f$  de  $D$  sobre  $\mathbb{D}$  tal que  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) > 0$ .*

*Observación.*

1. Existen infinitas aplicaciones conformes de  $D$  sobre  $\mathbb{D}$ . Basta cambiar el punto  $z_0$  o componer con una rotación.
2. Para la demostración, las condiciones
  - a)  $D$  simplemente conexo.
  - b)  $D \neq \mathbb{C}$ .

solo las vamos a utilizar para deducir que:

- $\mathbb{C} \setminus D$  tiene más de un punto.
- Si  $h$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ , existe una rama de  $\sqrt{h}$  en  $D$ .

**Teorema 4.6.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  tal que:*

1.  $\mathbb{C} \setminus D$  tiene más de un punto.
2. Para toda función  $h$  holomorfa y nunca nula en  $D$ , existe una rama de  $\sqrt{h}$  en  $D$ .

*Sea  $z_0 \in D$ . Entonces existe una única aplicación conforme  $f$  de  $D$  sobre  $\mathbb{D}$  tal que  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) > 0$ .*

*Demostración.* Sea  $\mathcal{F} = \{f : f \text{ es holomorfa e inyectiva en } D, f(D) \subset \mathbb{D}, f(z_0) = 0\}$ .

1. Veamos que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . Por (1), existen  $a, b \in \mathbb{C} \setminus D$  con  $a \neq b$ . Sea  $\varphi(z) = \frac{z-a}{z-b}$ ,  $z \in D$ .

$$\begin{vmatrix} 1 & -a \\ 1 & -b \end{vmatrix} = -b + a \neq 0 \Rightarrow \varphi \in \mathcal{M}.$$

$\varphi$  es holomorfa e inyectiva en  $D$  y  $\varphi$  es nunca nula en  $D$ , porque  $a, b \notin D$ . Por (2), existe  $\psi$  rama de  $\sqrt{\varphi}$  en  $D$ .  $\psi$  es holomorfa e inyectiva en  $D$  y  $\psi$  es nunca nula.

Además, se tiene que si  $w \in \psi(D)$ , entonces  $-w \notin \psi(D)$ . Veámoslo. Supongamos que  $w \in \psi(D)$  y  $-w \in \psi(D)$ . Entonces:

$$\begin{aligned} w &= \psi(z_1), & z_1 &\in D, \\ -w &= \psi(z_2), & z_2 &\in D. \end{aligned}$$

$$\psi(z_1)^2 = w^2 = (-w)^2 = \psi(z_2)^2 \Leftrightarrow \varphi(z_1) = \varphi(z_2) \Leftrightarrow z_1 = z_2 \Leftrightarrow w = -w \Leftrightarrow w = 0 \in \psi(D).$$

Sin embargo,  $\psi$  es nunca nula en  $D$ .

Tomamos  $w_0 \in \psi(D)$ . Como  $\psi(D)$  es abierto, existe  $r > 0$  tal que  $\overline{D}(0, r) \subset \psi(D)$ . Entonces, si  $z \in D$  se tiene que  $\psi(z) \in \psi(D)$  y por tanto  $-\psi(z) \notin \psi(D)$ , de manera que  $-\psi(z) \notin \overline{D}(w_0, r)$ . Es decir,

$$|-\psi(z) - w_0| > r \Leftrightarrow |\psi(z) + w_0| > r > 0 \Leftrightarrow \frac{r}{|\psi(z) + w_0|} < 1.$$

Sea  $h(z) = \frac{r}{\psi(z) + w_0}$ ,  $z \in D$ .  $h$  es holomorfa e inyectiva en  $D$  y  $|h(z)| < 1$  para todo  $z \in D$ , luego  $h(D) \subset \mathbb{D}$ . Consideramos la transformación de Möbius  $S_{h(z_0)}(z) = \frac{z - h(z_0)}{1 - \overline{h(z_0)}z}$ . Sabemos que  $S_{h(z_0)}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $S_{h(z_0)}(h(z_0)) = 0$ . Por tanto,  $f = S_{h(z_0)} \circ h \in \mathcal{F}$ .

2.  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada en  $D$ . Por el teorema de Montel,  $\mathcal{F}$  es finitamente normal.

3. Sea  $M = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(z_0)|$ ,  $0 \leq M \leq \infty$ . Si  $f \in \mathcal{F}$ ,  $f$  es holomorfa e inyectiva en  $D$ , por lo que  $f'(z_0) \neq 0$ . Entonces  $M \neq 0$ . Como  $\mathcal{F}' = \{f' : f \in \mathcal{F}\}$  es finitamente normal, entonces está uniformemente acotada en  $\{z_0\}$ . Entonces  $\{f'(z_0) : f \in \mathcal{F}\}$  está acotado, así que  $M = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(z_0)| < \infty$ . Por tanto,  $0 < M < \infty$ .

Tomamos una sucesión  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  en  $\mathcal{F}$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |f'_n(z_0)| = M$ . Como  $\mathcal{F}$  es finitamente normal, existe  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  subsucesión de  $\{f_n\}$  que converge a una función  $F$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Entonces  $F$  es holomorfa en  $D$  y cada  $f_{n_k}$  es holomorfa e inyectiva en  $D$ . Por el segundo teorema de Hurwitz,  $F$  es inyectiva o constante. Como  $f'_{n_k} \rightarrow F'$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ , se tiene que  $f'_{n_k}(z_0) \rightarrow F'(z_0)$ , así que  $|f'_{n_k}(z_0)| \rightarrow |F'(z_0)| = M > 0$ . Luego  $F$  no es constante. Entonces  $F$  es inyectiva. Además,  $F(z_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(z_0) = 0$  porque  $f_{n_k}(z_0) = 0$ . Si  $z \in D$ ,  $F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(z)$ , así que  $|F(z)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(z)| \leq 1$  porque  $|f_{n_k}(z)| < 1$ . Pero si  $|F(z)| = 1$  para algún  $z \in D$ , por el principio del máximo  $F$  sería constante, lo cual es imposible. Por tanto,  $|F(z)| < 1$  para todo  $z \in D$ , luego  $F(D) \subset \mathbb{D}$ . Entonces  $F \in \mathcal{F}$  y  $|F'(z_0)| = M$ .

4. Veamos que  $F(D) = \mathbb{D}$ . Supongamos por reducción al absurdo que existe  $\alpha \in \mathbb{D} \setminus F(D)$ . Consideramos  $S_\alpha(z) = \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$  transformación de Möbius con  $S_\alpha(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $S_\alpha(\alpha) = 0$ . Sea  $h = S_\alpha \circ F$ .  $h$  es holomorfa e inyectiva en  $D$ . Además,  $h$  es nunca nula en  $D$  y  $h(D) \subset \mathbb{D}$ . Por (2), existe  $g$  una rama de  $\sqrt{h}$  en  $D$ , es decir,  $g^2 = h$  en  $D$ .  $g$  es holomorfa, inyectiva y nunca nula en  $D$ , con  $g(D) \subset \mathbb{D}$ . Sea  $G = S_{g(z_0)} \circ g$ .  $G$  es holomorfa e inyectiva en  $D$ , con  $G(D) \subset \mathbb{D}$  y  $G(z_0) = 0$ . Por tanto,  $G \in \mathcal{F}$ .

Calculemos  $|G'(z_0)|$ .

$$G'(z_0) = g'(z_0)S'_{g(z_0)}(g(z_0)).$$

En primer lugar, hallamos la derivada de  $S_a$ .

$$S'_a(z) = \frac{1 - \bar{a}z + (z - a)\bar{a}}{(1 - \bar{a}z)^2} = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}.$$

Observamos que  $S'_a(a) = \frac{1}{1 - |a|^2}$  y  $S'_a(0) = 1 - |a|^2$ . Así que:

$$G'(z_0) = g'(z_0) \frac{1}{1 - |g(z_0)|^2} \Rightarrow |G'(z_0)| = \frac{|g'(z_0)|}{1 - |g(z_0)|^2}.$$

Como  $g^2 = h$  en  $D$ , también tenemos que  $2gg' = h'$  en  $D$ . Luego  $|g(z_0)|^2 = |h(z_0)|$  y también  $2|g(z_0)||g'(z_0)| = |h'(z_0)|$ . Entonces:

$$|G'(z_0)| = \frac{|h'(z_0)|}{2|g(z_0)|} \frac{1}{1 - |g(z_0)|^2} = \frac{|h'(z_0)|}{2\sqrt{|h(z_0)|}} \frac{1}{1 - |h(z_0)|}.$$

Calculamos también:

$$\begin{aligned} h'(z_0) &= F'(z_0)S'_\alpha(F(z_0)) = F'(z_0)S'_\alpha(0) = F'(z_0)(1 - |\alpha|^2), \\ h(z_0) &= S_\alpha(F(z_0)) = S_\alpha(0) = -\alpha \Rightarrow |h(z_0)| = |\alpha|. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$|G'(z_0)| = \frac{|F'(z_0)|(1 - |\alpha|^2)}{2\sqrt{|\alpha|}(1 - |\alpha|)} = M \frac{1 - |\alpha|^2}{2\sqrt{|\alpha|}(1 - |\alpha|)} = M \frac{1 + |\alpha|}{2\sqrt{|\alpha|}}.$$

Veamos que  $\frac{1 + |\alpha|}{2\sqrt{|\alpha|}} > 1$ .

$$\begin{aligned} \frac{1 + |\alpha|}{2\sqrt{|\alpha|}} > 1 &\Leftrightarrow 1 + |\alpha| > 2\sqrt{|\alpha|} \Leftrightarrow 1 + \alpha - 2\sqrt{|\alpha|} > 0 \Leftrightarrow (1 - \sqrt{|\alpha|})^2 > 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{|\alpha|} \neq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sqrt{|\alpha|} \neq 1 \Leftrightarrow |\alpha| \neq 1. \end{aligned}$$

Como  $\alpha \in \mathbb{D}$ , la desigualdad se cumple. Por tanto, tenemos que  $|G'(z_0)| > M$ , con  $G \in \mathcal{F}$  y  $M = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(z_0)|$ , luego llegamos a contradicción. Entonces,  $F(D) = \mathbb{D}$ .

5. Tenemos  $F \in \mathcal{F}$ ,  $|F'(z_0)| = M$  y  $F(D) = \mathbb{D}$ .  $F$  es una aplicación conforme de  $D$  sobre  $\mathbb{D}$  con  $F(z_0) = 0$ . Falta que  $F'(z_0) > 0$ .

Queremos encontrar  $\lambda \in \mathbb{C}$  con  $|\lambda| = 1$  tal que  $f = \lambda F$  verifique que  $f'(z_0) > 0$ .

$$f'(z_0) = \lambda F'(z_0) > 0 \Leftrightarrow f'(z_0) = |\lambda| |F'(z_0)| = |F'(z_0)| = M \Rightarrow \lambda = \frac{M}{F'(z_0)}.$$

Sea  $\lambda = \frac{M}{F'(z_0)} \in \mathbb{C}$ , con  $|\lambda| = \frac{M}{|F'(z_0)|} = 1$ ,  $F'(z_0) \neq 0$ . Sea  $f = \lambda F$ .  $f$  es holomorfa e inyectiva en  $D$ , con  $f(D) = \mathbb{D}$ ,  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) = \lambda F'(z_0) = \frac{M}{F'(z_0)} F'(z_0) = M > 0$ .

6. Veamos que esta aplicación conforme es única. Supongamos  $f_1, f_2 : D \rightarrow \mathbb{D}$  aplicación conforme, con  $f_j(z_0) = 0$ ,  $f'_j(z_0) > 0$ . Sea  $g = f_1 \circ f_2^{-1}$ .

$$g : \mathbb{D} \xrightarrow{f_2^{-1}} D \xrightarrow{f_1} \mathbb{D}.$$

$g$  es una aplicación conforme de  $\mathbb{D}$  sobre  $\mathbb{D}$ , así que es de la forma

$$g(z) = \lambda T_a(z) = \lambda \frac{z+a}{1+\bar{a}z}, \quad \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1, a \in \mathbb{D}.$$

Como  $g(0) = 0$ ,

$$g(0) = \lambda a = 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow g(z) = \lambda z$$

Como  $g \circ f_2 = f_1$  en  $D$ ,

$$f'_2(z_0)g'(f_2(z_0)) = f'_1(z_0) \Leftrightarrow f'_2(z_0)g'(0) = f'_1(z_0) \Leftrightarrow g'(0) = \frac{f'_1(z_0)}{f'_2(z_0)} > 0.$$

Como  $g'(0) = \lambda > 0$  y  $|\lambda| = 1$ , entonces  $\lambda = 1$ . Por tanto,  $g(z) = z \Leftrightarrow f_1 = f_2$ .

□

## Otros enunciados equivalentes

**Teorema 4.7** (Teorema de Riemann). *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$  y sea  $z_0 \in D$ . Entonces existe una única aplicación conforme de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$  tal que  $f(0) = z_0$  y  $f'(0) > 0$ .*

**Teorema 4.8** (Teorema de Riemann: enunciado equivalente). *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$  y sea  $z_0 \in D$ . Entonces existe un único  $R > 0$  tal que existe una aplicación conforme  $f$  de  $D$  sobre  $D(0, R)$  con  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) = 1$ . Además, esta  $f$  es única.*

A este número  $R$  se le denomina radio conforme interior a  $D$  en  $z_0$  y se denota  $r(D, z_0)$ .

*Demostración.* Este enunciado es equivalente al teorema de Riemann. Si  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$  y  $z_0 \in D$ .

1. Si  $f : D \rightarrow \mathbb{D}$  aplicación conforme,  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) > 0$ , entonces si  $R = \frac{1}{f'(z_0)} > 0$  se tiene que  $g = Rf : D \rightarrow D(0, R)$  es una aplicación conforme con  $g(z_0) = 0$  y  $g'(z_0) = 1$ .
2. Si  $R > 0$ ,  $g : D \rightarrow D(0, R)$  es una aplicación conforme con  $g(z_0) = 0$  y  $g'(z_0) = 1$ , entonces  $f = \frac{1}{R}g : D \rightarrow \mathbb{D}$  es una aplicación conforme con  $f(z_0) = 0$  y  $f'(z_0) = \frac{1}{R}g'(z_0) = \frac{1}{R} > 0$ .

□

*Observación.* Hemos visto que cualquier dominio  $D$  simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ . Entonces, si  $D_1$  y  $D_2$  son dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}$  con  $D_1, D_2 \neq \mathbb{C}$ ,  $D_1$  y  $D_2$  son conformemente equivalentes.

## 4.4. Clasificación de los dominios simplemente conexos

En  $\mathbb{C}^*$  tenemos el siguiente resultado.

**Teorema 4.9.** *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$  tal que  $\mathbb{C}^* \setminus D$  tiene más de un punto. Entonces  $D$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ .*

*Demostración.*

- Si  $D \subset \mathbb{C}$ , entonces  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$ , ya que  $\mathbb{C}^* \setminus D$  tiene más de un punto. Entonces  $D$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ .
- Si  $\infty \in D$ , entonces tomamos  $a, b \in \mathbb{C}^* \setminus D$  con  $a \neq b$ . Entonces  $a, b \in \mathbb{C} \setminus D$ . Sea  $T(z) = \frac{1}{z-a}$ ,  $z \in \mathbb{C} \setminus \{a\}$ , con  $T(a) = \infty$  y  $T(\infty) = 0$ .  $T : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  es una aplicación conforme. Entonces  $D \xrightarrow{T} T(D) = D'$  es una aplicación conforme y  $D'$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$ .

Como  $a, b \notin D$ ,  $T(a) = \infty \notin D'$ , así que  $D'$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ . Además,  $T(b) \notin D'$  con  $T(b) \in \mathbb{C}$ , luego  $D' \neq \mathbb{C}$ .  $D'$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ , con  $D' \neq \mathbb{C}$ . Por tanto,  $D'$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ . Como  $D'$  es conformemente equivalente a  $D$ , entonces  $D$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ . □

Ya tenemos clasificados los dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}^*$  módulo la relación de equivalencia ser conformemente equivalentes.

Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}^*$ .

1. Si  $\mathbb{C}^* \setminus D = \emptyset$ , entonces  $D = \mathbb{C}^*$ , que es el único dominio conformemente equivalente a  $\mathbb{C}^*$ .
2. Si  $\mathbb{C}^* \setminus D$  se reduce a un punto, entonces  $D = \mathbb{C}$  o bien  $D = \mathbb{C}^* \setminus \{\alpha\}$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Estos son los dominios en  $\mathbb{C}^*$  que son conformemente equivalentes a  $\mathbb{C}$ .
3. Si  $\mathbb{C}^* \setminus D$  tiene más de un punto, entonces  $D$  es conformemente equivalente al disco unidad  $\mathbb{D}$ .

**Teorema 4.10.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Son equivalentes:*

1.  $D$  es simplemente conexo.
2. Para toda función  $f$  holomorfa y nunca nula en  $D$ , existe una rama de  $\sqrt{f}$  en  $D$ .

*Demostración.*

$\Rightarrow$  Lo sabemos.

$\Leftarrow$  Hay tres posibilidades.

1.  $D = \mathbb{C}$ . Entonces  $D$  es simplemente conexo.
2.  $\mathbb{C} \setminus D$  se reduce a un punto. Entonces  $\mathbb{C} \setminus D = \{a\}$ ,  $a \in \mathbb{C}$ . Queremos llegar a contradicción, ya que  $D$  no es simplemente conexo.

Sea  $f(z) = \frac{1}{z-a}$ ,  $z \in D$ .  $f$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ . Sea  $g$  una rama de  $\sqrt{f}$  en  $D$ . Entonces  $g$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ , y  $g^2 = f$  en  $D$ .

Sea  $R > 0$  y sea  $\gamma$  la circunferencia  $|z-a| = R$ . Sea  $\Gamma$  la curva imagen de  $\gamma$  por  $g$ . Entonces  $\Gamma$  es un camino cerrado que no pasa por 0. Unas parametrizaciones de  $\gamma$  y  $\Gamma$  son:

$$\begin{array}{ll} \gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C} & \Gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C} \\ t \mapsto a + Re^{it} & t \mapsto g(a + Re^{it}) \end{array}$$

Entonces:

$$n(\Gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dw}{w} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{\Gamma'(t)}{\Gamma(t)} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{g'(a + Re^{it})Re^{it}}{g(a + Re^{it})} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

Como  $g^2 = f$ , entonces además  $2gg' = f'$ . Luego:

$$\frac{2gg'}{g^2} = \frac{f'}{g^2} \Leftrightarrow \frac{g'}{g} = \frac{1}{2} \frac{f'}{f}.$$

Como  $f'(z) = -\frac{1}{(z-a)^2}$ ,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{z-a}{(z-a)^2} = -\frac{1}{z-a}.$$

Por tanto:

$$n(\Gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{2} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = -\frac{1}{2} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = -\frac{1}{2} n(\gamma, a) = -\frac{1}{2}.$$

Luego  $n(\Gamma, 0) = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ . Esto es imposible.

3.  $\mathbb{C} \setminus D$  tiene más de un punto. Por el teorema que probamos para la demostración del teorema de Riemann, tenemos que  $D$  es conformemente equivalente a  $\mathbb{D}$ . Por tanto  $D$  es simplemente conexo.

□

## 4.5. El teorema de extensión de Carathéodory

Recordemos que  $\mathbb{C}$  y  $\mathbb{D}$  son homeomorfos, aunque no conformemente equivalentes.

**Corolario 4.11.** Si  $D_1$  y  $D_2$  son dominios simplemente conexos en  $\mathbb{C}$ , entonces  $D_1$  y  $D_2$  son homeomorfos.

*Demostración.*

- Si  $D_1 = D_2 = \mathbb{C}$ , son iguales.
- Si  $D_1 = \mathbb{C}$ ,  $D_2 \neq \mathbb{C}$ , entonces por el teorema de Riemann  $D_2$  es conformemente equivalente y por tanto homeomorfo a  $\mathbb{D}$ . Además,  $D_1 = \mathbb{C}$  es homeomorfo a  $\mathbb{D}$ . Entonces  $D_1$  y  $D_2$  son homeomorfos.
- Si  $D_1, D_2 \neq \mathbb{C}$ , entonces  $D_1$  y  $D_2$  son conformemente equivalentes y por tanto homeomorfos a  $\mathbb{D}$ . Entonces  $D_1$  y  $D_2$  son homeomorfos.

□

Si  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$ , por el teorema de Riemann existe una aplicación conforme  $f$  de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$ .

*Notación.* Si  $D \subset \mathbb{C}$ , denotamos  $\partial_{\infty} D$  a la frontera de  $D$  como subconjunto de  $\mathbb{C}^*$ . Es decir,

- Si  $D$  es acotado,  $\partial_{\infty} D = \partial D$ .
- Si  $D$  no es acotado,  $\partial_{\infty} D = \partial D \cup \{\infty\}$ .

**Proposición 4.12.** Sean  $D_1$  y  $D_2$  dos dominios en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  un homeomorfismo de  $D_1$  sobre  $D_2$ . Sea  $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión en  $D_1$  y supongamos que existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \xi \in \partial_{\infty} D_1$ . Entonces todos los puntos de acumulación de la sucesión  $\{f(z_n)\}$  están en  $\partial_{\infty} D_2$ .

*Demostración.* Supongamos por reducción al absurdo que existe un punto de acumulación de  $\{f(z_n)\}$  que está en  $\mathbb{C}^* \setminus \partial_\infty D_2$ . Le llamamos  $w_0$ . Existe  $\{z_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  subsucesión de  $\{z_n\}$  tal que  $f(z_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} w_0 \in D_2$ .  $f^{-1}$  es continua en  $w_0$ . Además,

$$f^{-1}(f(z_{n_k})) \rightarrow f^{-1}(w_0) \in D_1.$$

Sin embargo,  $f^{-1}(f(z_{n_k})) = z_{n_k}$  y  $z_{n_k} \rightarrow \xi \in \partial_\infty D_1$ .  $\square$

**Proposición 4.13.** Sean  $D_1$  y  $D_2$  dos dominios en  $\mathbb{C}$  y  $f$  un homeomorfismo de  $D_1$  sobre  $D_2$ . Supongamos que  $f$  se extiende de forma continua a  $\overline{D_1}$  y le llamamos  $f$  a la extensión  $f : \overline{D_1} \rightarrow \mathbb{C}^*$ . Entonces  $f(\overline{D_1}) = \overline{D_2}$ ,  $f(D_1) = D_2$  y  $f(\partial_\infty D_1) = \partial_\infty D_2$ .

*Demostración.* Sea  $\xi \in \partial_\infty D_1$ . Existe una sucesión  $\{z_n\}_{n=1}^\infty$  en  $D_1$  con  $z_n \rightarrow \xi$ , y podemos tomar todos los  $z_n$  distintos. Como  $f$  es continua en  $\xi$ , tenemos que  $f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\xi) \in \mathbb{C}^*$ . Como todos los  $f(z_n)$  son distintos,  $f(\xi)$  es un punto de acumulación de  $\{f(z_n)\}$ .

Por la proposición anterior,  $f(\xi) \in \partial_\infty D_2$ . Por tanto,  $f(\partial_\infty D_1) \subset \partial_\infty D_2$ . Además, sabemos que  $f(D_1) = D_2$ . Entonces  $f(\overline{D_1}) \subset \overline{D_2}$ . Ahora tenemos que

$$D_2 = f(D_1) \subset f(\overline{D_1}) \subset \overline{D_2}.$$

$\overline{D_1}$  es cerrado en  $\mathbb{C}^*$  y compacto. Como  $f : \overline{D_1} \rightarrow \mathbb{C}^*$  es continua, entonces  $f(\overline{D_1})$  es compacto y por tanto cerrado.

$$D_2 \subset f(\overline{D_1}) \subset \overline{D_2} \Rightarrow f(\overline{D_1}) = \overline{D_2}.$$

Entonces también tenemos que  $f(\partial_\infty D_1) = \partial_\infty D_2$ .  $\square$

*Observación.*

1.  $f(\partial_\infty D_1) = \partial_\infty D_2$  pero no tiene por qué ser inyectiva. Lo mismo para  $f(\overline{D_1}) = \overline{D_2}$ .
2. Puede ocurrir que la extensión  $f$  no exista. Por ejemplo.

$$D = \{z = x + iy : 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \setminus \bigcup_{i=1}^\infty \left\{ \frac{1}{2^n} + iy : 0 < y \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

$D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ . Entonces existe  $f : \mathbb{D} \rightarrow D$  aplicación conforme. Supongamos que  $f$  se extiende de manera continua  $f : \mathbb{D} \rightarrow \overline{D}$  continua, con  $f(\partial \mathbb{D}) = \partial D$  y  $f(\mathbb{D}) = D$ . Como  $0 \in \partial D$ , entonces  $0 = f(\xi)$  con  $\xi \in \partial \mathbb{D}$ . Sea  $\gamma$  el segmento  $[0, \xi]$ . Sea  $\Gamma$  la curva imagen de  $\gamma$  por  $f$ . Unas parametrizaciones son:

$$\begin{array}{ll} \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} & \Gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \\ t \mapsto t\xi & t \mapsto f(t\xi) \end{array}$$

$\Gamma$  tiene origen en  $f(0) \in D$  y extremo 0. El soporte de  $\gamma$  está en  $D$  salvo por el extremo.

Una curva de Jordan es una curva en  $\mathbb{C}$  que tiene alguna parametrización  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  inyectiva en  $[a, b]$  con  $\gamma(a) = \gamma(b)$ . Si esto ocurre para una parametrización, entonces pasa para todas.

Si  $J$  es el soporte de una curva de Jordan en  $\mathbb{C}$ , entonces  $\mathbb{C} \setminus J$  tiene dos componentes conexas.

- $I(J)$  es la componente acotada y se le llama dominio interior a  $J$ .
- $E(J)$  es la componente no acotada y se le llama dominio exterior a  $J$ .

Además,  $J$  es la frontera de ambas. Observamos que  $I(J)$  y  $E(J)$  son dominios en  $\mathbb{C}$ . Como  $\mathbb{C} \setminus J$  es abierto, sus componentes conexas son abiertas.

Además,  $I(J)$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ .

$$\begin{aligned}\mathbb{C}^* \setminus I(J) &= J \cup E(J) \cup \{\infty\}, \\ \partial_\infty E(J) &= \partial E(J) \cup \{\infty\} = J \cup \{\infty\}.\end{aligned}$$

Observamos que  $\mathbb{C}^* \setminus I(J)$  es la clausura en  $\mathbb{C}^*$  de  $E(J)$ . Como  $E(J)$  es conexo,  $\mathbb{C}^* \setminus I(J)$  también lo es. Luego  $I(J)$  es simplemente conexo. Observamos además que  $I(J) \cup J$  es compacto.

Sea  $D = I(J)$ ,  $D$  es un dominio simplemente conexo con  $D \neq \mathbb{C}$ . Por el teorema de Riemann, existe una aplicación conforme  $f$  de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$ .

**Teorema 4.14** (Teorema de extensión de Carathéodory). *Sea  $J$  una curva de Jordan en  $\mathbb{C}$  y sea  $D$  el dominio interior a  $J$ . Sea  $f$  una aplicación conforme de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$ . Entonces  $f$  se extiende de forma continua a  $\overline{\mathbb{D}}$ , y esta extensión es un homeomorfismo de  $\overline{\mathbb{D}}$  sobre  $\overline{D} = I(J) \cup J$ .*

*Observación.* Como consecuencia, la extensión también es un homeomorfismo de  $\partial\mathbb{D}$  sobre  $\partial D = J$ .

## Capítulo 5

# Funciones armónicas

### 5.1. Funciones armónicas y funciones holomorfas

**Definición 5.1.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{R}^n$  y sea  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Decimos que  $f$  es armónica en  $D$  si  $f \in \mathcal{C}^2(D)$  y

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0.$$

**Definición 5.2.** Dado  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $u \in \mathcal{C}^2(D)$ . El laplaciano de  $u$  se define como:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

**Definición 5.3.** Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{D}$  y sea  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $u \in \mathcal{C}^2(D)$ . Diremos que  $u$  es armónica en  $D$  si  $\Delta u = 0$ .

**Ejemplo.**

- Las funciones constantes.  $u(z) = a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , es armónica en  $\mathbb{C}$ .
- La función parte real es armónica en  $\mathbb{C}$ .

$$\operatorname{Re} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z \mapsto \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$(x, y) \mapsto x$$

- La función parte imaginaria es armónica en  $\mathbb{C}$ .

$$\operatorname{Im} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z \mapsto \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$(x, y) \mapsto y$$

- Si  $D$  es un abierto en  $\mathbb{C}$  y  $u$  y  $v$  son armónicas en  $D$ , entonces  $u + v$  es armónica en  $D$ .
- Si  $D$  es un abierto en  $\mathbb{C}$ ,  $u$  es armónica en  $D$  y  $c \in \mathbb{R}$ , entonces  $cu$  es armónica en  $D$ .

**Teorema 5.1.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  una función holomorfa en  $D$ . Entonces  $\operatorname{Re}(f)$  e  $\operatorname{Im}(f)$  son armónicas en  $D$ .



*Demostración.* Sean  $u = \operatorname{Re}(f)$  y  $v = \operatorname{Im}(f)$ ,  $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $u, v \in \mathcal{C}^\infty(D) \subset \mathcal{C}^2(D)$ . Se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x. \end{cases}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \Delta u &= u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0, \\ \Delta v &= v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0. \end{aligned}$$

□

El recíproco no es cierto. Es decir, dado  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$ ,  $u$  y  $v$  armónicas en  $D$  y  $f = u + iv : D \rightarrow \mathbb{C}$ , no se cumple en general que  $f$  sea holomorfa en  $D$ .

**Ejemplo** (Contraejemplo). Sea  $D = \mathbb{C}$  y sean  $u(z) = \operatorname{Re}(z)$  y  $v(z) = \operatorname{Im}(z)$ .  $u$  y  $v$  son armónicas en  $\mathbb{C}$ . Sin embargo,  $f(z) = u(z) + iv(z) = \bar{z}$  no es holomorfa.

**Definición 5.4.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Diremos que  $v : D \rightarrow \mathbb{R}$  es una conjugada armónica de  $u$  en  $D$  si la función  $f = u + iv$  es holomorfa en  $D$ .

**Propiedades.**

- Si existe una conjugada armónica de  $u$  en  $D$ , entonces es una función armónica en  $D$ .
- Si  $v$  es una conjugada armónica de  $u$  en  $D$ , entonces  $v + c$  es conjugada armónica de  $u$  en  $D$  para todo  $c \in \mathbb{R}$ .
- Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ ,  $u$  es armónica en  $D$  y  $v_1, v_2$  son conjugadas armónicas de  $u$  en  $\mathbb{C}$ , entonces existe  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $v_1 - v_2 = c$ .

*Demostración.*  $f_1 = u + iv_1$  y  $f_2 = u + iv_2$  son holomorfas en  $D$ , así que  $f_2 - f_1 = i(v_2 - v_1)$  es holomorfa en  $D$ . Como  $\operatorname{Re}(f_2 - f_1) = 0$  en  $D$  con  $D$  dominio, entonces  $f_2 - f_1$  es constante. Es decir, existe  $c \in \mathbb{R}$  con  $f_2 - f_1 = ic$ . Por tanto:

$$i(v_2 - v_1) = ic \Rightarrow v_2 - v_1 = c.$$

□

No tiene por qué existir la conjugada armónica.

**Ejemplo** (Contraejemplo). Sea  $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u(z) = \operatorname{Log}|z|$ . Si escribimos  $z = x + iy$ ,

$$u(z) = \operatorname{Log}(x^2 + y^2)^{1/2} = \frac{1}{2} \operatorname{Log}(x^2 + y^2).$$

Calculamos sus derivadas parciales:

$$\begin{aligned} u_x(z) &= \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}, & u_y(z) &= \frac{y}{x^2 + y^2}, \\ u_{xx}(z) &= \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & u_{yy}(z) &= \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

$\Delta u = 0$ , así que  $u$  es armónica en  $D$ .

Supongamos que  $v$  es una conjugada armónica de  $u$  en  $D$ . Entonces  $v : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f = u + iv$  holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Consideramos:

$$\begin{aligned} g &= \operatorname{Log} : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto \operatorname{Log}(z) = \log|z| + i\operatorname{Arg}(z) \end{aligned}$$

$f$  y  $g$  son holomorfas en  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ , luego  $f - g$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ . Como  $\operatorname{Re}(f - g) = 0$ , entonces  $f - g = ic$ , con  $c \in \mathbb{R}$ . Así que  $g = f - ic$ . Sin embargo,  $g$  no se extiende de forma continua a  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Esto es una contradicción.

Hemos probado que la función  $u(z) = \operatorname{Log}|z|$  es armónica en  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

**Lema 5.2.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $f$  una función holomorfa y nunca nula en  $D$ . Entonces la función  $u = \operatorname{Log}|f|$  es armónica en  $D$ .

*Demostración.* Sean  $z_0 \in D$  y  $R > 0$  tales que  $D(z_0, R) \subset D$ . Como  $D(z_0, R)$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ , existe  $g$  una rama de  $\log(f)$  en  $D(z_0, R)$ .  $g$  es holomorfa en  $D(z_0, R)$ , con

$$\operatorname{Re}(g(z)) = \operatorname{Log}|f(z)|, \quad z \in D(z_0, R).$$

$\operatorname{Re}(g) = \operatorname{Log}|f|$  es armónica en  $D(z_0, R)$ . □

**Proposición 5.3.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Entonces la función  $u_x - iu_y$  es holomorfa en  $D$ .

**Corolario 5.4.** Sea  $D$  abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Entonces  $u \in \mathcal{C}^\infty(D)$ .

*Demostración.* Sea  $u$  armónica en  $D$ . Entonces  $f = u_x - iu_y$  es holomorfa en  $D$ . Así que  $u_x, u_y \in \mathcal{C}^\infty(D)$ . Como además  $u \in \mathcal{C}^2(D)$ , entonces  $u \in \mathcal{C}^\infty(D)$ . □

**Proposición 5.5.** Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Entonces existe  $F$  holomorfa en  $D$  tal que  $\operatorname{Re}(F) = u$  en  $D$ . Además, esta  $F$  es única salvo adición de constantes imaginarias.

*Demostración.* Sea  $f = u_x - iu_y$ , que es holomorfa en  $D$ . Como  $D$  es simplemente conexo, existe  $g$  primitiva de  $f$  en  $D$ .  $g$  es holomorfa en  $D$  y  $g' = f$  en  $D$ . Escribimos  $g = U + iV$ , con  $U = \operatorname{Re}(f)$  y  $V = \operatorname{Im}(f)$ . Como  $g$  es holomorfa,  $U_x = V_y$  y  $U_y = -V_x$ . Además,  $g' = U_x + iV_x = u_x - iu_y$ , así que  $U_x = u_x$  y  $V_x = -u_y$ .

Sea  $F = u + iV$ ,  $F : D \rightarrow \mathbb{C}$ , con  $u \in \mathcal{C}^2(D)$ .  $V$  es armónica en  $D$ ,  $V \in \mathcal{C}^\infty(D)$ .  $F$  es diferenciable en sentido real. Además,

$$\begin{cases} u_x = U_x = V_y, \\ u_y = -V_x. \end{cases}$$

Luego  $F$  es holomorfa en  $D$ , con  $\operatorname{Re}(F) = u$  en  $D$ .

Veamos que  $F$  es única salvo adición de constantes imaginarias.

- Si  $c \in \mathbb{R}$ , está claro que si  $G = F + ic$ , entonces  $G$  es holomorfa en  $D$  y  $\operatorname{Re}(G) = u$  en  $D$ .
- Si  $G$  es holomorfa en  $D$  y  $\operatorname{Re}(G) = u$  en  $D$ . Entonces  $F - G$  es holomorfa y  $\operatorname{Re}(F - G) = 0$  en  $D$ . Por tanto  $F - G$  es constante, así que existe  $c \in \mathbb{R}$  con  $F - G = ic \Leftrightarrow G = F - ic$ . □

**Corolario 5.6.** Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Si  $z_0 \in D$  y  $R > 0$  con  $D(z_0, R) \subset D$ , entonces existe  $F$  holomorfa en  $D(z_0, R)$  tal que  $\operatorname{Re}(F) = u$  en  $D(z_0, R)$ .

Toda función armónica, localmente, es la parte real de una función holomorfa.

**Teorema 5.7.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Son equivalentes:

1.  $D$  es simplemente conexo.
2. Toda función armónica tiene conjugada armónica.

*Demostración.*

$\Rightarrow$  Lo sabemos.

$\Leftarrow$  Sea  $f$  holomorfa y nunca nula en  $D$ . Veamos que existe un rama de  $\log(f)$  en  $D$ . Sea  $u = \text{Log}|f|$ , que es una función armónica en  $D$ . Sea  $v$  una conjugada armónica de  $u$  en  $D$ . Entonces  $F = u + iv$  es holomorfa en  $D$ . Sea  $h = fe^{-F}$  holomorfa en  $D$ . Como  $|e^F| = |e^{u+iv}| = e^u = e^{\text{Log}|f|} = |f|$ , entonces

$$|h| = \frac{|f|}{|e^F|} = 1.$$

Entonces  $h$  es constante. Es decir, existe  $\xi = e^{ic}$  con  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $h(z) = \xi$  para todo  $z \in D$ .

$$h = \frac{f}{e^F} \Rightarrow f = \xi e^F = e^{ic} e^F = e^{F+ic}.$$

La función  $F + ic$  es una rama de  $\log(f)$  en  $D$ .

Toda función holomorfa y nunca nula en  $D$  tiene una rama del logaritmo. Luego  $D$  es simplemente conexo. □

**Teorema 5.8** (Propiedad del valor medio). *Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Sea  $z_0 \in D$  y  $R > 0$  con  $D(z_0, R) \subset D$ . Entonces:*

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it}) dt, \quad 0 \leq r < R.$$

*Demostración.* Si  $r = 0$  es trivial. Supongamos  $0 < r < R$ . Existe  $F$  holomorfa en  $D(z_0, R)$  con  $\text{Re}(F) = u$  en  $D(z_0, R)$ . Por la fórmula de Cauchy,

$$F(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{F(z)}{z-z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{F(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} rie^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z_0 + re^{it}) dt.$$

Tomando parte real,

$$u(z_0) = \text{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z_0 + re^{it}) dt \right) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Re}(F(z_0 + re^{it})) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + Re^{it}) dt.$$

□

**Teorema 5.9** (Forma débil del principio del máximo para funciones armónicas). *Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Si  $u$  tiene un máximo local en un punto  $z_0 \in D$ , entonces existe  $r > 0$  con  $D(z_0, r) \subset D$  tal que  $u$  es constante en  $D(z_0, r)$ .*

*Demostración.* Sea  $r > 0$  con  $D(z_0, r) \subset D$ . Existe  $F$  holomorfa en  $D(z_0, r)$  tal que  $\text{Re}(F) = u$  en  $D(z_0, r)$ . Sea  $f = e^F$ , que es holomorfa en  $D(z_0, r)$ . En  $D(z_0, r)$  tenemos que:

$$|f| = |e^F| = e^{\text{Re}(F)} = e^u.$$

Existe  $r_1$  con  $0 < r_1 < r$ , tal que  $u(z) \leq u(z_0)$  si  $z \in D(z_0, r_1)$ . Entonces

$$|e^{F(z)}| = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |e^{F(z_0)}|.$$

$|e^F|$  tiene un máximo local en  $z_0$ . Por el principio del máximo, tenemos que  $e^F$  es constante en  $D(z_0, r)$ . Entonces  $|e^F| = e^u$  es constante, así que  $u$  es constante en  $D(z_0, r)$ . □

Sea  $D$  dominio en  $\mathbb{C}$ , sean  $u, v$  armónicas en  $D$  y sea  $A \subset D$ ,  $A$  con puntos de acumulación en  $D$ .  $u = v$  en  $A$  no implica en general que  $u = v$  en  $D$ .

**Ejemplo** (Contraejemplo). Sea  $D = \mathbb{C}$  y sean  $u(z) = \operatorname{Re}(z)$  y  $v(z) = 0$  armónicas.  $u = v$  en el eje imaginario, que tiene puntos de acumulación en  $\mathbb{C}$ , pero  $u \neq v$  en  $\mathbb{C}$ .

*Observación.* Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Si existen  $u_x$  y  $u_y$  en  $D$  y  $u_x = u_y = 0$  en  $D$ , entonces  $u$  es constante en  $D$ .

**Teorema 5.10** (Teorema de identidad para funciones armónicas). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Si existe  $G \subset D$ ,  $G$  abierto y no vacío tal que  $u = 0$  en  $G$ , entonces  $u = 0$  en  $D$ .*

*Demostración.* Sea  $f = u_x - iu_y$  holomorfa en  $D$ . Como  $u = 0$  en  $G$ , tenemos que  $u_x = u_y = 0$  en  $G$ . Entonces  $f = 0$  en  $G$ . Por el teorema de identidad,  $f = 0$  en  $D$ . Entonces  $u_x = u_y = 0$  en  $D$ , luego  $u$  es constante en  $D$ . Como  $u = 0$  en  $G$ , entonces  $u = 0$  en  $D$ .  $\square$

**Corolario 5.11.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $u$  y  $v$  armónicas en  $D$ . Si existe  $G \subset D$ ,  $G$  abierto y no vacío tal que  $u = v$  en  $G$ , entonces  $u = v$  en  $D$ .*

**Teorema 5.12** (Principio del máximo para funciones armónicas: primera versión). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Si  $u$  tiene un máximo local en un punto  $z_0 \in D$ , entonces  $u$  es constante en  $D$ .*

*Demostración.* Existe  $R > 0$  con  $D(z_0, R) \subset D$  tal que  $u$  es constante en  $D(z_0, R)$ . Es decir,  $u(z) = c$ ,  $z \in D(z_0, R)$ ,  $c \in \mathbb{R}$ . Sea  $v(z) = c$ ,  $z \in D$ .  $u$  y  $v$  son armónicas en  $D$  y  $u = v$  en  $D(z_0, R)$ . Entonces  $u = v$  en  $D$ , es decir,  $u(z) = c$  para todo  $z \in D$ .  $\square$

*Notación.* Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ ,  $\overline{D}$  denotará la clausura de  $D$  como subconjunto de  $\mathbb{C}^*$ .

- Si  $D$  es acotado, entonces  $\partial_\infty D = \partial D$ .

$$\overline{D} = D \cup \partial_\infty D = D \cup \partial D.$$

- Si  $D$  no es acotado, entonces  $\partial_\infty D = \partial D \cup \{\infty\}$ .

$$\overline{D} = D \cup \partial_\infty D = D \cup \partial D \cup \{\infty\}.$$

**Teorema 5.13** (Principio del máximo para funciones armónicas: segunda versión). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ . Si existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que*

$$\limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) \leq M, \quad \forall \xi \in \partial_\infty D,$$

*entonces  $u(z) \leq M$  para todo  $z \in D$ . Además, si  $u(z_0) = M$  para algún  $z_0 \in D$ , entonces  $u$  es constante en  $D$ .*

*Demostración.* Sea  $K = \sup_{z \in D} u(z) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Hay que probar que  $K \leq M$ . Existe  $\{z_n\}_{n=1}^\infty$  en  $D$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} u(z_n) = K$ . Podemos suponer, pasando si es necesario a una subsucesión, que existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z^* \in \mathbb{C}^*$ . Entonces  $z^* \in \overline{D} = D \cup \partial_\infty D$ .

- Si  $z^* \in \partial_\infty D$ , entonces

$$K \leq \limsup_{z \rightarrow z^*, z \in D} u(z) \leq M.$$

- Si  $z^* \in D$ , como  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z^*$ , se tiene que  $\lim_{n \rightarrow \infty} u(z_n) = u(z^*) = K$ . Luego

$$u(z) \leq u(z^*) \quad \forall z \in D.$$

Por la primera versión del principio del máximo,  $u$  es constante en  $D$ , es decir,  $u(z) = K$  para todo  $z \in D$ . Aplicando la hipótesis a un punto  $\xi$  cualquiera de  $\partial_\infty D$ , vemos que  $K \leq M$ . Observamos que  $\partial_\infty D \neq \emptyset$ . Si  $\partial_\infty D = \emptyset$ , entonces  $\overline{D} = D$ , luego  $D$  sería abierto y cerrado en  $\mathbb{C}^*$ . Por tanto,  $D = \emptyset$  o  $D = \mathbb{C}^*$ , lo que es imposible.

□

**Teorema 5.14** (Principio del mínimo para funciones armónicas). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  armónica en  $D$ .*

1. *Si  $u$  tiene un mínimo local en un punto  $z_0 \in D$ , entonces  $u$  es constante en  $D$ .*

2. *Si existe  $m \in \mathbb{R}$  tal que*

$$\liminf_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) \geq m, \quad \forall \xi \in \partial_{\text{int}} D,$$

*entonces  $u(z) \geq m$  para todo  $z \in D$ . Además, si  $u(z_0) = m$  para algún  $z_0 \in D$ , entonces  $u$  es constante en  $D$ .*

**Corolario 5.15.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $D$  y continua en  $\bar{D}$ . Entonces:*

$$\begin{aligned} \max_{z \in \bar{D}} u(z) &= \max_{z \in \partial_{\infty} D} u(z), \\ \min_{z \in \bar{D}} u(z) &= \min_{z \in \partial_{\infty} D} u(z). \end{aligned}$$

**Corolario 5.16.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $D$  y continua en  $\bar{D}$ . Si  $u = 0$  en  $\partial_{\infty} D$ , entonces  $u = 0$  en  $D$ .*

**Corolario 5.17.** *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sean  $u, v : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónicas en  $D$  y continuas en  $\bar{D}$ . Si  $u = v$  en  $\partial_{\infty} D$ , entonces  $u = v$  en  $D$ .*

*Observación.* Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $D$  y continua en  $\bar{D}$ . Entonces los valores de  $u$  en  $D$  están completamente determinados por los valores de  $u$  en  $\partial_{\infty} D$ .

## 5.2. El problema de Dirichlet para el disco unidad

Esto da lugar a la siguiente cuestión. Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $f : \partial_{\infty} D \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Queremos estudiar si existe  $u : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $D$  y continua en  $\bar{D}$  tal que  $u = f$  en  $\partial_{\infty} D$ . Esto es el problema de Dirichlet en  $D$  con valores frontera  $f$ . Si existe una solución del problema de Dirichlet en  $D$  con valores frontera  $f$ , esta es única.

Si  $D$  es un dominio en  $\mathbb{C}$ , se dice que  $D$  es regular para el problema de Dirichlet si para toda  $f : \partial_{\infty} D \rightarrow \mathbb{R}$  continua existe la solución del problema de Dirichlet con valores frontera  $f$ . Queremos resolver el problema de Dirichlet en el disco unidad.

Sea  $u : \bar{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $\mathbb{D}$  y continua en  $\bar{\mathbb{D}}$ . Vamos a expresar  $u(z)$  para  $z \in \mathbb{D}$  en función de  $u(\xi)$ , con  $\xi \in \partial\mathbb{D}$ . Por la propiedad del valor medio, si  $0 < r < 1$ ,

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(re^{it}) dt.$$

Si consideramos las funciones

$$u_r(t) = u(re^{it}), \quad t \in [-\pi, \pi],$$

vemos que  $u_r \xrightarrow[r \rightarrow 1^-]{} u_1$  uniformemente porque  $u$  es uniformemente continua en  $\bar{\mathbb{D}}$ . Así que:

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_r(t) dt \xrightarrow[r \rightarrow 1^-]{} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_1(t) dt \Rightarrow u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) dt.$$

**Lema 5.18.** *Sean  $G_1$  y  $G_2$  dos abiertos en  $\mathbb{C}$ , sea  $f$  holomorfa en  $G_1$  con  $f(G_1) \subset G_2$  y sea  $u$  armónica en  $G_2$ . Entonces  $u \circ f$  es armónica en  $G_1$ .*

*Demostración.*  $u \circ f \in \mathcal{C}^2(G_1)$ . Se puede comprobar que  $\Delta(u \circ f) = 0$ . De otra manera, sea  $z_0 \in G_1$ , entonces  $f(z_0) \in G_2$ . Tomamos  $R > 0$  con  $D(f(z_0), R) \subset G_2$ . Como  $f$  es continua en  $z_0$ , existe  $\delta > 0$  tal que  $D(z_0, \delta) \subset G_1$  y  $f(D(z_0, \delta)) \subset D(f(z_0), R)$ .

Como  $u$  es armónica en  $D(f(z_0), R)$ , existe  $F$  holomorfa en  $D(f(z), R)$  tal que  $u = \operatorname{Re}(F)$  en  $D(f(z_0), R)$ .

$$D(z_0, \delta) \xrightarrow{f} D(f(z_0), R) \xrightarrow{F} \mathbb{C}.$$

$F \circ f$  es holomorfa en  $D(z_0, \delta)$ , así que  $\operatorname{Re}(f \circ F)$  es armónica en  $D(z_0, \delta)$ . Si  $z \in D(z_0, \delta)$ , tenemos que  $f(z) \in D(f(z_0), R)$ .

$$\operatorname{Re}(F \circ f)(z) = \operatorname{Re}(F(f(z))) = u(f(z)).$$

Entonces  $\operatorname{Re}(F \circ f) = u \circ f$ . Por tanto  $u \circ f$  es armónica en  $D(z_0, \delta)$ . Entonces  $u \circ f$  es armónica en  $D$ .

Sea  $u : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $\mathbb{D}$  y continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Hemos visto que:

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) dt.$$

Sea  $a \in \mathbb{D}$ . Consideramos  $T_a(z) = \frac{z+a}{1+\bar{a}z}$ , con  $T_a(0) = a$  y  $T_a(\overline{\mathbb{D}}) = \overline{\mathbb{D}}$ . Sea  $v = u \circ T_a$ .

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{T_a} \overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{u} \mathbb{R}.$$

$v$  es continua en  $\overline{\mathbb{D}}$  y armónica en  $\mathbb{D}$ .

$$u(a) = v(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(T_a(e^{it})) dt.$$

Hacemos el cambio de variable:

$$T_a(e^{it}) = e^{i\varphi} \Leftrightarrow e^{it} = T_a^{-1}(e^{i\varphi}) = S_a(e^{i\varphi}).$$

Derivando,

$$ie^{it} dt = ie^{i\varphi} S'_a(e^{i\varphi}) d\varphi \Leftrightarrow dt = \frac{e^{i\varphi} S'_a(e^{i\varphi})}{S_a(e^{i\varphi})} d\varphi.$$

Recordamos que  $S'_a(z) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}z)^2}$ , así que  $S'_a(e^{i\varphi}) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}e^{i\varphi})^2}$  y entonces:

$$dt = \frac{e^{i\varphi}(1-|a|^2)}{(1-\bar{a}e^{i\varphi})^2} \frac{1-\bar{a}e^{i\varphi}}{e^{i\varphi}-a} d\varphi = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}e^{i\varphi})(1-ae^{i\varphi})} d\varphi = \frac{1-|a|^2}{|1-ae^{-i\varphi}|^2} d\varphi.$$

Entonces la integral queda de la forma:

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+\theta_0}^{\pi+\theta_0} u(e^{i\varphi}) \frac{1-|a|^2}{|1-ae^{-i\varphi}|^2} d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) \frac{1-|a|^2}{|1-ae^{-it}|^2} dt.$$

□

**Teorema 5.19.** *Sea  $u : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $\mathbb{D}$  y continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Entonces*

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) \frac{1-|z|^2}{|1-ze^{-it}|^2} dt, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

Si  $f : \partial_{\infty} D \rightarrow \mathbb{R}$  es una función continua, sabemos que la solución del problema de Dirichlet en  $\mathbb{D}$  con valores frontera  $f$ , de existir, es única. Además, tendría que ser la siguiente:

$$u : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \frac{1-|z|^2}{|1-ze^{-it}|^2} dt & \text{si } z \in \mathbb{D}, \\ u(z) = f(z) & \text{si } z \in \partial\mathbb{D}. \end{cases}$$

### 5.3. La integral de Poisson

Una primera expresión del núcleo de Poisson es

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|1 - ze^{-it}|^2}, \quad z \in \mathbb{D}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Si  $z = re^{i\theta}$ ,  $0 \leq r < 1$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ ,

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{i\theta}e^{-it}|^2} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{i(\theta-t)}|^2}.$$

De esta forma llegamos a una segunda expresión del núcleo de Poisson:

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{it}|^2}, \quad 0 \leq r < 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Podemos escribir el denominador de otra forma:

$$|1 - re^{it}|^2 = (1 - re^{it})(1 - re^{-it}) = 1 - re^{-it} - re^{it} + r^2 = 1 - r(e^{it} + e^{-it}) + r^2 = 1 - 2r \cos(t) + r^2.$$

Luego

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

*Observación.*

1. Si  $0 \leq r < 1$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  $t \in \mathbb{R}$  y  $z = re^{i\theta}$ , entonces  $P(z, e^{it}) = P_r(\theta - t)$ .
2. Si  $0 \leq r < 1$ ,  $t \in \mathbb{R}$  y  $z = re^{it}$ , entonces  $P_r(t) = P(z, e^{i0}) = P(z, 1)$ .

**Propiedades.**

1.  $P(z, e^{it}) > 0$  si  $z \in \mathbb{D}$  y  $t \in \mathbb{R}$ . Equivalentemente,  $P_r(t) > 0$  si  $0 \leq r < 1$  y  $t \in \mathbb{R}$ .
2. Fijando  $t \in \mathbb{R}$ , la función  $z \in \mathbb{D} \mapsto P(z, e^{it}) > 0$  es armónica en  $\mathbb{D}$ .

*Demostración.*

- Si  $t = 0$  y  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\begin{aligned} P(z, e^{i0}) &= \frac{1 - |z|^2}{|1 - z|^2} = \frac{1 - z\bar{z}}{(1 - z)(1 - \bar{z})} = \frac{1 - z + z - z\bar{z}}{(1 - z)(1 - \bar{z})} = \frac{1}{1 - \bar{z}} + \frac{z}{1 - z} = \\ &= \frac{1}{1 - \bar{z}} + \frac{z - 1 + 1}{1 - z} = \frac{1}{1 - \bar{z}} - 1 + \frac{1}{1 - z} = -1 + \operatorname{Re} \left( \frac{1}{1 - z} \right) = \\ &= \operatorname{Re} \left( -1 + \frac{2}{1 - z} \right) = \operatorname{Re} \left( \frac{1 + z}{1 - z} \right). \end{aligned}$$

La función  $z \in \mathbb{D} \mapsto P(z, e^{i0}) = \operatorname{Re} \left( \frac{1+z}{1-z} \right)$  es armónica en  $\mathbb{D}$ .

- Si  $t \in \mathbb{R}$  y  $z \in \mathbb{D}$ , tomamos  $w = ze^{-it} \in \mathbb{D}$ , con  $|w| = |z|$ . Entonces:

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|1 - ze^{-it}|^2} = \frac{1 - |w|^2}{|1 - w|^2} = \operatorname{Re} \left( \frac{1 + w}{1 - w} \right) = \operatorname{Re} \left( \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right).$$

La función  $z \in \mathbb{D} \mapsto P(z, e^{it})$  es armónica en  $\mathbb{D}$ .

□

3. Si  $z \in \mathbb{D}$  y  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$P(z, e^{it}) = \operatorname{Re} \left( \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right).$$

Si  $0 \leq r < 1$  y  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$P_r(t) = \operatorname{Re} \left( \frac{1 + re^{it}}{1 - re^{it}} \right).$$

4. Fijado  $r \in [0, 1)$ , tenemos la función

$$P_r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto P_r(t) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{it}|^2} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(t)}$$

que es continua, positiva, periódica de periodo  $2\pi$ , par y decreciente en  $[0, \pi]$ . Observamos que:

$$P_r(0) = \frac{1 - r^2}{(1 - r)^2} = \frac{1 + r}{1 - r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} \infty,$$

$$P_r(\pi) = P_r(-\pi) = \frac{1 - r^2}{(1 + r)^2} = \frac{1 - r}{1 + r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0.$$

Tenemos entonces la desigualdad:

$$\frac{1 - r}{1 + r} \leq P_r(t) \leq \frac{1 + r}{1 - r}, \quad 0 \leq r < 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Además, si en el teorema anterior tomamos  $u \equiv 1$  y  $z = r$ , tenemos:

$$1 = u(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(-t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = 1.$$

5. Para cada  $t \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$  se tiene que  $P_r(t) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0$ . Además, si  $\delta \in (0, \pi)$ , se tiene que  $P_r(t) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0$  uniformemente en  $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ .

Si  $t \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$ ,  $\cos(t) \neq 1$ , así que:

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} P_r(t) = \frac{0}{2 - 2 \cos(t)} = 0.$$

Si  $\delta \in [0, \pi)$ , entonces:

$$P_r(t) \leq P_r(\delta) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0.$$

**Definición 5.5.** Sea  $f : \partial\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Se define la integral de Poisson de  $f$ , y se denota  $P[f]$ , como la función

$$P[f] : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z \mapsto P[f](z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P(z, e^{it}) dt$$

Equivalentemente, si  $z = re^{i\theta}$  con  $0 \leq r < 1$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ , entonces

$$P[f](z) = P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_r(\theta - t) dt.$$



**Teorema 5.20.** *El disco unidad  $\mathbb{D}$  es un dominio regular para el problema de Dirichlet. En concreto, si  $f : \partial\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  es continua, entonces la solución del problema de Dirichlet en  $\mathbb{D}$  con valores frontera  $f$  es la función:*

$$u : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u(z) = \begin{cases} P[f](z) & \text{si } z \in \mathbb{D}, \\ f(z) & \text{si } z \in \partial\mathbb{D}. \end{cases}$$

Es decir,  $u$  es armónica en  $\mathbb{D}$ , continua en  $\overline{\mathbb{D}}$  y  $u = f$  en  $\partial\mathbb{D}$ .

*Demostración.*

1.  $P[f]$  es armónica en  $\mathbb{D}$ . Si  $z \in \mathbb{D}$ , tenemos que

$$\begin{aligned} P[f](z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P(z, e^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \operatorname{Re} \left( \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re} \left( f(e^{it}) \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right) dt = \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} dt \right). \end{aligned}$$

Veamos que  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} dt$  es una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  expresándola como serie de potencias.

Si  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\frac{1 + z}{1 - z} = \frac{1}{1 - z} + \frac{z}{1 - z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n$$

converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $\mathbb{D}$ . Así que:

$$\frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n e^{-int}, \quad t \in [-\pi, \pi],$$

con convergencia uniforme. Entonces:

$$\begin{aligned} P[f](z) &= \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \left( 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n e^{-int} \right) dt \right) = \\ &= \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( f(e^{it}) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} f(e^{it}) z^n e^{-int} \right) dt \right) = \\ &= \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( 2 \sum_{n=1}^{\infty} f(e^{it}) z^n e^{-int} \right) dt \right) = \\ &= \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) dt + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt \right) z^n \right). \end{aligned}$$

Sea

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Entonces:

$$P[f](z) = \operatorname{Re} \left( a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right).$$

Esta es una serie de potencias centrada en 0 que converge para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Su radio de convergencia es mayor o igual que 1. Por tanto, define una función holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Entonces la función  $z \in \mathbb{D} \mapsto P[f](z)$  es armónica en  $\mathbb{D}$ .

2. Veamos que:

$$\lim_{z \rightarrow 1, z \in \mathbb{D}} u(z) = f(1).$$

Si  $z \in \mathbb{D}$ ,  $z = re^{i\theta}$  con  $0 \leq r < 1$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} u(z) - f(1) &= P[f](z) - f(1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_r(\theta - t) dt - f(1) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_r(\theta - t) dt - f(1) \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(s) ds = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+\theta}^{\pi+\theta} f(e^{i(\theta-s)}) P_r(s) ds - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(1) P_r(s) ds = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( f(e^{i(\theta-s)}) - f(e^{i0}) \right) P_r(s) ds. \end{aligned}$$

Así que

$$|u(z) - f(1)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i0}) \right| P_r(t) dt.$$

Sea  $\varepsilon > 0$ , como la función  $t \in [-\pi, \pi] \mapsto f(e^{it})$  es uniformemente continua, existe  $\delta_1 \in (0, \pi)$  tal que si  $t, s \in [-\pi, \pi]$  con  $|t - s| < \delta_1$ , entonces  $|f(e^{it}) - f(e^{is})| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Como  $f$  está acotada en  $\partial\mathbb{D}$ , existe  $M > 0$  tal que  $|f(z)| \leq M$  para todo  $z \in \partial\mathbb{D}$ . Tomamos  $\delta = \frac{\delta_1}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ . Como  $P_r(t) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0$  uniformemente en  $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$ , existe  $r_0 \in (0, 1)$  tal que

$$\begin{cases} r_0 < r < 1 \\ t \in [-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi] \end{cases} \Rightarrow P_r(t) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Entonces, si  $r_0 < r < 1$  y  $|\theta| < \delta$ , vamos a ver que  $|u(z) - f(1)| < \varepsilon$ .

$$\begin{aligned} |u(z) - f(1)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \left| f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i0}) \right| P_r(t) dt + \\ &+ \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi] \setminus [-\delta, \delta]} \left| f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i0}) \right| P_r(t) dt. \end{aligned}$$

Si  $t \in [-\delta, \delta]$ , tenemos que

$$|\theta - t - 0| \leq |\theta| + |t| < \delta + \delta = 2\delta = \delta_1 < \pi.$$

Además,  $\theta - t, 0 \in [-\pi, \pi]$ . Así que:

$$\left| f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i0}) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} |u(z) - f(1)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{\varepsilon}{2} P_r(t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi] \setminus [-\delta, \delta]} 2M \frac{\varepsilon}{4M} dt = \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\varepsilon}{2} dt = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

3. Veamos que

$$\lim_{z \rightarrow \xi, z \in \mathbb{D}} u(z) = f(\xi), \quad \forall \xi \in \partial\mathbb{D}.$$

Sea  $g : \partial\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(z) = f(\xi z)$ , es continua. Sea  $v = P[g] : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ . Sabemos que  $\lim_{z \rightarrow 1, z \in \mathbb{D}} v(z) = g(1)$ . Veamos que  $v(z) = u(\xi z)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

Sea  $z \in \mathbb{D}$ ,  $z = re^{i\theta}$  con  $0 \leq r < 1$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ .

$$v(z) = P[g](z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(e^{it}) P_r(\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi e^{it}) P_r(\theta - t) dt.$$

Si escribimos  $\xi = e^{i\theta_0}$ , con  $\theta_0 \in \mathbb{R}$ , entonces:

$$\begin{aligned} v(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi e^{i(\theta_0 - t)}) P_r(\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi e^{is}) P_r(\theta + \theta_0 - s) ds = P[f](re^{i(\theta - \theta_0)}) = \\ &= P[f](\xi z) = u(\xi z). \end{aligned}$$

Entonces:

$$\lim_{z \rightarrow 1, z \in \mathbb{D}} u(\xi z) = f(\xi) \Rightarrow \lim_{z \rightarrow \xi, z \in \mathbb{D}} u(z) = f(\xi).$$

4. Veamos que  $u$  es continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ .  $u$  es continua en  $\mathbb{D}$  porque es armónica en  $\mathbb{D}$ . Dado  $\xi \in \partial\mathbb{D}$ , hay que probar que

$$\lim_{z \rightarrow \xi, z \in \mathbb{D}} f(\xi).$$

Dada  $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$  sucesión en  $\overline{\mathbb{D}}$  con  $z_n \rightarrow \xi$ , definimos la sucesión  $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$  como sigue.

- Si  $z_n \in \mathbb{D}$ , tomamos  $w_n = z_n$ .
- Si  $z_n \in \partial\mathbb{D}$ , tomamos  $w_n \in \mathbb{D}$  con  $|z_n - w_n| < \frac{1}{n}$  y  $|u(z_n) - u(w_n)| < \frac{1}{n}$ . Esto se puede hacer porque  $\lim_{z \rightarrow z_n, z \in \mathbb{D}} u(z) = u(z_n)$ .

Hay que probar que  $u(z_n) \rightarrow f(\xi)$ .

$$|u(z_n) - f(\xi)| \leq |u(z_n) - u(w_n)| + |u(w_n) - f(\xi)|.$$

Observamos que

$$|w_n - \xi| \leq |w_n - z_n| + |z_n - \xi| \rightarrow 0$$

Además, sabemos que  $\lim_{z \rightarrow \xi, z \in \mathbb{D}} u(z) = f(\xi)$ , así que  $u(w_n) \rightarrow f(\xi)$ . Por tanto,

$$|u(z_n) - f(\xi)| \rightarrow 0.$$

□

**Teorema 5.21.** Sea  $D$  un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$  con  $D \neq \mathbb{C}$ . Supongamos que existe una aplicación conforme  $F$  de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$  que se puede extender a un homeomorfismo de  $\overline{\mathbb{D}}$  sobre  $\overline{D} = D \cup \partial_{\infty} D$ . Entonces  $D$  es regular para el problema de Dirichlet.

En concreto, si  $f : \partial_{\infty} D \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua, la función  $u : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$u(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in \partial_{\infty} D \\ P[f \circ F](F^{-1}(z)) & \text{si } z \in D \end{cases}$$

es la solución del problema de Dirichlet en  $D$  con valores frontera  $f$ .

*Demostración.*  $F : \mathbb{D} \rightarrow D$  se puede extender a un homeomorfismo  $F : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{D}$ . Observamos que  $F$  es un homeomorfismo de  $\partial\mathbb{D}$  sobre  $\partial_{\infty} D$ . Sea  $g = f \circ F$ .

$$g : \partial\mathbb{D} \xrightarrow{F} \partial_{\infty} D \xrightarrow{f} \mathbb{R}.$$

$g$  es continua. Sea  $v$  la solución del problema de Dirichlet en  $\mathbb{D}$  con valores frontera  $g$ .  $v : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$  es armónica en  $\mathbb{D}$ , continua en  $\overline{\mathbb{D}}$  y con  $v = g$  en  $\partial\mathbb{D}$ .

Sea  $u : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u = v \circ F^{-1}$ .  $u$  es continua en  $\overline{D}$  y armónica en  $D$ . Si  $z \in \partial_\infty D$ ,

$$u(z) = v(F^{-1}(z)) = g(F^{-1}(z)) = f(z).$$

Luego  $u = f$  en  $\partial_\infty D$ . □

**Ejemplo.** Cualquier disco abierto es un dominio regular para el problema de Dirichlet.

Sea  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Sea  $D = D(a, R)$ . Sea  $F : \mathbb{D} \rightarrow D$ ,  $F(z) = a + Rz$ .  $D$  es regular para el problema de Dirichlet.

Si  $f : \partial D(a, R) \rightarrow \mathbb{R}$  es continua, entonces la solución del problema de Dirichlet en  $D(a, R)$  con valores frontera  $f$  es  $u : \overline{D}(a, R) \rightarrow \mathbb{R}$ , con

$$u(z) = f(z), \quad z \in \partial D(a, R).$$

Si  $z \in D(a, R)$ ,  $z = a + re^{i\theta}$  con  $0 \leq r < R$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} u(z) &= P[f \circ F](F^{-1}(z)) = P[f \circ F]\left(\frac{z-a}{R}\right) = P[f \circ F]\left(\frac{r}{R}e^{i\theta}\right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f \circ F)(e^{it}) P_{r/R}(\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(a + Re^{it}) \frac{1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2}{\left|1 - \frac{r}{R}e^{i(\theta-t)}\right|^2} dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(a + Re^{it}) \frac{R^2 - r^2}{|R - re^{i(\theta-t)}|^2} dt. \end{aligned}$$

Sea  $D$  el dominio interior a una curva de Jordan en  $\mathbb{C}$ . Entonces  $D$  es un dominio simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ , con  $D \neq \mathbb{C}$ . Por el teorema de Riemann, existe una aplicación conforme  $F$  de  $\mathbb{D}$  sobre  $D$ , que se puede extender a un homeomorfismo de  $\overline{\mathbb{D}}$  sobre  $\overline{D}$  por el teorema de extensión de Carathéodory. Por el teorema anterior,  $D$  es regular para el problema de Dirichlet. Si  $f : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$  es continua, entonces la función  $u : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$u(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in \partial D \\ P[f \circ F](F^{-1}(z)) & \text{si } z \in D \end{cases}$$

es la solución del problema de Dirichlet en  $D$  con valores frontera  $f$ .

**Teorema 5.22** (Principio del máximo para funciones armónicas: tercera versión). *Sea  $D$  un dominio acotado en  $\mathbb{C}$  y sea  $u$  una función armónica y acotada superiormente en  $D$ . Si existen  $M \in \mathbb{R}$  y  $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \subset \partial D$  tales que*

$$\limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) \leq M, \quad \forall \xi \in \partial D \setminus \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\},$$

*entonces  $u(z) \leq M$  para todo  $z \in D$ .*

*Demostración.* Sea  $\alpha = \text{diam}(D) = \sup\{|z - w| : z, w \in D\}$ . Entonces  $0 < \alpha < \infty$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , sea  $u_\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$u_\varepsilon(z) = u(z) + \varepsilon \sum_{j=1}^n \text{Log} \left( \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \right).$$

Si  $z \in D$  y  $j \in \{1, \dots, n\}$ , como  $|z - w| \leq \alpha$  para todo  $w \in D$ , se tiene que

$$0 < |z - \xi_j| \leq \alpha \Rightarrow 0 < \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \leq 1 \Rightarrow \text{Log} \left( \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \right) \leq 0.$$

Entonces  $u_\varepsilon \leq u$  en  $D$ . Como la función  $z \mapsto \frac{z - \xi_j}{\alpha}$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ , se tiene que  $\text{Log} \left( \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \right)$  es armónica en  $D$  para cada  $j$ . Por tanto,  $u_\varepsilon$  es armónica en  $D$ .

Sea  $\xi \in \partial D \setminus \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ . Entonces:

$$\limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u_\varepsilon(z) \leq \limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) \leq M.$$

Sea  $j_0 \in \{1, \dots, n\}$ .

$$\limsup_{z \rightarrow \xi_{j_0}, z \in D} u_\varepsilon(z) = \limsup_{z \rightarrow \xi_{j_0}, z \in D} \left( u(z) + \varepsilon \operatorname{Log} \left( \frac{|z - \xi_{j_0}|}{\alpha} \right) + \varepsilon \sum_{j=1, j \neq j_0}^n \operatorname{Log} \left( \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \right) \right) = -\infty \leq M.$$

Por la segunda versión del principio del máximo,  $u_\varepsilon(z) \leq M$  para todo  $z \in D$ . Entonces hemos probado que, dado  $\varepsilon > 0$ , se tiene que

$$u(z) + \varepsilon \sum_{j=1}^n \operatorname{Log} \left( \frac{|z - \xi_j|}{\alpha} \right) \leq M, \quad \forall z \in D.$$

Haciendo  $\varepsilon \rightarrow 0$ , tenemos que  $u(z) \leq M$  para todo  $z \in D$ . □

**Teorema 5.23** (Principio del máximo para funciones armónicas: cuarta versión). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  con exterior no vacío y sea  $u$  una función armónica y acotada superiormente en  $D$ . Supongamos que existen  $M \in \mathbb{R}$  y  $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \in \partial_\infty D$  tales que*

$$\limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) \leq M, \quad \forall \xi \in \partial_\infty D \setminus \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}.$$

*Entonces  $u(z) \leq M$  para todo  $z \in D$ .*

*Demostración.* Sea  $a \in \mathbb{C}$  un punto exterior a  $D$ . Existe  $R > 0$  tal que  $D(a, R) \cap D = \emptyset$ . Entonces  $|z - a| \geq R$  para todo  $z \in D$ . Para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$  vamos a construir una función  $h_j$  holomorfa y nunca nula en  $D$ , con  $|h_j| \leq 1$  en  $D$  y tal que  $\lim_{z \rightarrow \xi_j, z \in D} h_j(z) = 0$  y  $\lim_{z \rightarrow \xi_i, z \in D} h_j(z)$  existe en  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  si  $i \neq j$ .

- Si  $\xi_j = \infty$ ,

$$h_j(z) = \frac{R}{z - a}, \quad z \in D.$$

$h_j$  es holomorfa y nunca nula en  $D$  con  $|h_j| \leq 1$  en  $D$ .

- Si  $\xi_j \in \mathbb{C}$ ,

$$\left| \frac{z - \xi_j}{z - a} \right| = \left| \frac{z - a + a - \xi_j}{z - a} \right| \leq \frac{|z - a| + |a - \xi_j|}{|z - a|} = 1 + \frac{|a - \xi_j|}{|z - a|} \leq 1 + \frac{|a - \xi_j|}{R} = K_j > 0.$$

Sea

$$h_j(z) = \frac{1}{K_j} \frac{z - \xi_j}{z - a}.$$

$h_j$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ , con

$$|h_j(z)| = \frac{1}{K_j} \left| \frac{z - \xi_j}{z - a} \right| \leq \frac{1}{K_j} K_j = 1, \quad \forall z \in D.$$

Además,

$$\begin{cases} \lim_{z \rightarrow \xi_j, z \in D} h_j(z) = 0, \\ \lim_{z \rightarrow \xi_i, z \in D} h_j(z) = \frac{1}{K_j} \frac{\xi_i - \xi_j}{\xi_i - a} \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad i \neq j. \end{cases}$$

Sea  $\varepsilon > 0$ , definimos:

$$u_\varepsilon(z) = u(z) + \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log} |h_j(z)|, \quad z \in D.$$

Se sigue como en la demostración del teorema anterior.

□

**Teorema 5.24** (Teorema de la singularidad evitable para funciones armónicas). *Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Si  $u$  es armónica y acotada en  $D(a, R) \setminus \{a\}$ , entonces  $u$  se puede extender a una función armónica en  $D(a, R)$ .*

*Demostración.* Sea  $f = u|_{\partial D(a, R/2)}$ ,  $f : \partial D(a, R/2) \rightarrow \mathbb{R}$  es continua. Como  $D(a, R/2)$  es regular para el problema de Dirichlet, existe  $v : \overline{D}(a, R/2) \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $D(a, R/2)$ , continua en  $\overline{D}(a, R/2)$  y con  $v = f$  en  $\partial D(a, R/2)$ .

Sea  $D = D(a, R/2) \setminus \{a\}$ .  $u$  y  $v$  son armónicas en  $D$ ,  $u - v$  y  $v - u$  también. Aplicamos la tercera versión del principio del máximo a  $u - v$  y  $v - u$  en  $D$ .  $D$  es un dominio acotado en  $\mathbb{C}$ ,  $u$  está acotada en  $D$  y  $v$  es continua en  $\overline{D}(a, R/2)$ , así que  $v$  está acotada en  $D$ . Luego  $u - v$  y  $v - u$  están acotadas en  $D$ .

Si  $\xi \in \partial D(a, R/2) = \partial D \setminus \{a\}$ ,

$$\begin{aligned} \limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} (u(z) - v(z)) &\leq u(\xi) - v(\xi) = 0, \\ \limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} (v(z) - u(z)) &\leq v(\xi) - u(\xi) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto,  $u(z) - v(z) \leq 0$  y  $v(z) - u(z) \leq 0$  para todo  $z \in D$ . Luego  $u(z) = v(z)$  para todo  $z \in D = D(a, R/2) \setminus \{a\}$ , con  $v$  armónica en  $D(a, R/2)$ . Definiendo  $u(a) = v(a)$ , vemos que  $u$  se puede extender a una función armónica en  $D(a, R)$ . □

**Teorema 5.25.**  $\mathbb{D} \setminus \{0\}$  es un dominio en  $\mathbb{C}$  que no es regular para el problema de Dirichlet.

*Demostración.*  $D = \mathbb{D} \setminus \{0\}$ ,  $\partial D = \partial \mathbb{D} \cup \{0\}$ . Sea  $f : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(z) = 0$  si  $|z| = 1$  y  $f(0) = 1$ .  $f$  es continua en  $\partial D$ . Supongamos que existe  $u : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  armónica en  $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ , continua en  $\overline{\mathbb{D}}$  y con  $u = f$  en  $\partial D$ . Como  $u$  es armónica y acotada en  $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ , por el teorema anterior  $u$  se puede extender a una función armónica en  $\mathbb{D}$ . Entonces  $u$  es armónica en  $\mathbb{D}$  y continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Por tanto,

$$\max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} u(z) = \max_{z \in \partial \mathbb{D}} u(z) = 0.$$

Sin embargo, esto contradice que  $u(0) = 1 \neq 0$ . □

*Observación.* La condición de que  $u$  está acotada superiormente no se puede suprimir en la tercera versión del principio del máximo.

**Ejemplo.** Sea  $D = \mathbb{D} \setminus \{0\}$  dominio acotado en  $\mathbb{C}$  y sea  $u(z) = \text{Log} \left( \frac{1}{|z|} \right)$ ,  $z \in D$ . Como la función  $z \mapsto \frac{1}{z}$  es holomorfa y nunca nula en  $D$ , entonces  $u$  es armónica en  $D$ .  $u$  no está acotada superiormente en  $D$ .

$$\partial D = \partial \mathbb{D} \cup \{0\}.$$

Si  $\xi \in \partial \mathbb{D}$ ,

$$\limsup_{z \rightarrow \xi, z \in D} u(z) = \limsup_{z \rightarrow \xi, z \in \mathbb{D}} \text{Log} \left( \frac{1}{|z|} \right) = 0 = M.$$

Pero no es cierto que  $u(z) \leq 0$  para todo  $z \in D$ . De hecho,  $u(z) > 0$  para todo  $z \in D$ .

**Lema 5.26.** *Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Sea  $u : \overline{D}(a, R) \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua, con  $u \equiv 0$  en  $\partial D(a, R)$ . Supongamos que para cada  $z_0 \in D(a, R)$  existe  $r_{z_0} > 0$  con  $D(z_0, r_{z_0}) \subset D(a, R)$  tal que*

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it}) dt, \quad r \in [0, r_{z_0}].$$

*Entonces  $u \equiv 0$  en  $D(a, R)$ .*

*Demostración.* Sea  $M = \max\{u(z) : z \in \overline{D}(a, R)\}$  y sea  $K = \{z \in \overline{D}(a, R) : u(z) = M\}$ .  $K$  es un compacto no vacío con  $K \subset \overline{D}(a, R)$ . Como la función  $z \in \mathbb{C} \mapsto |z - a|$  es continua, alcanza el máximo en  $K$ . Tomamos  $z_0 \in K$  tal que  $|z_0 - a| = \max\{|z - a| : z \in K\}$ .

Supongamos por reducción al absurdo que  $z_0 \in D(a, R)$ . Tomamos  $r_{z_0} > 0$ , que existe por hipótesis, y fijamos  $r \in (0, r_{z_0})$ . Entonces

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it}) dt.$$

Sean  $E_1 = \{t \in [-\pi, \pi] : |z_0 + re^{it} - a| \leq |z_0 - a|\}$  y  $E_2 = \{t \in [-\pi, \pi] : |z_0 + re^{it} - a| > |z_0 - a|\}$ . Observamos que  $E_2 \neq \emptyset$ . Si  $t \in E_2$ , se tiene que  $z_0 + re^{it} \notin K$ . Así que  $u(z_0 + re^{it}) < M$ . Entonces

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{E_1} u(z_0 + re^{it}) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{E_2} u(z_0 + re^{it}) dt.$$

Observamos que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{E_1} u(z_0 + re^{it}) dt &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{E_1} M dt, \\ \frac{1}{2\pi} \int_{E_2} u(z_0 + re^{it}) dt &< \frac{1}{2\pi} \int_{E_2} M dt. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$u(z_0) < \frac{1}{2\pi} \int_{E_1} M dt + \frac{1}{2\pi} \int_{E_2} M dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} M dt = M.$$

Esto contradice que  $z_0 \in K$ . Entonces  $z_0 \in \partial D(a, R)$ , así que por hipótesis  $u(z_0) = 0$ . Es decir,

$$u(z_0) = M = \max\{u(z) : z \in \overline{D}(a, R)\} = 0.$$

Por tanto,  $u(z) \leq 0$  para todo  $z \in D(a, R)$ .

Aplicando la parte del lema que acabamos de ver a la función  $-u$ , tenemos que  $-u(z) \leq 0$  para todo  $z \in D(a, R)$ . Por tanto,  $u \equiv 0$  en  $D(a, R)$ .  $\square$

**Teorema 5.27** (Caracterización de la armonicidad por la propiedad del valor medio). *Sea  $D$  un abierto en  $\mathbb{C}$  y sea  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Supongamos que para cada  $a \in D$  existe  $r_a > 0$  con  $D(a, r_a) \subset D$ , tal que*

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(a + re^{it}) dt, \quad r \in [0, r_a].$$

*Entonces  $u$  es armónica en  $D$ .*

*Demostración.* Sea  $a \in D$ . Tomamos  $r_a > 0$  y  $R = \frac{r_a}{2}$ . Sea  $v$  la solución del problema de Dirichlet en  $D(a, R)$  con valores frontera  $u$ . Entonces  $v : \overline{D}(a, R) \rightarrow \mathbb{R}$  es armónica en  $D(a, R)$ , continua en  $\overline{D}(a, R)$  y con  $u = v$  en  $\partial D(a, R)$ . Vamos a aplicar el lema a  $u - v$ .  $u - v : \overline{D}(a, R) \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y  $u - v \equiv 0$  en  $\partial D(a, R)$ . Sea  $z_0 \in D(a, R)$ . Tomamos  $r_{z_0} > 0$ , que elegimos suficientemente pequeño para que  $D(z_0, r_{z_0}) \subset D(a, R)$ . Si  $r \in [0, r_{z_0})$ , tenemos que

$$u(z_0) - v(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it}) dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(z_0 + re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (u - v)(z_0 + re^{it}) dt.$$

Por el lema,  $u - v = 0$  en  $D(a, R)$ . Como  $v$  es armónica en  $D(a, R)$ ,  $u$  es armónica en  $D(a, R)$ . Para cada  $a \in D$  hemos encontrado  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$  tal que  $u$  es armónica en  $D(a, R)$ . Entonces  $u$  es armónica en  $D$ .  $\square$

*Observación.* Esta es la forma débil de la propiedad del valor medio. Como  $u$  es armónica en  $D$ , tenemos que  $u$  verifica la propiedad del valor medio.

**Teorema 5.28.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de funciones armónicas en  $D$ . Supongamos que  $\{u_n\}$  converge uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Sea  $u(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z)$ ,  $z \in D$ . Entonces  $u$  es armónica en  $D$ .

*Demostración.* Tenemos  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $K \subset D$ ,  $K$  compacto, tenemos que  $u_n \rightarrow u$  uniformemente en  $K$  y  $u_n$  es continua en  $K$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Así que  $u$  es continua en  $K$ , luego  $u$  es continua en  $D$ . Sea  $a \in D$  y sea  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$ . Sea  $r \in [0, R)$ . Tenemos que

$$u_n(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_n(a + re^{it}) dt, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Haciendo  $n \rightarrow \infty$ ,

$$u(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_n(a + re^{it}) dt.$$

Como  $u_n \rightarrow u$  uniformemente en  $\partial D(a, r)$ ,

$$u(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_n(a + re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(a + re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(a + re^{it}) dt.$$

Por el teorema anterior,  $u$  es armónica en  $D$ . □

Vamos a ver qué sucede al cambiar la condición de convergencia uniforme en compactos por la condición de que  $\{u_n\}$  sea creciente.

## 5.4. Desigualdades de Harnack

Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ . Sea  $u$  una función armónica y no negativa en  $D(a, R)$ . Entonces, si  $r \in (0, R)$ , se tiene que

$$\frac{R-r}{R+r} u(a) \leq u(z) \leq \frac{R+r}{R-r}, \quad \forall z \in \overline{D}(a, R).$$

Por tanto, tomando  $r = \frac{R}{2}$ , tenemos

$$\frac{1}{3} u(a) \leq u(z) \leq 3u(a), \quad z \in \overline{D}\left(a, \frac{R}{2}\right).$$

*Demostración.* Fijamos  $r \in (0, R)$ . Tomamos  $\rho$  con  $r < \rho < R$ . Sea  $v : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $v(z) = u(a + \rho z)$ .

$$\begin{aligned} v : \mathbb{D} &\rightarrow D(a, R) \xrightarrow{u} \mathbb{R} \\ z &\mapsto a + \rho z \end{aligned}$$

$v$  es continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ , armónica en  $\mathbb{D}$  y no negativa en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Sea  $z \in \partial D\left(0, \frac{r}{\rho}\right)$ .  $z$  es de la forma  $z = \frac{r}{\rho} e^{i\theta}$ , con  $\theta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$v(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) P_{r/\rho}(\theta - t) dt.$$

Además,

$$v(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) dt.$$

Recordemos que

$$\frac{1-r}{1+r} \leq P_r(t) \leq \frac{1+r}{1-r}, \quad 0 \leq r < 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$



Entonces, si  $\theta \in \mathbb{R}$  y  $z = \frac{r}{\rho}e^{i\theta}$ , tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) \frac{1-r/\rho}{1+r/\rho} dt &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) P_{r/\rho}(\theta-t) dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) \frac{1+r/\rho}{1-r/\rho} dt \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\rho-r}{\rho+r} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) dt &\leq v(z) \leq \frac{\rho+r}{\rho-r} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(e^{it}) dt \Leftrightarrow \frac{\rho-r}{\rho+r} v(0) \leq v(z) \leq \frac{\rho+r}{\rho-r} v(0). \end{aligned}$$

En términos de  $u$ ,

$$\frac{\rho-r}{\rho+r} u(a) \leq u(a+\rho z) \leq \frac{\rho+r}{\rho-r} u(a), \quad \theta \in \mathbb{R}, \rho \in (r, R), z = \frac{r}{\rho} e^{i\theta}.$$

Como  $u(a+\rho z) = u\left(a + \rho \frac{r}{\rho} e^{i\theta}\right) = u(a + r e^{i\theta})$ , entonces

$$\frac{\rho-r}{\rho+r} u(a) \leq u(a+\rho z) \leq \frac{\rho+r}{\rho-r} u(a), \quad \theta \in \mathbb{R}, \rho \in (r, R).$$

Haciendo  $\rho \rightarrow R^-$ , tenemos que:

$$\frac{R-r}{R+r} u(a) \leq u(a + r e^{i\theta}) \leq \frac{R+r}{R-r} u(a), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Entonces:

$$\frac{R-r}{R+r} u(a) \leq u(z) \leq \frac{R+r}{R-r} u(a), \quad z \in \partial D(a, r).$$

Como  $u$  es continua en  $\overline{D}(a, r)$  y armónica en  $D(a, r)$ , por el principio del máximo y el principio del mínimo,

$$\begin{aligned} \max_{z \in \overline{D}(a, r)} u(z) &= \max_{z \in \partial D(a, r)} u(z), \\ \min_{z \in \overline{D}(a, r)} u(z) &= \min_{z \in \partial D(a, r)} u(z). \end{aligned}$$

Entonces tenemos la desigualdad para todo  $z \in \overline{D}(a, r)$ . □

**Proposición 5.29.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de funciones armónicas y no negativas en  $D$ . Si existe  $z_0 \in D$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z_0) = \infty$ , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = \infty, \quad \forall z \in D.$$

siendo la convergencia uniforme en cada subconjunto compacto de  $D$ .

*Demostración.* Para cada  $n \in \mathbb{N}$  tenemos  $u_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  armónica no negativa. Sea

$$A = \{z \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = \infty\}.$$

$A \neq \emptyset$  porque  $z_0 \in A$ . Veamos que  $A$  es abierto y cerrado en  $D$ .

1. Probemos que  $A$  es abierto. Queremos ver que si  $a \in A$  y  $R > 0$  tal que  $D(a, R) \subset D$ , entonces  $D(a, R/2) \subset A$  y  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$  uniformemente en  $D(a, R/2)$ .

Basta ver la convergencia uniforme. Sea  $M > 0$ , veamos que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que si  $n \geq n_0$  y  $z \in D(a, R/2)$ , entonces  $u_n(z) > M$ . Como  $a \in A$ , tenemos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(a) = \infty$ . Por tanto, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que

$$n \geq n_0 \Rightarrow u_n(a) > 3M.$$

Entonces, si  $n \geq n_0$  y  $z \in D(a, R/2)$ , por las desigualdades de Harnack tenemos

$$u_n(z) \geq \frac{1}{3} u_n(a) > \frac{1}{3} 3M = M.$$

Por tanto,  $A$  es abierto.

2. Veamos que  $A$  es cerrado en  $D$ , es decir, que  $D \setminus A$  es abierto.

Sea  $a \in D \setminus A$  y sea  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$ .  $D(a, R/2) \subset D \setminus A$ , ya que si  $z \in D(a, R/2)$ , entonces  $u_n(z) \leq 3u_n(a)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  y  $z \in D$ . Si  $z \in A$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = \infty$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(a) = \infty$ , pero  $a \notin A$ . Así que  $D \setminus A$  es abierto.

$A$  es abierto y cerrado en  $D$ , que es conexo. Como  $A \neq \emptyset$ , tenemos que  $A = D$ . Entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = \infty$  para todo  $z \in D$ . Sabemos que, dado  $a \in D$  y  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$ , se tiene que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$  uniformemente en  $D(a, R/2)$ . Entonces  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .  $\square$

**Teorema 5.30** (Teorema de Harnack). *Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{u_n\}_{n=1}^\infty$  una sucesión creciente de funciones armónicas en  $D$ . Para cada  $z \in D$ , sea  $u(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Entonces se da una de las dos siguientes posibilidades:*

1.  $u \equiv \infty$ . En este caso,  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .
2.  $u(z) \in \mathbb{R}$  para todo  $z \in D$ . En este caso,  $u$  es armónica en  $D$  y  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

*Demostración.* Supongamos en primer lugar que  $u_n$  es no negativa para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Hay dos posibilidades:

- Existe  $z_0 \in D$  tal que  $u(z_0) = \infty$ . Entonces  $u(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = \infty$  y  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Se verifica (1).
- $u(z) \in \mathbb{R}$  para todo  $z \in D$ . Entonces  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Sea  $a \in D$  y  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$ . Veamos que  $\{u_n\}$  es uniformemente de Cauchy en  $D(a, R/2)$ .

Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $\{u_n(a)\}_{n=1}^\infty$  es una sucesión de Cauchy por ser convergente, tenemos que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que

$$n \geq m > n_0 \Rightarrow 0 \leq u_n(a) - u_m(a) < \frac{\varepsilon}{3},$$

ya que  $u_n - u_m$  es armónica en  $D(a, R)$  y no negativa. Por tanto,  $\{u_n\}_{n=1}^\infty$  converge uniformemente en  $D(a, R/2)$ .

Entonces, dado  $a \in D$  y  $R > 0$  con  $D(a, R) \subset D$ , hemos visto que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$  uniformemente en  $D(a, R/2)$ . Por tanto,  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Entonces  $u$  es armónica en  $D$ , así que se verifica (2).

Consideramos ahora el caso general. Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , sea  $v_n = u_n - u_1$ . Entonces  $\{v_n\}_{n=1}^\infty$  es una sucesión creciente de funciones armónicas no negativas. Para cada  $z \in D$ , sea

$$v(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(z) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Si  $z \in D$ ,

$$v(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n(z) - u_1(z)) = \begin{cases} \infty & \text{si } u(z) = \infty, \\ u(z) - u_1(z) & \text{si } u(z) \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Por el caso anterior se da una de las dos siguientes posibilidades:

- $v \equiv \infty$ . Veamos que  $v_n \rightarrow \infty$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

Sea  $K \subset D$ ,  $K$  compacto. Sea  $A = \min_{z \in K} u_1(z)$ . Como  $v_n \rightarrow \infty$  uniformemente en  $D$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que si  $n \geq n_0$  y  $z \in K$ , entonces  $v(z) > M - A$ , con  $M \in \mathbb{R}$ . Entonces, si  $n \geq n_0$  y  $z \in K$ ,  $u_n(z) = u_1(z) + v_n(z) > A + M - A = M$ . Por tanto, se verifica (1).

- $v(z) \in \mathbb{R}$  para todo  $z \in D$ . Veamos que  $u$  es armónica y  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ .

Sabemos que

$$v(z) = u(z) - u_1(z) \Leftrightarrow u(z) = u_1(z) + v(z), \quad z \in D.$$

Entonces  $u(z) \in \mathbb{R}$  para todo  $z \in D$  y  $u$  es armónica en  $D$ . Además,  $u_n - u_1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u - u_1$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ . Por tanto,  $u_n \rightarrow u$  uniformemente en cada subconjunto compacto de  $D$ , así que se verifica (2).

□

## Capítulo 6

# El teorema de factorización de Weierstrass

Si  $P(z)$  es un polinomio con ceros  $z_1, \dots, z_n$ , entonces podemos factorizar  $P(z)$  como

$$P(z) = c \prod_{k=1}^n (z - z_k)$$

El objetivo es factorizar una función holomorfa usando sus ceros.

### 6.1. Funciones holomorfas sin ceros o con finitos ceros

**Teorema 6.1.** *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo y sea  $f$  una función holomorfa en  $D$  sin ceros. Entonces existe  $g$  holomorfa en  $D$  tal que  $f = e^g$ .*

**Teorema 6.2.** *Sea  $D$  un dominio simplemente conexo y sea  $f$  una función holomorfa en  $D$  con un número finito de ceros  $z_1, \dots, z_n$ . Entonces existe  $g$  holomorfa en  $D$  tal que*

$$f(z) = e^{g(z)} \prod_{n=1}^N (z - z_n)$$

*Demostración.* Sea

$$h(z) = \frac{f(z)}{(z - z_1) \dots (z - z_N)}$$

Solucionando las singularidades evitables,  $h$  es holomorfa en  $D$  y sin ceros. Entonces por el teorema anterior existe  $g$  holomorfa en  $D$  tal que

$$e^{g(z)} = h(z) = \frac{f(z)}{(z - z_1) \dots (z - z_N)} \Rightarrow f(z) = e^{g(z)} \prod_{n=1}^N (z - z_n)$$

□

Desde otro punto de vista, sea  $D$  un dominio simplemente conexo y  $\{z_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{F}} \subset D$ , podemos plantearnos si existe  $f$  holomorfa en  $D$  tal que  $f$  tiene ceros  $\{z_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{F}}$ .

Si  $\{z_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{F}}$  tiene un punto de acumulación en  $D$  entonces, por el teorema de identidad de Weierstrass,  $f \equiv 0$ . Nos interesa el caso en el que  $\{z_n\}_{n=1}^\infty$  es numerable y sin puntos de acumulación en  $D$ .

Sea  $D = \mathbb{C}$  y sea  $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$  numerable y sin puntos de acumulación. Habría que definir  $\prod_{n=1}^{\infty} (z - z_n)$ , por ejemplo de la forma

$$\prod_{n=1}^{\infty} (z - z_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N (z - z_n)$$

Como  $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$  es infinito, entonces necesariamente  $|z_n| \rightarrow \infty$ . En caso contrario,  $\{z_n\}$  tendría un punto de acumulación en  $\mathbb{C}$ . Si fijamos  $z \in \mathbb{C}$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que si  $n \geq n_0$  entonces  $|z - z_n| > 2$ , así que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=n_0}^{\infty} |z - z_n| = \infty$$

## 6.2. Productos infinitos

Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de números complejos. Queremos darle sentido a  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ . Por ejemplo, si  $P_N = \prod_{n=1}^N a_n$ , podemos definir

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n$$

Sin embargo, esta definición plantea algunos problemas.

1. Si tenemos una multiplicación de números complejos cuyo resultado es 0, queremos que uno de ellos sea cero. Sin embargo, si  $a_n = \frac{1}{n}$ , entonces  $P_N = \prod_{n=1}^N \frac{1}{n} = \frac{1}{N!}$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_N = 0$ , con  $a_n \neq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Queremos que la convergencia depende de la cola. Sin embargo, con esta definición depende de un número finito de términos.

Sea  $a_1 = a$  y  $a_n = n$  para  $n \geq 2$ , entonces  $\lim_{N \rightarrow \infty} P_N = 0$  porque  $P_N = 0$  para todo  $N \in \mathbb{N}$ . Sin embargo, si  $a_n = n + 1$  para todo  $n \geq 2$ , entonces  $\lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \infty$ .

**Definición 6.1.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de números complejos. Diremos que el producto infinito asociado a  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , que denotamos por  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ , converge si:

1. Existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$ .
2. Existe  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n$  y además es distinto de cero.

Si converge, entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n$ .

**Ejemplo.**

1. Sea  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Observamos que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Sin embargo,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N!} = 0$$

Por tanto,  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  no converge.

2. Sea  $a_1 = 0$  y  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ,  $n \geq 2$ . Se verifica que  $a_n \neq 0$  para  $n \geq 2$ . Ahora bien,

$$\prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n} = \frac{1}{2} \frac{2}{3} \cdots \frac{N-1}{N} = \frac{1}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

Por tanto,  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  no converge.

3. Sea  $a_1 = 0$  y  $a_n = 1 - \frac{1}{n^2}$ ,  $n \geq 2$ . Es claro que  $a_n \neq 0$  para  $n \geq 2$ . Además,

$$\begin{aligned} \prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) &= \prod_{n=2}^N \frac{n^2 - 1}{n^2} = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \left(\prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n}\right) \left(\prod_{n=2}^N \frac{n+1}{n}\right) = \\ &= \frac{1}{N} \frac{N+1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por tanto,  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.

**Teorema 6.3.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de números complejos. Entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge si ocurre lo siguiente.

1. El conjunto  $\{a_n : a_n = 0\}$  es finito.
2. Si existe  $M \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq M$ , entonces existe  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=M}^N a_n$  y es distinto de 0.

**Teorema 6.4.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  tal que  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge. Entonces:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .
2.  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0$  si y solo si existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_{n_0} = 0$ .
3. Sea  $N \in \mathbb{N}$ . Entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} a_{n+N}$  converge y además

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \left(\prod_{n=1}^N a_n\right) \left(\prod_{n=1}^{\infty} a_{n+N}\right)$$

4. Sea  $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  tal que  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  converge. Entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  converge y además

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \left(\prod_{n=1}^{\infty} a_n\right) \left(\prod_{n=1}^{\infty} b_n\right)$$

*Demostración.*

1. Como  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$  y  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=n_0}^N a_n = q$ , con  $q > 0$ . Si  $M > n_0$ ,

$$a_M = \frac{\prod_{n=n_0}^M a_n}{\prod_{n=n_0}^{M-1} a_n} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \frac{q}{q} = 1$$

2. Supongamos que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_{n_0} = 0$ . Como  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, entonces

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N \rightarrow 0$$

Si  $N > n_0$ , entonces  $P_N = a_1 \dots a_{n_0-1} 0 a_{n_0+1} \dots a_N = 0$ .

Recíprocamente, si  $a_n \neq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n \neq 0$  y  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.

3. Tomemos  $N \in \mathbb{N}$ . Si  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, entonces existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$  y  $\lim_{M \rightarrow \infty} \prod_{n=n_0}^M a_n = q$  con  $q \neq 0$ . Entonces  $a_{n+N} \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$  y además

$$\prod_{n=n_0}^M a_{n+N} = \prod_{n=n_0+N}^{M+N} a_n = \frac{\prod_{n=n_0}^{M+N} a_n}{a_{n_0} \dots a_{n_0+N-1}} \rightarrow \frac{q}{a_{n_0} \dots a_{n_0+N-1}} \neq 0$$

Por tanto,  $\prod_{n=1}^{\infty} a_{n+N}$  converge.

4.  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  convergen. Entonces:

- Existe  $n_a \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_a$  y  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=n_a}^N a_n = l_a \neq 0$ .
- Existe  $n_b \in \mathbb{N}$  tal que  $b_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_b$  y  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=n_b}^N b_n = l_b \neq 0$ .

Sea  $n_0 = \max\{n_a, n_b\}$ . Entonces  $a_n b_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$ .

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=n_0}^N a_n b_n \rightarrow c \neq 0$$

Como los productos convergen,

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left( \prod_{n=1}^N a_n \right) \left( \prod_{n=1}^N b_n \right) = \left( \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n \right) \left( \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N b_n \right) = \left( \prod_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left( \prod_{n=1}^{\infty} b_n \right)$$

□

**Teorema 6.5.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , entonces son equivalentes:

1.  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.
2. Existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$  y  $\sum_{n=n_0}^{\infty} \text{Log}(a_n)$  converge.

*Demostración.*

$\Rightarrow$  Como  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \neq 0$  para todo  $n \geq n_0$  y además  $\prod_{n=n_0}^N a_n \rightarrow q$  con  $q \neq 0$ . Sea  $S_N = \sum_{n=n_0}^N \text{Log}(a_n)$ . Entonces:

$$e^{S_N} = e^{\sum_{n=n_0}^N \text{Log}(a_n)} = \prod_{n=n_0}^N a_n = q_N \Rightarrow S_N \in \log(q_N) \Rightarrow S_N = \text{Log}(q_N) + 2\pi k_N i, \quad k_N \in \mathbb{Z}$$

Distinguiamos dos casos:

1. Supongamos que  $q \notin (-\infty, 0)$ . Como  $q_N \rightarrow q$ , entonces existe  $N_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $q_N \notin (-\infty, 0]$  para todo  $N \geq N_0$ . Así que  $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Log}(q_N) = \text{Log}(q)$ .

$$\begin{cases} S_{N+1} - S_N = \text{Log}(q_{N+1}) - \text{Log}(q_N) + 2\pi(k_{N+1} - k_N)i \\ S_{N+1} - S_N = \text{Log}(a_{N+1}) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} (k_{N+1} - k_N) = 0$$

Como  $k \in \mathbb{Z}$ , entonces existe  $j \in \mathbb{N}$  tal que  $k_N = k$  para todo  $N \geq j$ .

2. Supongamos que  $q \in (-\infty, 0)$ . Definimos una nueva sucesión  $\tilde{a}_{n_0} = -a_{n_0}$  y  $\tilde{a}_n = a_n$  para  $n > n_0$ .

$$\tilde{q}_N = \prod_{n=n_0}^N \tilde{a}_n = - \prod_{n=n_0}^N a_n \rightarrow -q > 0$$

Por el caso anterior.  $\tilde{S}_N = \sum_{n=n_0}^N \text{Log}(\tilde{a}_n)$  converge. Equivalentemente,  $S_N$  converge.

$\Leftarrow$  Falta ver que  $\prod_{n=n_0}^N a_n \rightarrow q \neq 0$ . Sabemos que  $S_N = \sum_{n=n_0}^N \text{Log}(a_n) \rightarrow p$  y  $q_N = e^{S_N}$ . Tomando límites,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} q_N = \lim_{N \rightarrow \infty} e^{S_N} = e^{\lim_{N \rightarrow \infty} S_N} = e^p = q \neq 0$$

□

**Corolario 6.6.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , entonces son equivalentes:

1.  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Log}(a_n)$  converge.

Además,

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = e^{\sum_{n=1}^{\infty} \text{Log}(a_n)}$$

Queremos encontrar una noción de convergencia absoluta. Para las series sabemos lo siguiente.

**Teorema 6.7.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , entonces son equivalentes:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge absolutamente.
2. Dada  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  permutación,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$  converge y es igual a  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .
3. Sea  $\{A_n\}$  una partición de  $\mathbb{N}$  con infinitos elementos. Entonces  $\sum_{k \in A_n} a_k$  converge y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k \in A_n} a_k \right)$$

Como consecuencia, si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge absolutamente, en particular converge.

Uniendo los teoremas anteriores, obtenemos el siguiente resultado.

**Teorema 6.8.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Entonces son equivalentes:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Log}(a_n)$  converge absolutamente.
2. Dada  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  permutación,  $\prod_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$  converge y su valor es

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = e^{\sum_{n=1}^{\infty} \text{Log}(a_n)}$$

3. Sea  $\{A_n\}$  una partición de  $\mathbb{N}$  con infinitos elementos. Entonces  $\prod_{k \in A_n} a_k$  converge y además

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \prod_{n=1}^{\infty} \left( \prod_{k \in A_n} a_k \right)$$

**Lema 6.9.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , entonces son equivalentes:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Log}(a_n)$  converge absolutamente.
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$  converge absolutamente.

*Demostración.* Empecemos por  $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ , entonces

$$\text{Log}(1-z) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1}$$

Además,

$$\text{Log}(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1}$$

Queremos analizar

$$\left| \frac{\text{Log}(1+z)}{z} - 1 \right| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1} - 1 \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n+1} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |z|^n = \frac{1}{2} \frac{|z|}{1-|z|}$$



Si  $|z| < \frac{1}{2}$ , entonces

$$\left| \frac{\text{Log}(1+z)}{z} - 1 \right| = \frac{1}{2} \frac{|z|}{1-|z|} \leq \frac{1}{2}$$

Así que

$$\left| \left| \frac{\text{Log}(1+z)}{z} \right| - 1 \right| \leq \left| \frac{\text{Log}(1+z)}{z} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \left| \frac{\text{Log}(1+z)}{z} \right| \leq \frac{3}{2}$$

Por último, sea  $z = w - 1$ , entonces si  $|w - 1| = |z| \leq \frac{1}{2}$ ,

$$\frac{1}{2} \leq \left| \frac{\text{Log}(w)}{1-w} \right| \leq \frac{3}{2}$$

Basta ver que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|1 - a_n| < \frac{1}{2}$ .

$\Leftarrow$  Como  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$  converge absolutamente,  $a_n \rightarrow 1$ . Por tanto, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|1 - a_n| \leq \frac{1}{2}$  para todo  $n \geq n_0$ .

$\Rightarrow$  Análogo.

□

**Teorema 6.10.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , entonces son equivalentes:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$  converge absolutamente.
2. Existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se tiene que  $|1 - a_n| \leq \frac{1}{2}$  y  $\sum_{n=n_0}^{\infty} \text{Log}(a_n)$  converge uniformemente.
3. Para cada permutación  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  se tiene que  $\prod_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$  converge y además

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \prod_{n=1}^{\infty} a_n$$

4. Sea  $\{A_n\}$  una partición de  $\mathbb{N}$  con infinitos elementos. Entonces  $\prod_{k \in A_n} a_k$  converge y además

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \prod_{n=1}^{\infty} \left( \prod_{k \in A_n} a_k \right)$$

**Definición 6.2** (Convergencia absoluta). Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ , su producto infinito asociado converge absolutamente si  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$  converge absolutamente.

*Observación.*

1. Si  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge absolutamente, entonces converge.
2. Si  $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$  converge absolutamente, entonces  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |1 - a_n|)$  converge absolutamente.

*Demostración.*  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |1 - a_n|)$  converge absolutamente si y solo si  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 - 1 - |1 - a_n|) = - \prod_{n=1}^{\infty} |1 - a_n|$  converge absolutamente. □

### 6.3. Funciones holomorfas definidas por productos infinitos

**Teorema 6.11.** Sea  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de funciones holomorfas en un dominio  $D$ . Entonces son equivalentes:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - f_n)$  es absoluta y uniformemente convergente en compactos de  $D$ .

2. Para cada compacto  $K$  en  $D$  existe  $n_K \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_K$  se tiene que  $|1 - f_n(z)| \leq \frac{1}{2}$  y  $\sum_{n=n_K}^{\infty} \text{Log}(f_n)$  converge absoluta y uniformemente en  $K$ .

**Lema 6.12.** Sea  $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ . Entonces

$$\left| \prod_{k=1}^n (1 + u_k) - 1 \right| \leq \prod_{k=1}^n (1 + |u_k|) - 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

*Demostración.* Razonamos por inducción.

- Para  $n = 1$ ,

$$|1 + u - 1 - 1| = |u_1| \leq |u_1|$$

- Supongamos que es cierto para  $n$  y veamos para el caso  $n + 1$ .

$$\begin{aligned} \left| \prod_{k=1}^{n+1} (1 + u_k) - 1 \right| &= \left| (1 + u_{n+1}) \prod_{k=1}^n (1 + u_k) - 1 \right| = \left| (1 + u_{n+1}) \left( \prod_{k=1}^n (1 + u_k) - 1 \right) + u_{n+1} \right| \leq \\ &\leq |1 + u_{n+1}| \left| \prod_{k=1}^n (1 + u_k) - 1 \right| + |u_{n+1}| \leq |1 + u_{n+1}| \left| \prod_{k=1}^{\infty} (1 + |u_k|) - 1 \right| + |u_{n+1}| \leq \\ &\leq (1 + |u_{n+1}|) \left| \prod_{k=1}^{\infty} (1 + |u_k|) - 1 \right| + |u_{n+1}| = \prod_{k=1}^{n+1} (1 + |u_k|) - 1 \end{aligned}$$

□

**Teorema 6.13.** Sea  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  una sucesión de funciones holomorfas en  $D$ . Si  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - f_n)$  converge absoluta y uniformemente en compactos de  $D$ , entonces:

1.  $\prod_{k=1}^n$  converge uniformemente en cada compacto de  $D$  a una función holomorfa  $P$  que denotamos por  $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ .
2. La convergencia de  $\prod_{k=1}^n f_k$  no depende de reordenaciones.
3. Para cada  $z_0 \in D$  tenemos que  $\text{ord}(z_0, P) = \sum_{k=1}^{\infty} \text{ord}(z_0, f_k)$ , donde  $\text{ord}(z_0, f)$  es el orden de  $z_0$  como cero de  $f$ .
4. Las derivadas logarítmicas  $\frac{P'}{P}$  y  $\frac{f'_n}{f_n}$  existen como funciones meromorfas. Además,

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f'_k}{f_k}$$

Si  $R > 0$  y  $\overline{D(z_0, R)} \subset D$  existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $f_n$  no tiene ceros en  $\overline{D(z_0, R)}$  para todo  $n \geq n_0$  y  $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{f'_n}{f_n}$  converge absoluta y uniformemente en  $\overline{D(z_0, R)}$ .

*Demostración.*

1. Sea  $K$  compacto de  $D$  y sea  $P_n = \prod_{k=1}^n f_k$ . Basta ver que  $P_n$  es uniformemente de Cauchy.

En primer lugar, veamos que  $P_n$  es uniformemente acotado en  $K$ . Como  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - f_n)$  converge absoluta y uniformemente en  $K$ , entonces existe  $c_K$  tal que  $\sum_{n=1}^{\infty} |1 - f_n(z)| < c_K$ . Entonces:

$$\begin{aligned} |P_n| &= \left| \prod_{k=1}^n f_k \right| = \left| \prod_{k=1}^n (1 + f_k - 1) \right| \leq \prod_{k=1}^n (1 + |1 - f_k|) \leq \prod_{k=1}^n e^{|1 - f_k|} = e^{\sum_{k=1}^n |1 - f_k|} \leq \\ &\leq e^{\sum_{k=1}^{\infty} |1 - f_k|} < e^{c_K} \end{aligned}$$

Ahora, veamos que  $\{f_n\}$  es uniformemente de Cauchy en  $K$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  de modo que si  $|x| < \delta$  entonces  $e^{cK}|e^x - 1| < \varepsilon$ . Como  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - f_n)$  es de Cauchy uniformemente en  $K$ , existe  $n_K$  tal que si  $m \leq n \leq n_K$ , entonces  $\sum_{k=n}^m |1 - f_k| < \delta$ . Por tanto, si  $m \geq n \geq n_K$ ,

$$\begin{aligned} |P_m - P_n| &= \left| \prod_{k=1}^m f_k - \prod_{k=1}^n f_k \right| = |P_n| \left| \left( \prod_{k=n+1}^m f_k \right) - 1 \right| \leq e^{cK} \left| \prod_{k=n+1}^m (1 + f_k - 1) - 1 \right| \leq \\ &\leq e^{cK} \left( \prod_{k=n+1}^m (1 + |1 - f_k|) - 1 \right) \leq e^{cK} \left( e^{\sum_{k=n+1}^m |1 - f_k|} - 1 \right) < \varepsilon \end{aligned}$$

2. Es consecuencia de (1).

3. Sabemos que existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{n=n_0}^{\infty} |1 - f_n(z)| < \frac{1}{2}$  para todo  $z \in \overline{D(z_0, R')}$ , con  $\overline{D(z_0, R)} \subset D(z_0, R')$ . Entonces, en particular  $|1 - f_n(z)| < \frac{1}{2}$  para todo  $n \geq n_0 + 1$ . Así que  $f_n$  no se anula en  $\overline{D(z_0, R')}$  para todo  $n \geq n_0 + 1$ . Sea entonces  $g_n = \prod_{k=n_0+1}^n f_k$ . Sabemos que  $g_n$  converge uniformemente en  $\overline{D(z_0, R')}$  a una función  $g$ .

$$\begin{aligned} |g_n(z) - 1| &= \left| \left( \prod_{k=n_0+1}^n f_k(z) \right) - 1 \right| = \left| \prod_{k=n_0+1}^n (1 + f_k(z) - 1) - 1 \right| \leq \\ &\leq \prod_{k=n_0+1}^n (1 + |f_k(z) - 1|) - 1 \leq e^{\sum_{k=n_0+1}^n |1 - f_k(z)|} - 1 \leq e^{1/2} - 1, \quad \forall z \in \overline{D(z_0, R')} \end{aligned}$$

Por tanto,  $g$  no tiene ceros en  $\overline{D(z_0, R')}$ . Entonces

$$P = f_1 \dots f_{n_0} \prod_{n=n_0+1}^{\infty} f_n = f_1 \dots f_{n_0} g$$

Como  $g$  es no nula,

$$\text{ord}(z_0, P) = \sum_{n=1}^{n_0} \text{ord}(z_0, f_n) + \text{ord}(z_0, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{ord}(z_0, f_n)$$

4. De la expresión anterior tenemos que

$$\frac{P'}{P} = \sum_{n=1}^{n_0} \frac{f'_n}{f_n} + \frac{g'}{g}$$

Falta ver que  $\sum_{n=n_0+1}^N \frac{f'_n}{f_n} \rightarrow \frac{g'}{g}$ . Como  $\sum_{n=n_0+1}^N f_k = \frac{g'_N}{g_N}$ , podemos ver equivalentemente que  $\frac{g'_N}{g_N} \rightarrow \frac{g'}{g}$  uniformemente en  $\overline{D(0, R')}$ .

$$\begin{aligned} \left| \frac{g'_N(z)}{g_N(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)} \right| &= \left| \frac{g'_N(z)g(z) - g'(z)g_N(z)}{g_N(z)g(z)} \right| = \\ &= \left| \frac{g'_N(z)g(z) - g(z)g'(z) + g(z)g'(z) - g'(z)g_N(z)}{g_N(z)g(z)} \right| \leq \\ &\leq \frac{|g(z)||g'_N(z) - g'(z)| + |g'(z)||g_N(z) - g(z)|}{|g_N(z)||g(z)|} \end{aligned}$$

Sabemos que

$$\begin{aligned} ||g_n(z)| - 1| &\leq |g_n(z) - 1| < e^{1/2} - 1 \Leftrightarrow 2 - e^{1/2} < |g_n(z)| < e^{1/2} \\ |g(z)| - 1 &\leq |g(z) - 1| < e^{1/2} - 1 \Leftrightarrow 2 - e^{1/2} < |g(z)| < e^{1/2} \end{aligned}$$

Además, existe  $c_K = \max_{z \in \overline{D(z_0, R')}} (|g(z)| + |g'(z)|)$ . Por tanto,

$$\left| \frac{g'_N(z)}{g_N(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)} \right| \rightarrow 0$$

uniformemente en  $\overline{D(z_0, R')}$ .

□

### Ejemplo.

1.  $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n^2}\right)$ . Veamos que converge uniformemente en compactos de  $\mathbb{C}$ .

Sea  $K$  compacto de  $\mathbb{C}$ . Entonces existe  $R > 0$  tal que  $K \subset \overline{D(0, R)}$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| 1 - \left(1 - \frac{z}{n^2}\right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|}{n^2} \leq R \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq Rc$$

Por el teorema anterior, el producto converge uniformemente en  $K$ . Además,  $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n^2}\right)$  se anula en  $\{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ .

2. Busquemos una función entera que se anule en  $\mathbb{Z}$  y cuyos ceros tengan orden 1. Consideramos  $P(z) = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ . Sea  $K$  un compacto en  $\mathbb{C}$ , existe  $R > 0$  tal que  $K \subset \overline{D(0, R)}$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^2}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^2}{n^2} \leq R^2 c$$

Por tanto, converge uniformemente en  $K$ .

La función  $z \mapsto \text{sen}(\pi z)$  tiene las mismas características que buscábamos en  $P$ . Por tanto, la función

$$z \mapsto \frac{\text{sen}(\pi z)}{P(z)} = \frac{\text{sen}(\pi z)}{z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)}$$

es una función holomorfa sin ceros y se puede factorizar de la forma

$$\frac{\text{sen}(\pi z)}{z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)} = e^{\varphi(z)}$$

## 6.4. El teorema de factorización de Weierstrass

Sea  $\{z_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathcal{F}}$  una colección de puntos de  $\mathbb{C}$ . Nuestro objetivo era encontrar una función entera que se anule en  $\{z_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathcal{F}}$ .

- Si  $\{z_k\}_{k=1}^N$  es finita, esta función es  $\prod_{n=1}^N (z - z_n)$ .
- Si  $\{z_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathcal{F}}$  tiene un punto de acumulación, entonces la función tiene que ser nula.

En el caso restante,  $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$  tiene  $\lim_{k \rightarrow \infty} |z_k| = \infty$ . Consideramos la expresión

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)$$

Si  $z \in \overline{D(0, R)}$  con  $R > 0$ ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| 1 - \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|z|}{|z_k|} \leq R \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|z_k|}$$

**Teorema 6.14.** Sea  $\{z_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  tal que  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|z_k|}$  converge y  $\lim_{k \rightarrow \infty} |z_k| = \infty$ . Entonces  $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)$  converge absoluta y uniformemente en compactos de  $\mathbb{C}$  y además tiene como ceros  $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ .

*Observación.* La función  $z^N \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_n}\right)$  tiene como ceros  $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$  y además el 0 es un cero de multiplicidad  $N$ .

Falta por ver qué ocurre cuando  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|z_k|}$  no converge, donde  $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$  con  $\lim_{k \rightarrow \infty} |z_k| = \infty$ . Consideramos

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) e^{q_k\left(\frac{z}{z_k}\right)}$$

Veamos un razonamiento intuitivo. Que el producto absoluto converja absoluta y uniformemente en compactos de  $\mathbb{C}$  es análogo a que converja la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \operatorname{Log} \left( \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) e^{q_k\left(\frac{z}{z_k}\right)} \right) \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \operatorname{Log} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) + q_k \left(\frac{z}{z_k}\right) \right|$$

Si conseguimos que

$$\sup_{|z| \leq R} \left| \operatorname{Log} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right) + q_k \left(\frac{z}{z_k}\right) \right| < M_K(R)$$

y además  $\sum_{k=1}^{\infty} M_K(R) < \infty$ , por el criterio de la mayorante de Weierstrass se tiene la convergencia. Para  $k \geq k_0$ , tenemos que

$$\frac{|z|}{|z_k|} \leq \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} < 1$$

Sea  $w = \frac{z}{z_k}$ ,

$$|\operatorname{Log}(1 - w) + q_k(w)| = \left| -\operatorname{Log} \left( \frac{1}{1 - w} \right) + q_k(w) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{w^n}{n} - q_k(w) \right|$$

Entonces, si  $q_k(w) = \sum_{n=1}^k \frac{w^n}{n}$ ,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{w^n}{n} - q_k(w) \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{w^n}{n} \right| \leq \frac{1}{k+1} \sum_{n=k+1}^{\infty} |w|^n = \frac{|w|^{k+1}}{k+1} \frac{1}{1 - |w|}$$

Tenemos que  $\frac{1}{1 - |w|} < 2$ . Por tanto, queremos que

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{|w|^{k+1}}{k+1} < \infty$$

Esta serie siempre converge. En lugar de considerar  $q_k$  podemos tomar  $q_{p_k}$ , donde  $\{p_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Basta tomar  $p_k$  tal que

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{|w|^{p_k+1}}{p_k+1} < \infty$$

**Definición 6.3** (Factores primos de Weierstrass). Los factores primos de Weierstrass son

$$E_0(z) = 1 - z$$

$$E_p(z) = (1 - z) \exp \left( \sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k} \right), \quad p \in \mathbb{N}$$

donde  $\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}$  es el polinomio de Taylor de orden  $p$  de  $\log \left( \frac{1}{1-z} \right)$ .

*Observación.* Para todo  $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $E_p(0) = 1$ ,  $E_p(1) = 0$  y  $E_p$  es entera.

**Lema 6.15.** Sea  $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  y  $|z| < 1$ , entonces  $|1 - E_p(z)| \leq |z|^{p+1}$ .

*Demostración.* Si  $p = 0$ ,

$$|1 - E_0(z)| = |1 - (1 - z)| = |z|$$

Si  $p \in \mathbb{N}$ , como  $E_p$  es una función entera,

$$E_p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

Como  $E_p(0) = 1$ , entonces  $a_0 = 1$ . Así que

$$E_p(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$$

Además, como  $E_p(1) = 0$ , entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -1$ . De la expresión anterior,

$$-\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n = 1 - E_p(z) = 1 - (1 - z) \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right)$$

Derivando,

$$\begin{aligned} -\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} &= \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right) - (1 - z) \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right) \left(\sum_{k=1}^p z^{k-1}\right) = \\ &= \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right) \left(1 - (1 - z) \sum_{k=0}^{p-1} z^k\right) = \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right) z^p = \\ &= z^p \left(1 + \sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k} + \frac{\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right)^2}{2!} + \dots\right) = z^p + A_{p+1} z^{p+1} + A_{p+2} z^{p+2} + \dots \end{aligned}$$

Por tanto,  $a_n = 0$  para todo  $1 \leq n \leq p$ . Además,

$$-(p+1)a_{p+1} = 1 \Rightarrow a_{p+1} = -\frac{1}{p+1}$$

En general, para todo  $n > p+1$ ,

$$n a_n = -A_{n-1} < 0 \Rightarrow a_n < 0$$

Así que

$$\begin{aligned} |1 - E_p(z)| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right| = \left| \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n z^n \right| = |z|^{p+1} \left| \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n z^{n-(p+1)} \right| \leq \\ &\leq |z|^{p+1} \sum_{n=p+1}^{\infty} |a_n| |z|^{n-(p+1)} \leq |z|^{p+1} \sum_{n=p+1}^{\infty} |a_n| = |z|^{p+1} \left( -\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n \right) = \\ &= |z|^{p+1} \left( -\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) = |z|^{p+1} \end{aligned}$$

□

*Observación.* Hemos visto que

$$E_p(z) = 1 - \frac{z^{p+1}}{p+1} + \sum_{n=p+2}^{\infty} a_n z^n$$

**Teorema 6.16** (Teorema de factorización de Weierstrass: primera versión). *Sea  $\{a_n\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  con  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ . Entonces existe una sucesión de números  $\{p_n\} \subset \mathbb{N} \cup 0$  de modo que*

$$\prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n} \left( \frac{z}{a_n} \right)$$

*converge absoluta y uniformemente en compactos de  $\mathbb{C}$  y además define una función entera cuyos ceros son  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .*

*Demostración.* Sea  $K$  compacto de  $\mathbb{C}$ , entonces existe  $R > 0$  tal que  $K \subset \overline{D(0, R)}$ . Como  $\{a_n\} \rightarrow \infty$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se tiene que  $\frac{|z|}{|a_n|} \leq \frac{R}{2R} < 1$ . Por el lema anterior,

$$\left| 1 - E_{p_n} \left( \frac{z}{a_n} \right) \right| \leq \left| \frac{z}{a_n} \right|^{p_n+1} \leq \left( \frac{1}{2} \right)^{p_n+1}$$

Si consideramos  $p_n = n$ , por el criterio de la mayorante de Weierstrass tenemos que

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \left| 1 - E_n \left( \frac{z}{a_n} \right) \right|$$

converge uniformemente en  $K$ . Además,

$$E_n \left( \frac{a_n}{a_n} \right) = E_n(1) = 0$$

□

**Teorema 6.17** (Teorema de factorización de Weierstrass: segunda versión). *Sea  $f$  una función entera tal que en  $z = 0$  tiene un cero de orden  $N$  y los demás ceros de  $f$  son  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Entonces existe  $\{p_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N} \cup \{0\}$  y una función entera  $g$  tal que*

$$f(z) = e^{g(z)} z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n} \left( \frac{z}{a_n} \right)$$

*Demostración.* Suponemos  $\{a_n\}$  conjunto infinito. Por el teorema anterior, existe una función entera que se anula en  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ . Entonces

$$\frac{f(z)}{z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n} \left( \frac{z}{a_n} \right)}$$

es entera y no se anula en  $\mathbb{C}$ . Por tanto, existe  $g$  entera tal que

$$\frac{f(z)}{z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n} \left( \frac{z}{a_n} \right)} = e^{g(z)}$$

□

*Observación.*

1. La factorización no es única. Si la sucesión  $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$  da una descomposición, entonces una sucesión  $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$  tal que  $p_n \leq q_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  también sirve.

2. Si  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  y existe  $p$  tal que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a|^{p+1}}$  converge, entonces

$$\prod_{n=1}^{\infty} E_p \left( \frac{z}{a_n} \right)$$

converge absoluta y uniformemente en compactos de  $\mathbb{C}$ .

*Demostración.* Sea  $K$  compacto de  $\mathbb{C}$ , entonces existe  $R > 0$  tal que  $K \subset \overline{D(0, R)}$ . Como  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$  se tiene que

$$|a_n| \geq 2R \Rightarrow \left| \frac{z}{a_n} \right| \leq \frac{1}{2} < 1$$

Por el lema anterior,

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \left| 1 - E_p \left( \frac{z}{a_n} \right) \right| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} \left| \frac{z}{a_n} \right|^{p+1} \leq R^{p+1} \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty$$

□

## 6.5. Exponente de convergencia y género de una sucesión

A partir de las observaciones anteriores, introducimos la siguiente definición.

**Definición 6.4.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ . Definimos el exponente de convergencia de la sucesión como

$$\sigma = \inf \left\{ s \in \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} < \infty \right\}$$

*Observación.*

1. Si  $s \in \mathbb{R}$  satisface que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} < \infty$ , entonces si  $t > s$  se cumple que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^t} < \infty$ .
2. Diremos que  $\inf \emptyset = +\infty$ , es decir,  $\sigma = +\infty$  cuando ningún  $s \in \mathbb{R}$  satisface que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} < \infty$ .
3. Si  $\sigma < \infty$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} < \infty \text{ si } s \in (\sigma, +\infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} = \infty \text{ si } s \in (-\infty, \sigma)$$

**Definición 6.5.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$  y  $\sigma < \infty$ . Entonces el género de la sucesión es el menor entero  $p$  tal que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty$$

*Observación.*

1.  $\sigma > 0$  siempre. Además,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^0} = \infty$  así que  $p \geq 0$ .
2.  $p \leq \sigma \leq p+1$ .

Si  $\{a_n\}$  es finita entonces diremos que  $\sigma = p = 0$ .



**Ejemplo.**

1. Sea  $a_n = n + 1$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^s} < \infty \Leftrightarrow s < 1 \Rightarrow \sigma = 1, p = 1$$

2. Sea  $a_n = (n+1)^2$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{2s}} < \infty \Leftrightarrow s > \frac{1}{2} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{2}, p = 0$$

3. Sea  $a_n = (n+1) \log^2(n+1)$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^s \log^{2s}(n+1)} < \infty \Leftrightarrow s \geq 1 \Rightarrow \sigma = 1, p = 0$$

Para el caso  $s = 1$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \log^2(n+1)} \sim \int_1^{\infty} \frac{1}{(x+1) \log^2(x+1)} dx = -\left. \frac{1}{\log(x+1)} \right|_1^{\infty} = \frac{1}{\log(2)}$$

4. Sea  $a_n = \log(n+1)$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\log^s(n+1)} = \infty \quad \forall s \in \mathbb{R} \Rightarrow \sigma = \infty$$

5. Sea  $a_n = 2^n$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{ns}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2^s)^n} < \infty \quad \forall s > 0 \Rightarrow \sigma = 0, p = 0$$

## 6.6. Factorización canónica de una función entera

Con las definiciones anteriores vamos a tener el siguiente teorema.

**Teorema 6.18** (Teorema de factorización canónica). *Sea  $f$  una función entera con  $z = 0$  un cero de orden  $N$  y  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  los demás ceros de  $f$ . Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$  y  $\sigma < \infty$ , entonces*

$$f(z) = e^{g(z)} z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_p \left( \frac{z}{a_n} \right)$$

donde  $p$  es el género de  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

*Demostración.* Sea  $K$  compacto de  $\mathbb{C}$ , entonces existe  $R > 0$  tal que  $K \subset \overline{D(0, R)}$ . Queremos ver que  $\prod_{n=1}^{\infty} E_p \left( \frac{z}{a_n} \right)$  converge absoluta y uniformemente en  $K$ . Basta ver que  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| 1 - E_p \left( \frac{z}{a_n} \right) \right|$  converge uniformemente en  $K$ . Como  $|a_n| \rightarrow \infty$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|a_n| \geq 2R$  para todo  $n \geq n_0$ . Entonces, como  $p$  es el género de  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ,

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \left| 1 - E_p \left( \frac{z}{a_n} \right) \right| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{|z|^{p+1}}{|a_n|^{p+1}} \leq R^{p+1} \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty$$

□

## 6.7. Factorización de funciones holomorfas en un dominio

**Teorema 6.19.** Sea  $D$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{0\}$  sin puntos de acumulación en  $D$ . Entonces existe una función holomorfa en  $D$  que se anula en  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

*Demostración.* Si  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  es finito, entonces dicha función es  $\prod_{n=1}^N (z - a_n)$ . Si  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , entonces definimos  $\delta_n = \text{dist}(a_n, \mathbb{C} \setminus D)$ . Consideramos primero dos casos.

1. Existe  $N_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|a_n|\delta_n \geq 1$  para todo  $n \geq N_0$ . Veamos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ . Supongamos por reducción al absurdo que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq \infty$ . Entonces existe una subsucesión  $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$  acotada. Así que existe una subsucesión  $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$  de  $\{a_{n_k}\}$  convergente a  $a_0 \in \mathbb{C} \setminus D$ . Si  $D = \mathbb{C}$ , esto es imposible. En otro caso,

$$1 \leq |a_m|\delta_m \leq |a_m||a_m - w|, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus D$$

Tomando límites,

$$1 \leq |a_0||a_0 - w|, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus D$$

Como necesariamente  $|a_0| \neq 0$ , entonces

$$|a_0 - w| \geq \frac{1}{|a_0|} \Rightarrow a_0 \notin \mathbb{C} \setminus D \Rightarrow a_0 \in D$$

Esto es una contradicción.

2. Existe  $N_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|a_n|\delta_n \leq 1$  para todo  $n \geq N_0$ . Veamos por reducción al absurdo que  $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . Supongamos que existen una subsucesión  $\{\delta_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$  y  $\varepsilon > 0$  tales que  $\delta_{n_k} \geq \varepsilon > 0$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ . Entonces existe una subsucesión  $\{\delta_m\}_{m=1}^{\infty}$  de  $\{\delta_{n_k}\}$  que converge a un cierto  $\delta_0 \geq \varepsilon$ . Como además  $|a_m| < \frac{1}{\varepsilon}$ , existe una subsucesión  $\{a_l\}_{l=1}^{\infty}$  de  $\{a_m\}$  que converge a  $a_0$ . Así que

$$\varepsilon \leq \delta_l \leq |a_l - w|, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Tomando límites,

$$\varepsilon \leq \delta_0 \leq |a_0 - w|, \quad \forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Rightarrow a_0 \in D$$

Esto contradice que  $\{a_n\}$  no tenga puntos de acumulación.

Construyamos ahora una función holomorfa  $f$  con ceros en  $\{a_n\}$ . Para cada  $a_n$  existe un  $b_n \in \mathbb{C} \setminus D$  de modo que  $|a_n - b_n| \leq \frac{3}{2}\delta_n$ . Entonces definimos

$$\prod_{n=1}^{\infty} E_n \left( \frac{a_n - b_n}{z - b_n} \right)$$

cuyos ceros son  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

Sea  $K$  un compacto de  $D$  y sea  $d = \text{dist}(K, \mathbb{C} \setminus D)$ . Observamos que  $d > 0$ . Como  $\delta_n \rightarrow 0$ , podemos tomar  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\delta_n < \frac{d}{2}$  para todo  $n \geq n_0$ .

$$|a_n - b_n| \leq \frac{3}{2}\delta_n < \frac{3}{4}d \leq \frac{3}{4}|z - b_n|, \quad \forall z \in K$$

Así que

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \left| 1 - E_n \left( \frac{a_n - b_n}{z - b_n} \right) \right| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} \left| \frac{a_n - b_n}{z - b_n} \right|^{n+1} \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} \left( \frac{3}{4} \right)^{n+1} < \infty$$

Por tanto,

$$\prod_{n=1}^{\infty} E_n \left( \frac{a_n - b_n}{z - b_n} \right)$$

converge absoluta y uniformemente en compactos de  $D$ .

En general, la sucesión  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$  se puede separar en  $\{b_n\}_{n=1}^\infty$  y  $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ , con  $\{b_n\}$  en el caso 1 y  $\{c_n\}$  en el caso 2. Por el caso 1, existe  $f$  holomorfa en  $D$  con ceros  $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ . De igual forma, por el caso 2 existe  $g$  holomorfa en  $D$  con ceros  $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ . Consideramos  $h = fg$ .  $h$  es holomorfa en  $D$  con ceros  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ .  $\square$

## Capítulo 7

# Funciones enteras. Crecimiento y distribución de los ceros

**Teorema 7.1** (Teorema de Liouville). *Si  $f$  es una función entera y acotada, entonces  $f$  es constante.*

**Teorema 7.2** (Generalización del teorema de Liouville). *Sea  $f$  entera tal que existen  $\alpha > 0$ ,  $c > 0$  y  $R_0 > 0$  con  $|f(z)| \leq c|z|^\alpha$  para todo  $|z| \geq R_0$ . Entonces  $f$  es un polinomio de grado  $E(\alpha)$  y por tanto tiene  $E(\alpha)$  ceros.*

*Demostración.* Sea  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ . Sea  $R > 0$ ,

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz \leq \max_{|z|=R} |f(z)| \frac{1}{R^n} \leq c \frac{|z|^\alpha}{R} = cR^{\alpha-n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty, n > E(\alpha)} 0.$$

Por tanto,  $a_n = 0$  para todo  $n > E(\alpha)$ . □

*Observación.*

1. Parece que si el crecimiento está controlado, el número de ceros también lo está.
2. Al revés esto no ocurre. Por ejemplo, con la exponencial.

### 7.1. La fórmula de Jensen

La fórmula de Jensen permite controlar el número de ceros de una función holomorfa sabiendo restricciones sobre su crecimiento.

**Lema 7.3.** *Sea  $s > 0$ . Entonces*

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |1 + se^{i\theta}| d\theta = \log^+(s),$$

donde

$$\log^+(s) = \begin{cases} \log(s) & \text{si } s \geq 1, \\ 0 & \text{si } 0 < s < 1. \end{cases}$$

*Demostración.* Sabemos que  $\text{Log}(1 - z)$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ .

- Si  $s < 1$ , entonces por el teorema del valor medio

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Log}|1 - se^{i\theta}| d\theta = 0.$$

- Si  $s > 1$ ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |1 - se^{i\theta}| d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| se^{i\theta} \left( \frac{1}{s} e^{-i\theta} - 1 \right) \right| d\theta = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log(s) d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| 1 - \frac{1}{s} e^{-i\theta} \right| d\theta = \log(s) - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| 1 - \frac{1}{s} e^{i\varphi} \right| d\varphi = \log(s). \end{aligned}$$

- Sea  $s = 1$ .

$$|1 - e^{i\theta}|^2 = (1 - e^{i\theta})(1 - e^{-i\theta}) = 2 - 2\cos(\theta).$$

Sabemos que

$$\cos(\theta) = \cos\left(2\frac{\theta}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = 1 - 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Luego  $|1 - e^{i\theta}|^2 = 4\operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |1 - e^{i\theta}| d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left( 2 \left| \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \right) d\theta = \log(2) + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| d\theta = \\ &= \log(2) + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \log \left( \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta = \log(2) + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log(\operatorname{sen}(\varphi)) d\varphi. \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \log(\operatorname{sen}(\theta)) d\theta &= \int_0^{\pi/2} \log \left( 2\operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta = \\ &= \frac{\pi}{2} \log(2) + \int_0^{\pi/2} \log \left( \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta + \int_0^{\pi/2} \log \left( \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta = \\ &= \frac{\pi}{2} \log(2) + \int_0^{\pi/2} \log \left( \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta + \int_0^{\pi/2} \log \left( \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) \right) d\theta = \\ &= \frac{\pi}{2} \log(2) + 2 \int_0^{\pi/2} \log(\operatorname{sen}(\varphi)) d\varphi - 2 \int_{\pi/2}^{\pi} \log(\operatorname{sen}(\varphi)) d\varphi = \frac{\pi}{2} \log(2) + 2 \int_0^{\pi/2} \log(\operatorname{sen}(\varphi)) d\varphi. \end{aligned}$$

Así que

$$\int_0^{\pi/2} \log(\operatorname{sen}(\theta)) d\theta = -\frac{\pi}{2} \log(2).$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |1 - e^{i\theta}| d\theta = 0.$$

□

**Teorema 7.4** (Fórmula de Jensen). *Sea  $f$  una función holomorfa en  $D(0, R)$  con  $f(0) \neq 0$  y tal que tiene ceros  $\{a_n\}$  de modo que*

$$|a_1| \leq |a_2| \leq |a_3| \leq \dots$$

*Sea  $\rho \in (0, R)$  y  $n(\rho, f) = \#\{a_n : |a_n| \leq \rho\}$ . Entonces*

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta = \log |f(0)| + \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right).$$

*Demostración.* Si  $\rho = 0$ ,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(0)| d\theta = \log |f(0)|.$$

Sea ahora  $\rho \in (0, R)$ . Supongamos que  $f$  no tiene ceros en  $\overline{D(0, \rho)}$ . Entonces existe  $\rho'$  con  $0 < \rho < \rho' < R$  tal que  $f$  es holomorfa en  $D(0, \rho')$  y  $f$  no tiene ceros en  $D(0, \rho')$ . Así, como  $\text{Log}(f(z))$  es holomorfa en  $D(0, \rho')$ , tenemos que  $\log |f(z)|$  es armónica en  $D(0, \rho')$ . Por el teorema del valor medio,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta = \log |f(0)|.$$

En general, consideramos

$$F(z) = \frac{f(z)}{\prod_{k=1}^{n(\rho, f)} (z - a_k)}.$$

Es holomorfa en  $D(0, R)$  y no se anula en  $\overline{D(0, \rho)}$ . Por el caso anterior,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left( \frac{|f(\rho e^{i\theta})|}{\prod_{k=1}^{n(\rho, f)} |\rho e^{i\theta} - a_k|} \right) d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left( \prod_{k=1}^{n(\rho, f)} |\rho e^{i\theta} - a_k| \right) d\theta = \\ &= \log |f(0)| + \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{1}{|a_k|} \right). \end{aligned}$$

Sin embargo, para dar este paso es necesario que las integrales converjan por separado. Sea  $a_k = \rho_k e^{i\theta_k}$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |\rho e^{i\theta} - \rho_k e^{i\theta_k}| d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| \rho e^{i\theta} \left( 1 - \frac{\rho_k}{\rho} e^{i(\theta_k - \theta)} \right) \right| d\theta = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |\rho e^{i\theta}| d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| 1 - \frac{\rho_k}{\rho} e^{i(\theta_k - \theta)} \right| d\theta = \\ &= \log(\rho) - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log \left| 1 - \frac{\rho_k}{\rho} e^{i\varphi} \right| d\varphi = \log(\rho). \end{aligned}$$

□

**Definición 7.1.** Se llama función contadora de Nevanlinna a la cantidad

$$N(\rho, f) = \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right).$$

*Observación.*

1.

$$N(\rho, f) = \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right) = \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \log^+ \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right).$$

2.

$$N(\rho, f) = \int_0^{\rho} \frac{n(t, f)}{t} dt.$$

*Demostración.* Sean  $f$  y  $\rho$ . Por simplicidad, llamamos  $n(\rho) = n(\rho, f)$ . Existen  $a_1, \dots, a_{n(\rho)}$  ceros de  $f$  de modo que

$$|a_1| \leq |a_2| \leq \dots \leq |a_{n(\rho)}|.$$

Van a existir  $p$  radios  $\rho_1 < \dots < \rho_p$  tal que cada cero  $a_k$  va a tener asociado un único  $\rho_j$  de la forma  $|a_k| = \rho_j$ . Entenderemos que  $n(\rho_0) = 0$ .

$$\begin{aligned}
N(\rho, f) &= \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right) = \sum_{j=1}^p \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho_j\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right) = \sum_{j=1}^p \log \left( \frac{\rho}{\rho_j} \right) \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho_j\}} 1 = \\
&= \sum_{j=1}^p \log \left( \frac{\rho}{\rho_j} \right) (n(\rho_j) - n(\rho_{j-1})) = \\
&= \log \left( \frac{\rho}{\rho_1} \right) (n(\rho_1) - n(\rho_0)) + \log \left( \frac{\rho}{\rho_2} \right) (n(\rho_2) - n(\rho_1)) + \dots + \log \left( \frac{\rho}{\rho_p} \right) (n(\rho_p) - n(\rho_{p-1})) = \\
&= n(\rho_1) \left( \log \left( \frac{\rho}{\rho_1} \right) - \log \left( \frac{\rho}{\rho_2} \right) \right) + n(\rho_2) \left( \log \left( \frac{\rho}{\rho_2} \right) - \log \left( \frac{\rho}{\rho_3} \right) \right) + \dots + n(\rho_p) \log \left( \frac{\rho}{\rho_p} \right) = \\
&= n(\rho_1) \log \left( \frac{\rho_2}{\rho_1} \right) + n(\rho_2) \log \left( \frac{\rho_3}{\rho_2} \right) + \dots + n(\rho_{p-1}) \log \left( \frac{\rho_p}{\rho_{p-1}} \right) + n(\rho_p) \log \left( \frac{\rho}{\rho_p} \right) = \\
&= \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{n(t)}{t} dt + \int_{\rho_2}^{\rho_3} \frac{n(t)}{t} dt + \dots + \int_{\rho_{p-1}}^{\rho_p} \frac{n(t)}{t} dt + \int_{\rho_p}^{\rho} \frac{n(t)}{t} dt = \int_{\rho_1}^{\rho} \frac{n(t)}{t} dt = \int_0^{\rho} \frac{n(t)}{t} dt.
\end{aligned}$$

□

Existen diversas generalizaciones de la fórmula de Jensen.

**Teorema 7.5.** Sea  $f(z) = c_N z^N + c_{N+1} z^{N+1} + \dots$  una función holomorfa en  $D(0, R)$  y sea  $\rho \in [0, R)$  tal que  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  son los ceros de  $f$  en  $D(0, R)$  y además están ordenados respetando la multiplicidad. Entonces:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta = \log |c_N \rho^N| + \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right).$$

*Demostración.* Consideramos

$$F(z) = \frac{f(z)}{c_N z^N}.$$

$F$  es holomorfa en  $D(0, R)$ ,  $F(0) = 1$  y los ceros de  $F$  son los mismos que los de  $f$ .

Aplicando la fórmula de Jensen,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta &= \log |F(0)| + \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right) \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |c_N \rho^N| d\theta &= \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right) \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta &= \log |c_N \rho^N| + \sum_{k=1}^{n(\rho, f)} \log \left( \frac{\rho}{|a_k|} \right).
\end{aligned}$$

□

Vamos a ver cómo aplicar la fórmula de Jensen para ver que si el crecimiento de  $f$  está controlado entonces sus ceros también lo están.

**Definición 7.2.** Llamamos módulo máximo de  $f$  a

$$M_{\infty}(\rho, f) = \sup_{|z|=\rho} |f(z)|.$$

*Observación.* Si  $f$  es holomorfa,

$$M_\infty(\rho, f) = \max_{|z|=\rho} |f(z)| = \max_{|z|\leq\rho} |f(z)|.$$

**Teorema 7.6.** Sea  $f$  holomorfa en  $D(0, R)$  tal que  $f(0) \neq 0$  y  $0 \leq s \leq \rho < R$ . Entonces:

$$n(s, f) \log \left( \frac{\rho}{s} \right) \leq \log(M_\infty(\rho, f)) - \log |f(0)|.$$

*Demostración.*

$$\begin{aligned} n(s, f) \log \left( \frac{\rho}{s} \right) &= n(s, f) \int_s^\rho \frac{1}{t} dt \leq \int_s^\rho \frac{n(t, f)}{t} dt \leq \int_0^\rho \frac{n(t, f)}{t} dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta - \log |f(0)| \leq \log(M_\infty(\rho, f)) - \log |f(0)|. \end{aligned}$$

□

**Ejemplo.** Sea  $f$  entera con  $|f(0)| = 1$  y sea  $\rho = es$ . Entonces:

$$n(s, f) \leq \log(M_\infty(es, f)).$$

*Observación.* Si  $f(z) = c_N z^N + \dots$ , el teorema anterior se puede escribir de la forma:

$$n(s, f) \log \left( \frac{\rho}{s} \right) \leq \log(M_\infty(\rho, f)) - \log |c_N \rho^N|.$$

## 7.2. La fórmula de Poisson-Jensen

**Teorema 7.7.** Sea  $R > 0$  tal que  $f$  es holomorfa en  $D(0, R)$  con la sucesión de ceros ordenados  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ . Sea  $s \in (0, R)$  y sea  $z \in D(0, s)$  con  $f(z) \neq 0$ . Entonces:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \log |f(se^{i\theta})| \frac{s^2 - |z|^2}{|s - ze^{-i\theta}|^2} d\theta = \log |f(z)| + \sum_{\{n: |a_n| \leq s\}} \log^+ \left| \frac{s^2 - \bar{a}_n z}{s(z - a_n)} \right|.$$

*Demostración.* Sea  $T_a(\xi) = \frac{\xi+a}{1+\bar{a}\xi}$ . Esta transformación manda  $\bar{\mathbb{D}} \rightarrow \bar{\mathbb{D}}$ . Entonces, sea  $\psi(\xi) = sT_{z/s}(\xi)$ ,

$$\psi(\xi) = s \frac{\xi + \frac{z}{s}}{1 + \frac{\bar{z}}{s}\xi} = \frac{s(\xi s + z)}{s + \bar{z}\xi} \Rightarrow \psi(0) = z,$$

$$\psi^{-1}(\xi) = S_{z/s} \left( \frac{\xi}{s} \right) = \frac{\frac{\xi}{s} - \frac{\bar{z}}{s}}{1 - \frac{\bar{z}}{s}\frac{\xi}{s}} = \frac{\xi - z}{s - \frac{\bar{z}}{s}\xi}.$$

$f \circ \psi$  es holomorfa en el disco  $D(0, \rho)$  con  $\rho > 1$  y  $\psi(D(0, \rho)) \subset D(0, R)$ .

Aplicamos la fórmula de Jensen a  $f \circ \psi$ . Como  $f \circ \psi(\xi) = 0 \Leftrightarrow f(\psi(\xi)) = 0$  y esto ocurre si y solo si existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\psi(\xi) = a_n$ , entonces  $\xi = \psi^{-1}(a_n)$ .

$$\log |f \circ \psi(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \log |f \circ \psi(e^{i\theta})| d\theta - \sum_{\{n: |a_n| \leq s\}} \log \left( \frac{1}{|\psi^{-1}(a_n)|} \right).$$

Si  $a_n$  es un cero de  $f$  de orden  $N$ , entonces  $\xi = \psi^{-1}(a_n)$  es un cero de  $f \circ \psi$  de orden  $N$ . Además,

$$\frac{1}{|\varphi^{-1}(a_n)|} = \left| \frac{s - \frac{\bar{z}}{s}a_n}{a_n - z} \right| = \left| \frac{s^2 - \bar{a}_n z}{s(z - a_n)} \right|.$$



Por otro lado, haciendo el cambio de variable  $se^{i\varphi} = \psi(e^{i\theta})$ ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \log |f \circ \psi(e^{i\theta})| d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(se^{i\varphi})| \frac{s^2 - |z|^2}{|s - ze^{-i\varphi}|^2} d\varphi.$$

Por tanto:

$$\log |f \circ \psi(0)| = \log |f(z)| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(se^{i\varphi})| \frac{s^2 - |z|^2}{|s - ze^{-i\varphi}|^2} d\varphi - \sum_{\{n: |a_n| \leq s\}} \log \left| \frac{s^2 - \overline{a_n}z}{s(z - a_n)} \right|.$$

□

*Observación.*

1. Sea  $|z| < s$ . Entonces:

$$\frac{|s^2 - a_n z|}{|s(z - a_n)|} = \frac{1}{|\psi^{-1}(a_n)|} \geq 1 \Rightarrow \log |f(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(se^{i\theta})| \frac{s^2 - |z|^2}{|s - ze^{-i\theta}|^2} d\theta.$$

2. Sea  $z = \rho e^{i\varphi}$  con  $0 < \varphi < s$ . Entonces:

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} \log |f(\rho e^{i\varphi})| &\leq \max_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(se^{i\theta})| \frac{s^2 - \rho^2}{|s - \rho e^{i\varphi} e^{-i\theta}|^2} d\theta \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log(M_{\infty}(s, f)) \frac{s + \rho}{s - \rho} d\theta = \log(M_{\infty}(s, f)) \frac{s + \rho}{s - \rho} \leq \log^+(M_{\infty}(s, f)) \frac{s + \rho}{s - \rho}. \end{aligned}$$

### 7.3. Introducción a los espacios de Hardy

**Teorema 7.8** (Condición de Blaschke). *Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con la sucesión de ceros ordenados  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ . Entonces son equivalentes:*

1.

$$\sup_{0 < \rho < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta < \infty.$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < \infty.$$

*Demostración.* Si  $f(z) = c_N z^N + \dots$ , por la fórmula de Jensen generalizada

$$\log |c_N \rho^N| + \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta.$$

⇒

$$\log |c_N \rho^N| + \sum_{\{n: |a_n| \leq \rho\}} \log \left( \frac{\rho}{|a_n|} \right) \leq \sup_{0 < \rho < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta < \infty.$$

Tomando límite  $\rho \rightarrow 1$  a la izquierda,

$$\log |c_N| + \sum_{n=1}^{\infty} \log \left( \frac{1}{|a_n|} \right) < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|) < \infty.$$

◀

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta \leq \log |c_N| + \sum_{n=1}^{\infty} \log \left( \frac{1}{|a_n|} \right) < \infty.$$

Por tanto,

$$\sup_{0 < \rho < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta < \infty.$$

◻

**Definición 7.3.** Se define la función característica de Nevanlinna como

$$T(\rho, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(\rho e^{i\theta})| d\theta.$$

**Definición 7.4.** Sea  $0 < p < \infty$ , se define la media integral de orden  $p$  como

$$M_p(\rho, f) = \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^p d\theta \right)^{1/p}.$$

**Definición 7.5.** Se define el módulo máximo de  $f$  como

$$M_{\infty}(\rho, f) = \max_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(\rho e^{i\theta})|.$$

**Definición 7.6.** Se define la clase de Nevanlinna como

$$\mathcal{N} = \{f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) : \sup_{0 < \rho < 1} T(\rho, f) < \infty\}.$$

**Definición 7.7.** Sea  $0 < p \leq \infty$ , se define el espacio de Hardy como

$$H^p = \{f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) : \sup_{0 < \rho < 1} M_p(\rho, f) < \infty\}.$$

**Teorema 7.9.** Si  $0 < p < q < \infty$ ,  $H^{\infty} \subset H^q \subset H^p \subset \mathcal{N}$ .

*Demostración.*

1. Veamos que  $H^{\infty} \subset H^q$ , con  $0 < q < \infty$ .

$$M_q^q(\rho, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^q d\theta \leq M_{\infty}^q(\rho, f).$$

Por tanto,  $M_q(\rho, f) \leq M_{\infty}(\rho, f)$  y tomando supremos se tiene.

2. Veamos que  $H^q \subset H^p$ , con  $0 < p < q < \infty$ .

$$M_p^p(\rho, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^p d\theta.$$

Usando la desigualdad de Hölder,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^p d\theta \leq \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^q d\theta \right)^{p/q} = M_q^{q \frac{p}{q}}(\rho, f) = M_q^p(\rho, f).$$

Por tanto,  $M_p(\rho, f) \leq M_q(\rho, f)$  y tomando supremos se tiene.

3. Veamos que  $H^p \subset \mathcal{N}$ , con  $0 < p < \infty$ . Como

$$\log(x^p) \leq \frac{1}{e} x^p \Leftrightarrow \log(x) \leq \frac{1}{pe} x^p \Rightarrow \log^+(x) \leq \frac{1}{pe} x^p,$$

entonces

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(\rho e^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{pe} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(\rho e^{i\theta})|^p d\theta = \frac{1}{pe} M_p^p(\rho, f).$$

Tomando supremos se tiene. □

**Teorema 7.10.** Sea  $f \in \mathcal{N}$ , entonces la sucesión de sus ceros cumple la condición de Blaschke.

*Demostración.* Sea  $f \in \mathcal{N}$  y  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  su sucesión de ceros.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log^+ |f(\rho e^{i\theta})| d\theta.$$

Tomando supremos tenemos que

$$\sup_{0 < \rho < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |f(\rho e^{i\theta})| d\theta < \infty.$$

Por un teorema anterior,  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  cumple la condición de Blaschke. □

*Observación.* Si  $f \in H^p$  para  $0 < p \leq \infty$ , entonces  $f \in \mathcal{N}$ . Por tanto, sus ceros cumplen la condición de Blaschke.

Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{D}$  una sucesión de puntos que cumplen  $\sum (1 - |a_n|) < \infty$ . Queremos ver si existe una función  $f \in \mathcal{N}$  tal que  $f$  tiene como ceros la sucesión  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

**Teorema 7.11** (Producto infinito de Blaschke). Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{D}$  tal que  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  cumple la condición de Blaschke. Definimos:

$$b_n = \begin{cases} z & \text{si } a_n = 0 \\ \frac{\bar{a}_n}{|a_n|} \frac{a_n - z}{1 - \bar{a}_n z} & \text{si } a_n \neq 0 \end{cases}$$

Consideramos  $B(z) = \prod_{n=1}^{\infty} b_n$ . Entonces  $B(z)$  converge absoluta y uniformemente en compactos de  $\mathbb{D}$  y además  $|B(z)| < 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

*Observación.* Si  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  cumple la condición de Blaschke, entonces existe  $f \in H^{\infty}$  que tiene como ceros  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

## 7.4. Orden de crecimiento de una función entera

Sean  $h, \varphi : \mathbb{C} \rightarrow [0, +\infty)$ . Entendemos por  $h(R) = O(\varphi(R))$ , con  $R \rightarrow \infty$ , que existen una constante  $C$  y un  $R_0$  tales que  $h(R) \leq C\varphi(R)$  para todo  $R \geq R_0$ . Nos va a interesar  $M_{\infty}(s, f) = O(\varphi(s))$ , con  $s \rightarrow \infty$  y  $f$  entera.

- Si  $M_{\infty}(s, f)$  es acotado, entonces  $f$  es constante.
- Si  $M_{\infty}(s, f) = O(s^{\alpha})$ , con  $s \rightarrow \infty$  y  $\alpha > 0$ , entonces  $f$  es un polinomio.

**Definición 7.8.** Sea  $f$  una función entera, definimos el orden de crecimiento de  $f$  como

$$\rho(f) = \inf \{ \alpha \geq 0 : M_{\infty}(s, f) = O(e^{s^{\alpha}}) \}$$

*Observación.*

1. Si no existe  $\alpha \geq 0$  tal que  $M_\infty(s, f) = O(e^{s^\alpha})$ , diremos que  $\rho(f) = \infty$ .
2. Si  $M_\infty(s, f) = O(e^{s^{\alpha_0}})$ , entonces  $M_\infty(s, f) = O(e^{s^\alpha})$  con  $\alpha \geq \alpha_0$ .
3. Si  $f$  es un polinomio, entonces  $\rho(f) = 0$ .

*Demostración.* Sea  $\alpha > 0$  y  $f(z) = \sum_{n=1}^N a_n z^n$ .

$$|f(z)| \leq \sum_{n=1}^N |a_n| |z|^n \Rightarrow M_\infty(s, f) \leq \sum_{n=1}^N |a_n| s^n.$$

Como

$$\limsup_{s \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N |a_n| \frac{s^n}{e^{s^\alpha}} = 0,$$

entonces  $\rho(f) < \alpha$  para todo  $\alpha > 0$ . Por tanto,  $\rho(f) = 0$ . □

4. Si  $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , entonces  $\rho(e^{az^\alpha}) = \alpha$ .
5.  $f(z) = e^{e^z}$  tiene orden infinito.  $M_\infty(s, f) = e^{e^s}$ .

**Proposición 7.12.** Sea  $f$  entera y no constante. Entonces

$$\rho(f) = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(M_\infty(s, f)))}{\log(s)} = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{\log(T(s, f))}{\log(s)}$$

donde

$$T(s, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |f(se^{i\theta})| d\theta$$

## 7.5. Propiedades aritméticas

**Lema 7.13.**

1.  $x = x^+ - (-x)^+$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .
2.  $(x + y)^+ \leq x^+ + y^+$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ .
3.  $\log(a) = \log^+(a) - \log^+(\frac{1}{a})$ ,  $a > 0$ .
4.  $\log(a + b) \leq \log(2) + \log^+(a) + \log^+(b)$ ,  $a, b > 0$ .
5.  $\log^+(a + b) \leq \log(2) + \log^+(a) + \log^+(b)$ ,  $a, b > 0$ .
6.  $\log^+(a - b) \leq \log^+(a) + \log^+(b)$ ,  $a, b > 0$ .
7.  $\log^+(ab) \leq \log^+(a) + \log^+(b)$ ,  $a, b > 0$ .

*Observación.* Veamos un par de observaciones sobre

$$\rho(f) = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(M_\infty(s, f)))}{\log(s)} = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{\log(T(s, f))}{\log(s)}$$

1. Si  $\rho(f) < \alpha$ , entonces existe  $s_\alpha$  tal que si  $s \geq s_\alpha$  entonces

$$\log(M_\infty(s, f)) \leq s^\alpha \Leftrightarrow M_\infty(s, f) \leq e^{s^\alpha}$$

y  $T(s, f) \leq s^\alpha$ .

2. Si existen constantes  $c, c_1, c_2, \beta > 0$  y  $s > 0$  tales que

$$M_\infty(s, f) \leq c + c_1 s^\beta + c_2 s^\alpha, \quad \forall s \geq s_0$$

entonces  $\rho(f) \leq \alpha$ .

*Demostración.* Como

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{c + c_1 s^\beta}{e^{s^\alpha}} = 0,$$

entonces existe  $s_1 \geq s_0$  tal que

$$c + c_1 s^\beta \leq e^{s^\alpha}, \quad \forall s \geq s_1.$$

Por tanto, si  $s \geq s_1$ ,  $M_\infty(s, f) \leq (c_2 + 1)e^{s^\alpha}$ . Luego

$$\log(M_\infty(s, f)) \leq \log(c_2 + 1) + s^\alpha \Leftrightarrow \log(\log(M_\infty(s, f))) \leq \log(\log(c_2 + 1) + s^\alpha).$$

Por el lema previo,

$$\log(\log(c_2 + 1) + s^\alpha) \leq \log(2) + \log^+(\log(c_2 + 1)) + \log^+(s^\alpha).$$

Como existe  $s_2 > 0$  tal que  $s^\alpha > 1$  si  $s \geq s_2$ , entonces

$$\log(2) + \log^+(\log(c_2 + 1)) + \log^+(s^\alpha) = \log(2) + \log^+(\log(c_2 + 1)) + \alpha \log(s), \quad s \geq s_2.$$

Por tanto,  $\rho(f) \leq \alpha$ . □

3. Si existen constantes  $c_1, c_2, c_3, \alpha > 0$  tales que

$$T(s, f) \leq c_1 + c_2 \log(s) + c_3 s^\alpha$$

si  $s \geq s_0 > 1$ , entonces  $\rho(f) \leq \alpha$ .

**Teorema 7.14** (Teorema del álgebra del orden de crecimiento). *Sean  $f$  y  $g$  enteras. Entonces*

1.  $\rho(cf) = \rho(f)$ , si  $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .
2.  $\rho(f + g) \leq \max\{\rho(f), \rho(g)\}$ , con igualdad si  $\rho(f) \neq \rho(g)$ .
3.  $\rho(fg) \leq \max\{\rho(f), \rho(g)\}$ , con igualdad si  $\rho(f) \neq \rho(g)$ .
4.  $\rho(f) = \rho(f')$ .

## 7.6. Orden de los factores primos de Weierstrass

Recordemos que los factores primos de Weierstrass son

$$E_0(z) = 1 - z$$

$$E_p(z) = (1 - z) \exp\left(\sum_{k=1}^p \frac{z^k}{k}\right), \quad p \in \mathbb{N}$$

Como  $E_0$  es un polinomio,  $\rho(E_0) = 0$ . Veamos que  $\rho(E_p) = p$ . Como  $\rho(e^c) = 0$  y  $\rho(e^{c_1 z}) = 1$ ,

$$\rho(e^{c+c_1 z}) = \rho(e^c e^{c_1 z}) = \max\{\rho(e^c), \rho(e^{c_1 z})\} = \max\{0, 1\} = 1$$

Por inducción se prueba el resultado.

## 7.7. Orden de una función entera expresada en sus coeficientes de Taylor

Queremos ver si existe una función entera con orden cualquier número  $\rho > 0$ .

Sea  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  entera. Si  $R$  es su radio de convergencia, como  $R = \infty$ ,

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} \Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = 0$$

**Teorema 7.15.** Sea  $f$  una función entera no constante tal que  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ . Entonces:

$$\rho(f) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{\log |c_n|^{-1/n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{\log \left( \frac{1}{|c_n|} \right)}$$

Sea  $\rho > 0$ ,

$$\frac{\log(n)}{\log |c_n|^{-1/n}} = \rho \Rightarrow \log(n) = \log |c_n|^{-\rho/n} \Rightarrow |c_n|^{\rho/n} = n^{-1} \Rightarrow |c_n| = n^{-n/\rho}$$

**Corolario 7.16.** Sea

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n/\rho} z^n$$

con  $\rho > 0$ . Entonces  $F$  es entera y su orden de crecimiento es  $\rho$ .

*Demostración.* En primer lugar calculamos  $\frac{1}{R}$ , con  $R$  su radio de convergencia.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |n^{-n/\rho}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/\rho}} = 0$$

Por tanto,  $F$  es entera. Por otro lado,

$$\rho(f) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{\log |c_n|^{-1/n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{\frac{1}{\rho} \log(n)} = \rho$$

□

## 7.8. Relación entre el orden de crecimiento y el exponente de convergencia de los ceros

Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , se definía el exponente de convergencia como

$$\sigma = \inf \left\{ s > 0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} < \infty \right\}$$

El género de  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  es el menor  $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  de modo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty$$

Teníamos que  $p \leq \sigma \leq p+1$ .

**Ejemplo.**

1. Si en cada circunferencia de radio  $n^2$  ponemos un cero para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} < \infty, \quad \forall s > \frac{1}{2}$$

Por tanto,  $\sigma = \frac{1}{2}$ .

2. Si en cada circunferencia de radio  $n^2$  ponemos dos ceros para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} < \infty, \quad \forall s > 1$$

Por tanto,  $\sigma = 1$ .

**Lema 7.17.** Sea  $\{a_n\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , con  $|a_n| \rightarrow \infty$ . Entonces

$$\sigma = \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{\log(n(R))}{\log(R)}$$

con  $n(R) = \#\{a_n : |a_n| \leq R\}$ .

**Teorema 7.18.** Sea  $f$  una función entera no constante cuyo orden de crecimiento es  $\rho(f)$  y tiene como ceros no nulos la sucesión  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ . Entonces:

$$\sigma(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}) \leq \rho(f)$$

## 7.9. Orden de los productos canónicas de Weierstrass

Queremos ver si existen funciones tales que  $\sigma(f) = \rho(f)$ .

**Teorema 7.19.** Sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  tal que el exponente de convergencia de  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  es finito y tiene género  $p$ . Entonces la función

$$F(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_p\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

tiene orden de convergencia  $\rho(F) = \rho(\{a_n\})$ .

**Ejemplo.** Sea  $\alpha > 0$  y sea  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  con  $a_n = n^\alpha$  para  $n \in \mathbb{N}$ . Sabemos que  $\sigma(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}) = \frac{1}{\alpha}$ . Entonces su género es  $p = E(1/\alpha)$  y la función

$$F(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_p\left(\frac{z}{n^\alpha}\right)$$

tiene orden de crecimiento  $\rho(F) = \frac{1}{\alpha}$ .

## 7.10. Factorización de Hadamard

Sea  $f$  una función entera no constante con  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  su sucesión de ceros no nulos, tal que  $\sigma(\{a_n\}) < \infty$  y con género  $p$ . Entonces la factorización canónica de Weierstrass permite expresar

$$f(z) = e^{g(z)} z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_p\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

donde  $N$  es la multiplicidad del origen como 0. Además,  $g$  es única salvo constantes  $2\pi i$ .

**Proposición 7.20.**  $\rho(f) = \max\{\rho(e^g), \sigma\}$ .

*Demostración.* Por el teorema del álgebra del orden de crecimiento,

$$\rho(f) \leq \max\left\{\rho(e^g), \rho\left(\prod_{n=1}^{\infty} E_p\left(\frac{z}{a_n}\right)\right)\right\} = \max\{\rho(e^g), \sigma\}$$

Además, se tiene la igualdad si  $\sigma \neq \rho(e^g)$ . Si  $\sigma = \rho(e^g)$ , entonces por un teorema previo

$$\sigma \leq \rho(f) \leq \sigma \Rightarrow \rho(f) = \sigma = \max\{\rho(e^g), \sigma\}$$

□

**Teorema 7.21** (Factorización de Hadamard). Sea  $f$  una función entera no constante con ceros no nulos  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ,  $\sigma = \sigma(\{a_n\}) < \infty$  y género  $p$ . Además, sea  $N$  la multiplicidad del origen como cero de  $f$ . Entonces existe un polinomio  $g$  con  $\deg(p) \leq \rho(f)$ , satisfaciendo que

$$f(z) = e^{g(z)} z^N \prod_{n=1}^{\infty} E_p\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

$g$  es única salvo constantes  $2\pi i$  y  $\rho(f) = \max\{\deg(p), \sigma\}$ .