

HODNOTENIE ZÁVAŽNOSTI TENDINOPATIE – ACHILLOVA ŠĽACHA

Kód pacienta: _____

Vek _____

E-mail: _____

Pohlavie ☐ Žena ☐ Muž

Dotazník slúži na posúdenie bolesti a symptómov spojenými s Achillovou šľachou; pre účely dotazníka rozumieme pod zhoršujúcimi činnosťami akékoľvek činnosti, ktoré majú za následok bolesť alebo výskyt symptómov počas ich vykonávania, alebo po ich ukončení. Napríklad, ak pociťujete bolesť počas behu, bude to zhoršujúca činnosť. Podobne, ak pociťujete stuhnutosť/napätie/obmedzenie pohybu ráno po rýchlej chôdzi, bude to považované za zhoršujúcu činnosť. Vaše odpovede na prvú a druhú otázku považujte za referenčné body pre zvyšok dotazníka, preto sa k nim v prípade potreby vráťte.

NEBODOVANÁ SEKCIA

A. Vyberte z ponúknutých činností všetky možnosti zhoršujúce vašu bolesť alebo symptómy Achillovej šľachy. Napríklad, ak cítite bolesť počas behu, ale nie pri chôdzi, označte beh, nie chôdzu.

- ☐ Pomalá chôdza
- ☐ Rýchla chôdza
- ☐ Chôdza hore a dolu schodmi
- ☐ Beh hore a dolu schodmi
- ☐ Pomalý beh (jogging)
- ☐ Rýchly beh (šprint)
- ☐ Poskakovanie a skákanie
- ☐ Rýchle zmeny smeru počas behu
- ☐ Iné

B. Vyberte z ponúknutých činností všetky, ktoré vykonávate počas vášho bežného dňa. Napríklad, ak chodíte pešo alebo pomaly beháte, ale nešprintujete, zvolte možnosť chôdza alebo pomalý beh.

- ☐ Pomalá chôdza
- ☐ Rýchla chôdza
- ☐ Chôdza hore a dolu schodmi
- ☐ Beh hore a dolu schodmi
- ☐ Pomalý beh (jogging)
- ☐ Rýchly beh (šprint)
- ☐ Poskakovanie a skákanie
- ☐ Rýchle zmeny smeru počas behu
- ☐ Iné

C. Ak vykonávate činnosť, ktorá najviac zhoršuje bolesť Achillovej šľachy (nie stuhnutosť) z OTÁZKY A, kedy je bolesť najintenzívnejšia?

- ☐ Na začiatku alebo počas zhoršujúcej aktivity
- ☐ Do dvoch hodín po skončení činnosti
- ☐ Do dvoch až šiestich hodín po skončení činnosti
- ☐ Po prebudení nasledujúci deň po zhoršujúcej aktivite

D. Kedy je vaša Achillova šľacha najviac STUHNUTÁ/NAPÄTÁ/MÁ OBMEDZENÝ POHYB po vykonávaní činností zhoršujúcich stuhnutosť/napätie/obmedzenie pohybu z OTÁZKY (A).

- ☐ Na začiatku alebo počas zhoršujúcej aktivity
- ☐ Do dvoch hodín po skončení činnosti
- ☐ Do dvoch až šiestich hodín po skončení činnosti
- ☐ Po prebudení nasledujúci deň po zhoršujúcej aktivite

E. Ak by ste teraz museli vykonať najviac bolestivú alebo symptómy zhoršujúcu činnosť zaznamenanú vo vašich odpovediach na OTÁZKU (B), ako dlho by ste dokázali túto činnosť vykonávať, kým by ste ju museli ukončiť pre bolesť alebo symptómy Achillovej šľachy?

- ☐ Nemusel/a by som činnosť prerušiť
- ☐ Dlhšie než 30 minút
- ☐ Medzi 15-30 minútami
- ☐ Kratšie než 15 minút

BODOVANÁ SEKCIA

BOLEŠŤ

V celej tejto časti sa zameriavame výlučne na bolesť Achillovej šľachy, nie na iné symptómy ako sú stuhnutosť/napätie/obmedzenie pohybu.

1. Ako veľmi ste museli zmeniť úroveň vykonávania zhoršujúcich činností z OTÁZKY (A) v nebodovanej časti od nástupu bolesti Achillovej šľachy?

- ☐ V súčasnosti vykonávam svoje predchádzajúce pohybové aktivity na vyššej úrovni ako pred ťažkosťami spojenými s Achillovou šľachou [0]
- ☐ V súčasnosti vykonávam svoje predchádzajúce pohybové aktivity na rovnakej úrovni ako pred ťažkosťami spojenými s Achillovou šľachou [0]
- ☐ V súčasnosti vykonávam svoje predchádzajúce pohybové aktivity na nižšej úrovni ako pred ťažkosťami spojenými s Achillovou šľachou [10]
- ☐ V súčasnosti už dlhšie nie som schopný/á vykonávať žiadnu z pohybových aktivít v dôsledku ťažkostí spojených s Achillovou šľachou [20]

2. Počas vykonávania zhoršujúcich činností sa bolesť Achillovej šľachy:

- ☐ Zlepší (rozcvičenie) [0]
- ☐ Zlepší (rozcvičenie) a následne sa vráti ešte počas zhoršujúcej aktivity [3]
- ☐ Je stále rovnaká [6]
- ☐ Nezlepší sa, ale zhoršuje sa, úmerne s časom počas ktorého vykonávam činnosť zhoršujúcu stav [10]

3. Objaví sa bolesť v oblasti Achillovej šľachy po tom, ako si oddýchnete alebo sa upokojíte po vykonaní zhoršujúcich aktivít uvedených v OTÁZKE (A) v nebodovanej sekcii?

- ☐ Nie, po odpočinku necítim žiadnu bolesť [0]
- ☐ Áno, cítim bolesť po tom, ako si oddýchnem alebo sa upokojím, a trvá menej ako 15 minút [3]
- ☐ Áno, cítim bolesť po tom, ako si oddýchnem alebo sa upokojím, a trvá 15 až 30 minút [6]
- ☐ Áno, cítim bolesť po tom, ako si oddýchnem alebo sa upokojím, a trvá viac ako 30 minút [10]

SKÓRE BOLESTI:___/40

SYMPTÓMY

V celej tejto sekcii sa venujeme otázkam ohľadom STUHNUTOSTI/NAPÄTIA/OBMEDZENIA POHYBU, ale nie bolesti, vašej Achillovej šľachy.

4. Pociťujete zvyčajne stuhnutosť/napätie/obmedzenie pohybu v oblasti Achillovej šľachy pri prebudení zo spánku a vstávaní z postele?

- ☐ Áno [5]
- ☐ Nie [0]

5. V priemere za posledný týždeň, ako dlho po prebudení pretrvávala stuhnutosť, napätie alebo obmedzenie pohybu?

- ☐ Menej ako 5 minút [0]
- ☐ 5-10 minút [3]
- ☐ 11-20 minút [6]
- ☐ Dlhšie ako 20 minút [10]

6. Je stuhnutosť/napätie/obmedzenie pohybu v oblasti Achillovej šľachy po prebudení horšia deň po vykonaní zhoršujúcej činnosti uvedenej v OTÁZKE (A) v nebodovanej časti?

- ☐ Áno [5]
- ☐ Nie [0]


7. Ak by ste museli vykonať zhoršujúcu aktivitu uvedenú v OTÁZKE (A) v nebodovanej časti po dlhšom sedení (dve alebo viac hodín), ako dlho by trvalo, kým by ste pocítili uvoľnenie alebo rozcvičenie Achillovej šľachy?

- ☐ Menej ako 5 minút [0]
- ☐ 5-10 minút [3]
- ☐ 11-20 minút [6]
- ☐ Dlhšie ako 20 minút [10]

SKÓRE SYMPTÓMOV:___/30

FYZICKÁ FUNKCIA

Uvedené pohyby súvisia s otázkami nižšie.

Pohyb	Počiatočná pozícia	Koncová pozícia
Prosím, vykonajte 5 opakovaní výponov (postavenie sa na špičku) od podložky na bolestivej dolnej končatine.		
Prosím, vykonajte 5 opakovaní výskokov na OBOCH dolných končatinách.		
Prosím, vykonajte 5 opakovaní poskokov na bolestivej dolnej končatine.		

V nasledujúcich otázkach uveďte intenzitu bolesti na stupnici od 0 do 10, kde nula znamená žiadnu bolesť a desať znamená najintenzívnejšiu bolesť, akú si viete predstaviť. Ak nie ste schopný/á činnosť dokončiť, nechajte otázku prázdnu. Obrázky slúžia na ilustráciu pozícií.

8. Vo vzpriamenej polohe s plne vystretým kolenom, vykonajte 5 neprerušovaných výponov (postavenie sa na špičku) od podložky na bolestivej dolnej končatine. Uveďte intenzitu svojej bolesti. [0-10]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Vo vzpriamenej polohe s plne vystretými kolenami, vykonajte 5 neprerušovaných výskokov od podložky na OBOCH dolných končatinách. Uveďte intenzitu bolesti. [0-10]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Vo vzpriamenej polohe s plne vystretým kolenom, vykonajte 5 neprerušovaných poskokov na bolestivej dolnej končatine. Uveďte intenzitu bolesti. [0-10]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ak sa bolesť vyskytuje na oboch dolných končatinách, prevádzame vyšetrenie na viac bolestivej dolnej končatine.

SKÓRE FYZICKÝCH FUNKCIÍ___/30

CELKOVÉ SKÓRE___/100

CITÁCIE

1. Murphy MC, Newsham-West R, Cook J, Chimenti RL, de Vos RJ, Maffulli N, Malliaras P, Mkumbuzi N, Purdam C, Vosseller JT, Rio EK. TENDINopathy Severity Assessment - Achilles (TENDINS-A): Development and Content Validity Assessment of a New Patient-Reported Outcome Measure for Achilles Tendinopathy. J Orthop Sports Phys Ther. 2023 Nov;54(1):1-16.

2. Murphy MC, McCleary F, Hince D, Chimenti R, Chivers P, Vosseller JT, Nimphius S, Mkumbuzi NS, Malliaras P, Maffulli N, de Vos RJ, Rio EK. TENDINopathy Severity assessment-Achilles (TENDINS-A): evaluation of reliability and validity in accordance with COSMIN recommendations. Br J Sports Med. 2024 Apr 4:bjsports-2023-107741.

